CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Bioestrovet, 0,25 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i świń

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Kloprostenol 0,25 mg/ml
(w postaci 10% roztworu etanolowego kloprostenolu sodowego)
Substnacje pomocnicze:
Chlorokrezol
Etanol
Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań.
Bezbarwny, przezroczysty roztwór do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, koń, świnia.

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt.

Krowy: ciche ruje (suboestrus), leczenie chronicznego zapalenia macicy - ropomacicza (pyometria) w połączeniu z lokalną terapią macicy, leczeniu jajnikowych torbieli lutealnych, wywoływanie poronienia - można wywołać poronienie od 1 tygodnia ciąży do 150 dnia ciąży (np. w wypadku zmumifikowanych płodów i puchliny błon płodowych), indukcja porodu (dopuszczalna nie wcześniej niż tydzień przed przewidywanym porodem), synchronizacja rui.
U klaczy: indukcja luteolizy po wczesnej śmierci płodów (u 10% klaczy po pokryciu płody obumierają i ulegają resorpcji w ciągu pierwszych 100 dni ciąży) po uprzednim zbadaniu rektalnym, przerwanie późnej fazy ciałka żółtego, przerwanie ciąży rzekomej klaczy typu I — przy obecności ciałka żółtego i braku kubków endometrialnych, wywoływanie rui u klaczy w laktacji, wywoływanie rui u jałowych klaczy, leczenie zapaleń macicy przy obecnym ciałku żółtym.
U loch: indukcja porodów po 111 dniu ciąży.

4.3 Przeciwwskazania

Stany spastyczne dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Nie stosować dożylnie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Brak

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Osoby dokonujące wstrzyknięcia, chore na astmę, kobiety w wieku prokreacyjnym powinny unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.
Po przypadkowej samoiniekcji czy rozlaniu na skórę (zwłaszcza kobiety), należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.
Produktu nie powinny podawać kobiety w ciąży.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

U klaczy pocenie się i umiarkowane objawy morzyskowe.
U krów przy indukcji porodów możliwość zatrzymania łożyska.
U prośnych loch wzrost ciepłoty wewnętrznej ciała, przyśpieszenie oddechów i zaczerwienienie skóry.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża:
U krów:
Stosowanie kloprostenolu podczas okresu ciąży może doprowadzić do poronienia oraz porodu. Jednorazowe wstrzyknięcie do 150 dnia ciąży prowadzi do poronienia bez dodatkowych skutków ubocznych. Podanie kloprostenolu w ostatnich dwóch tygodniach ciąży, prowadzi do indukcji porodu.
U klaczy:
Podanie prostaglandyn klaczom 35-38 dnia ciąży, wywołuje ruje po 3-5 dniu. Jeżeli prostaglandyna podana jest po 38 dniu ciąży, powoduje poronienie oraz utrzymuje okres bezrujowy.
U loch:
Podanie prostaglandyny między 25 a 30 dniem ciąży, powoduje poronienie w ciągu 30 godzin. Podanie w ostatnim tygodniu ciąży prostaglandyn wywołuje poród w ciągu 48 godzin, rezultat jest najlepszy po podaniu kloprostenolu między 110 a 113 dniem ciąży.
Laktacja:
Można stosować w okresie laktacji

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ analogów $PGF_{2\alpha}$ na ciężarną macicę nasila oksytocyna i metyloergometryna (alkaloid sporyszu)

4.9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie domięśniowe
KROWY:
Synchronizacja rui: 2 ml preparatu (0,5 mg substancji czynnej) jednokrotnie.
Zaleca się stosowanie jednego z poniższych schematów synchronizacji rui:
1. Pojedyncze podanie preparatu po uprzednim palpacyjnym stwierdzeniu na jajniku obecności ciałka żółtego, następnie krycie w czasie pierwszej rui po podaniu leku
2. Dwie iniekcje w odstępie 11 dni i krycie w czasie najbliższej rui;
3. Pojedyncze podanie wszystkim sztukom i krycie krów z objawami rui. Pozostałym sztukom, które nie wykazywały rui podać po 11 dniach drugą iniekcję i kryć w czasie najbliższej rui.
Pierwsze objawy rujowe występują po około 48-60 godzinach. Przy zastosowaniu metody 2 i 3 proponuje się jednokrotne krycie po 72-84 godzinach lub dwukrotne krycie w 72 i 96 godzinie od podania leku (dwukrotna inseminacja może być skuteczniejsza)

Dla wykluczenia niepowodzeń wybrane sztuki powinny mieć regularny cykl płciowy oraz nie powinny być w ciąży.
Zaburzenia czynnościowe jajników: podaje się 2 ml preparatu, następnie unasienia po 76 godzinach, ewentualnie reinseminuje.
Leczenie torbieli jajnikowych: podaje się 2 ml preparatu jednorazowo najczęściej 10 dnia po uprzednim podaniu HCG lub LHRH i po stwierdzeniu pozytywnej reakcji jajników. Ruja pojawi się 3-go dnia po podaniu preparatu.
Schorzenia macicy: podaje się 2 ml preparatu uzupełniając leczenie innymi preparatami, np. antybiotykami lub preparatami jodowymi w postaci aerozoli lub podobnymi.
11-go dnia ponowne podanie, 14-go dnia unasienianie, a 15-go dnia reinseminacja.
Przerwanie ciąży: 2 ml preparatu (dalsze postępowanie uzależnione od stanu klinicznego).
LOCHY: jednorazowe podanie 0,7 ml preparatu od 111-go dnia ciąży indukuje poród w ciągu 40 godzin najczęściej między 24-35-tą godz.
KLACZE: 1 ml preparatu domięśniowo. Najwłaściwszy okres krycia między 4-6 dniem po podaniu preparatu.

4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Przedawkowanie powoduje nasilenie działań niepożądanych.

4.11 Okres (-y) karencji

Koń, bydło, świnia - tkanki jadalne – 1 dzień
Mleko – 0 dni

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: leki do leczenia układu moczopłciowego i hormony płciowe – prostaglandyny
Kod ATCvet: QG02AD90

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Syntetyczny analog prostaglandyny $F_{2\alpha}$ - kloprostenol posiada swoiste działanie luteolityczne Zastosowanie preparatu w fazie lutealnej cyklu płciowego powoduje zanik ciałka żółtego stwarzając warunki do wystąpienia rui i jajeczkowania.
Pierwsze objawy rui po zastosowaniu preparatu występują po 48-60 godzinach, dając najskuteczniejszy okres do unasieniania ok. 76 godziny po podaniu kloprostenolu, u klaczy występuje on 24 godz. później.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie
Czas, w którym lek osiąga największe stężenie po podaniu domięśniowym u krów wynosi 15 min - 1 godz., a maksymalne stężenie leku w osoczu wynosi 0,18—0,86 ng/ml.
C_{max}: 0,18 - 0,86 ng/ml
T_{max}: 15 min - 1 godz.
U macior, po podaniu domięśniowym 75 µg dawki kloprostenolu, czas, po którym lek osiąga największe stężenie wynosi od 30 do 80 minut, a maksymalne stężenie w osoczu wynosi 2 µg/l.
C_{max}: 2µg/l
T_{max}: 30-80 minut
Dystrybucja

U krów, po domięśniowym podaniu substancja lecznicza wchłania się w krótkim czasie do krwioobiegu i przenika przez błony komórkowe do tkanek docelowych.
Maksymalne stężenie w tkankach docelowych kloprostenol osiąga w ciągu 30 min. po podaniu.
Biotransformacja (przemiana produktu leczniczego)
Kloprostenol jest wydalany z organizmu, głównie z moczem w postaci niezmienionej oraz jako kwas 12(R)-HETE (tetranor kwas), który powstał podczas procesu 3-oksydacji łańcucha bocznego alifatycznych kwasów karboksylowych.
Eliminacja produktu leczniczego
Wydalanie kloprostenolu i jego metabolitów z organizmu odbywa się z moczem poprzez nerki, z żółcią oraz mniej niż 0,75% podanej dawki przez gruczoły mlekowe z mlekiem

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Etanol
Kwas cytrynowy jednowodny
Sodu wodorotlenek
Chlorokrezol
Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3 Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży – 18 miesięcy.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego – 28 dni

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

6.5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelki ze szkła oranżowego typu I, zawierające 20 ml roztworu, zamykane korkiem typu I z gumy chlorobutylowej i zamknięciem typu *flip-off*, pakowane pojedynczo w pudełko tekturowe.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (095) 7285-500

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

825/99

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.06.1999
09.12.2004
11.12.2008

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy