

Wydział	Imię i nazwisko 1. Vyacheslav Trushkov 2.		Rok II	Grupa 5b	Zespół 2
WEAiIB	Temat: Opracowanie danych pomiarowych				Nr ćwiczenia 0
Data wykonania 21.11.2019	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

Ćwiczenie nr 0: Opracowanie danych pomiarowych

Cel ćwiczenia:

Zaznajomienie się z typowymi metodami opracowania danych pomiarowych przy wykorzystaniu wyników pomiarów dla wahadła prostego

Wahadłem prostym (lub: matematycznym) nazywamy punkt materialny o masie m zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici o długości l .

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Danny wzór jest prawdziwy dla małych kątów (3 deg – 10 deg).

1. Układ pomiarowy

1. Wahadło proste
2. Stoper
3. Linijka

2. Wykonanie ćwiczenia

1. Pomiary okresu dla ustalonej długości wahadła:
 - a) Przy użyciu linijki mierzymy długość wahadła (odległość od środka ciężarka do punktu zamocowania jego nici)
 - b) Wprowadzamy wahadło w ruch drgający o amplitudzie kątowej nie przekraczającej dziesięciu stopni. Następnie mierzymy czas dla 15 okresów. Uruchamiamy i zatrzymujemy sekundomierz w tej samej fazie ruchu.

- c) Pomiar ten powtórzymy pięciokrotnie.
2. Pomiary zależności okresu drgań od długości wahadła. Wykonujemy pięć pojedynczych pomiarów, zmieniając długość wahadła w zakresie od 280 mm do 470 mm. Ilość okresów wynosi 12.

3. Wyniki pomiarów

Tabela 1. Pomiar okresu drgań przy ustalonej długości wahadła
długość wahadła $l = 450$ mm
niepewność pomiaru $u(l) = 3$ mm

Lp.	liczba okresów k	czas t dla k okresów [s]	okres $T_i = t/k[s]$
1	15	20.03	1.3353
2	15	20.00	1,3333
3	15	20.12	1,3413
4	15	20.13	1,3420
5	15	20.15	1.3433

Tabela 2. Pomiar zależności okresu drgań od długości wahadła

Lp.	$l[\text{mm}]$	k	$t[\text{s}]$	$T_i[\text{s}]$	$T_i^2[\text{s}^2]$
1	280	12	12.85	1,0708	1,1466
2	320	12	13.75	1,1458	1,3129
3	360	12	14.25	1,1900	1,4161
4	435	12	15.50	1,2916	1,6682
5	470	12	16.06	1,3383	1,7910

4. Opracowanie wyników pomiaru

1. Wyniki pomiaru okresu nie zawierają błędów grubych. Wartości T_i są zgodne z oczekiwaną wartością.
2. Obliczenie niepewności pomiaru okresu (typu A).

$$\bar{T} = \frac{1,3353 + 1,3333 + 1,3413 + 1,3420 + 1,3433}{5} = 1,3390\text{s},$$

$$u(T) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n(n-1)}}$$

$$u(T) = \sqrt{\frac{(1,3353 - 1,3390)^2 + (1,079 - 1,068)^2 \dots + (1,3433 - 1,3390)^2}{5 \cdot 4}} = 0,0020[s]$$

3. Oceniamy niepewność pomiaru długości i wahadła (typu B). Długość wahadła zmierzaliśmy za pomocą linijki, ma wartość $l=45cm$. Niepewność jest równa $u(l)=0.3cm$.
4. Na podstawie otrzymanych wartości obliczamy przyspieszenie ziemskie.

$$\bar{T} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$g = 4l \left(\frac{\pi}{\bar{T}} \right)^2$$

$$g = 9.9086 \frac{m}{s^2}$$

5. Obliczamy niepewność złożoną $u_c(g)$ przy pomocy prawa przenoszenia niepewności.

$$u_c(g) = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2} u(l) \right)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 l}{T^3} u(T) \right)^2} =$$

$$= \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{(1,3390s)^2} \cdot 0.003m \right)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 \cdot 0,450m}{(1,3390s)^3} \cdot 0,0020s \right)^2} = 0.072 \frac{m}{s^2}$$

$u_c(g)$ - niepewność złożona przyspieszenia ziemskiego.

6. Obliczamy niepewność rozszerzoną $U(g)$ Do wnioskowania o zgodności wyniku pomiaru z innymi rezultatami wprowadzamy niepewność rozszerzoną U. Wartość U obliczamy mnożąc niepewność złożoną przez bezwymiarowy współczynnik rozszerzenia k

$$U(y) = k \cdot u_c(y)$$

Zgodnie z międzynarodową praktyką do obliczenia U przyjmuje się umowną wartość $k=2$.

$$U(g) = k \cdot u(g)$$

$$U(g) = 2 \cdot 0,072 \frac{m}{s^2} = 0,144 \frac{m}{s^2}$$

7. Porównujemy wyliczoną wartość przyspieszenia ziemskiego g z wartością tabelaryczną dla Krakowa $g = 9,811 \frac{m}{s^2}$.

(1) Obliczone przyspieszenie ziemskie wynosi $9.909 \frac{m}{s^2}$ z niepewnością rozszerzoną $0.144 \frac{m}{s^2}$;


(2) $g = 9.909 \frac{m}{s^2}$; $U(g) = 0.144 \frac{m}{s^2}$;

(3) $g = (9.909 \pm 0,144) \frac{m}{s^2}$.

Z tego wychodzi że dane wyliczone są zgodne z tabelarycznymi dla Krakowa.


8. Wykonanie wykresu zależności okresu od długości wahadła $T(l)$

Zależności okresu T od
długości wahadła l



9. Wykonujemy wykres zlinearyzowany T^2 w funkcji l .

Zależności okresu T^2 od
długości wahadła l



10. Obliczenie przyspieszenia ziemskiego Na powyższym wykresie przy pomocy programu została naniesiona prosta regresji oraz zostało wyznaczone jej równanie o postaci $y = ax$. Dla zlinearyzowanego wykresu zależności okresu od długości wahadła wartość współczynnika a to 0.0391.

$$a = \frac{T^2}{l} = 0.0391 \left[\frac{s^2}{cm} \right] = 3.91 \left[\frac{s^2}{m} \right]$$

Obliczania wartości przyspieszenia $a = \frac{4\pi^2}{g}$

$$g = \frac{4\pi^2}{a} = \frac{4\pi^2}{3.91} = 10.1226 \frac{m}{s^2}$$

11. Za pomocą oprogramowania Google Sheets wyliczamy niepewność zgodną z dopasowaniem: $u(a) = 0,00059 \frac{cm}{s^2} = 0,059 \frac{m}{s^2}$. Na podstawie prawa przenoszenia nierówności odliczamy $u(g)$:

$$u(g) = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial a} u(a) \right)^2} = \left| \frac{-4\pi^2}{3.91^2} \cdot 0,059 \right| \approx 0.15 \frac{m}{s^2}$$

Niepewność rozszerzona dla $k = 3$ wynosi: $U(g) = 3 \cdot u(g) = 0.45 \frac{m}{s^2}$.

Wykonane doświadczenie i analiza danych dały nam wynik $g = 10.12 \pm 0.45 \frac{m}{s^2}$.

Jest to wynik zgodny z wartością tabelaryczną.

5. Wnioski

Mimo niedoskonałości układu jaki badaliśmy (nić miała wagę) udało się uzyskać dobry wynik. Otrzymane zakresy zawierają w sobie rzeczywistą wartość przyspieszenia ziemskiego w Krakowie. Warto zwrócić uwagę, że dla uzyskania wyniku zgodnego z wartością tabelaryczną w punkcie 11, obliczając niepewność rozszerzoną, uznałem że $k = 3$. Zwiększenie k zostało spowodowane błędami ludzkimi, między innymi czas reakcji człowieka i ruch wahadła w zakresie kątów większych niż 10.