

Forest Digital Learning



FORDiL
YOUR SMARTELOSCOPE



Co-funded by
the European Union

Presentation of the
partners
SRFB-KBBM

srfb-kbbm.be
info@srfb-kbbm.be

Glossaire

Accroissement périodique : volume de production ligneuse pendant une période déterminée.

Adéquation stationnelle : évaluation de la compatibilité entre les caractéristiques écologiques d'un site forestier et les exigences d'une essence d'arbre.

Annélation : enlèvement complet, tout autour du tronc de l'écorce, du liber et, en saison de végétation, du cambium, pour provoquer la mort progressive de l'arbre.

Arbre habitat ou d'intérêt biologique : arbre vivant ou mort où vit une ou plusieurs espèces. Il correspond aux composantes biotiques (ce qui se rapporte à l'action des organismes vivants) et abiotiques (ce qui se rapporte à l'action du non vivant : climat, sol, eau, lumière, température) de son environnement immédiat. L'arbre habitat porte des dendromicrohabitats essentiels pour ces espèces.

Arbre dépérissant : arbre ayant des symptômes mortels. L'intensité peut varier d'un arbre à un autre, selon le stade de la pathologie.

Arbre mature : arbre ayant atteint sa dimension d'exploitabilité. Celle-ci varie selon l'essence, la qualité et les objectifs du martelage. Un arbre mature peut être conservé afin de renouveler le peuplement.

Arbre objectif : Ce terme renvoie à la pratique sylvicole inhérente à la SMCC, qui consiste à pratiquer une sylviculture d'arbres et non de peuplement.

L'arbre objectif est un arbre en adéquation stationnelle de bonne qualité. Il doit avoir un fût cylindrique et droit, un houppier développé, doit être sain, dominant et ne doit pas posséder de fourches et branchaies basses.

Le forestier concentre ses interventions prioritairement sur ces arbres, qui doivent être correctement répartis spatialement dans le peuplement.

Bille sur pied : tronçon du tronc d'un arbre sur pied.

Cavité : trous dans le bois ou lieux abrités, humides ou secs, contenant du terreau ou pas, situés dans le tronc, le houppier ou au collet de l'arbre. Les cavités sont regroupées en 4 groupes : loge de pic, cavité à terreau, orifices et galeries d'insectes et les concavités.

Classe de dimension : division d'arbres selon leur grosseur

Composition : description des essences présentes dans le peuplement.

Concurrence : compétition des arbres entre eux.

Couvert : écran formé par les houppiers des arbres d'un peuplement. Il s'exprime par la surface de leur projection au sol.

DBH : diamètre à hauteur de poitrine.

Défaut d'un arbre sur pied : particularité développée sur l'arbre qui peut avoir une incidence sur sa croissance, sa forme et sa qualité future. L'analyse de ces défauts permet au forestier de déterminer une qualité générale de l'arbre ou par tronçon.

Dégagement : consiste à réduire la concurrence exercée par la végétation herbacée ou ligneuse ligneux sur la régénération. Il intervient dès les premières années jusqu'à 3 m de hauteur.

Dendromicrohabitat (DMH) : singularité morphologique portée par un arbre et qui est utilisée par des espèces parfois hautement spécialisées, au moins durant une partie de leur cycle de vie.

Dépressage : action consistant à réduire la densité de la régénération au profit des tiges les mieux conformées et ainsi limiter la concurrence exercée par les semis de même essence ou d'essences différentes. Il s'effectue sur une régénération naturelle dont la hauteur est supérieure à 3 m de hauteur.

Désignation : intervention consistant à sélectionner et à désigner des arbres objectifs. Il s'effectue sur des arbres dont la hauteur est supérieure à 12m.

A noter que la pré-désignation intervient plus tôt, car c'est l'action d'identifier physiquement et de manière précoce dans la régénération naturelle des tiges en adéquation stationnelle, de bonne conformation, et ayant un avenir dans le peuplement, de manière à concentrer les futures opérations sylvicoles uniquement en leur faveur.

Détourage : action de prélever les arbres au profit d'un arbre objectif pour libérer son houppier et d'assurer son bon développement.

Dimension d'exploitabilité : c'est la dimension de maturité d'un arbre. C'est le seuil de dimension objectif à atteindre pour une essence en particulier du peuplement. Cette dimension varie selon l'essence, sa qualité, les conditions stationnelles et les objectifs du martelage.

Élagage : à défaut d'un élagage naturel, l'élagage artificiel est le procédé visant à couper les branches basses des arbres objectifs et ainsi limiter la présence nœuds, améliorant ainsi la qualité du bois. L'élagage s'effectue sur des arbres de qualité ayant atteint dès 6 m de hauteur jusqu'à 12m.

Essences objectifs : essences privilégiées dans le peuplement recevant les soins sylvicoles appropriées pour leur amélioration ou leur régénération.

Essences d'accompagnement : essences jouant un rôle cultural au profit des essences objectifs, notamment par le phénomène de compression, soit la contrainte exercée sur un arbre par la présence de ses voisins, entraînant des conséquences sur sa croissance et sa forme.

Étage d'un peuplement : strate de hauteur dans laquelle les arbres du peuplement se situent. Dans un peuplement irrégulier, les arbres ont des hauteurs différentes et occupent alors plusieurs étages : dominant, intermédiaire et le sous-étage.

Houppier : partie supérieure de l'arbre formée de branches et des rameaux qui sont portés par le tronc.

Martelage : opération qui consiste, avant la coupe, à désigner et à marquer à l'aide d'un marteau, des arbres destinés à être vendus, abattus ou réservés, quelque soit la nature de la coupe.

Mise à blanc : exploitation portant sur la totalité des arbres d'une parcelle ou d'un peuplement.

Régénération artificielle : processus de reconstitution d'une forêt ou d'une partie d'une forêt à la faveur d'interventions humaines de semage ou de plantation.

Régénération naturelle : régénération issue des semenciers par semis ou rejets spontanés.

Rotation : intervalle de temps séparant 2 passages successifs d'une coupe au même endroit.

Semencier : arbre isolé ou en peuplement, conservé pour sa production de graines afin de renouveler un peuplement.

Structure diamétrale : Organisation des arbres d'un peuplement et leur répartition par diamètre sur une unité de gestion donnée.

Surface terrière (G) : somme des surfaces des sections d'arbres sur pied supposé circulaire et présumé coupé à 1,30m ou 1,50m de hauteur. Elle s'exprime en m²/ha et caractérise la densité et la compétition entre les arbres d'un peuplement.

Sylviculture mélangée à couvert continu (SMCC) : sylviculture tendant à optimiser le traitement des écosystèmes forestiers, afin qu'ils remplissent de manière durable et rentable leurs multiples fonctions socio-économiques, et en premier lieu leur fonction de production de bois de qualité.

Dans le but de minimiser les risques écologiques et économiques, cette sylviculture s'appuie très largement sur les processus naturels. Les traitements appliqués sont donc basés sur la continuité du couvert et le respect des processus naturels de croissance et de renouvellement de la forêt.

Trouée : surface à découvert, d'accès direct à la lumière, par prélèvement des arbres dont la hauteur gêne l'éclairement au sol.

Typologie : démarche méthodique consistant à définir ou étudier un ensemble de types, afin de faciliter l'analyse, la classification et l'étude de réalités complexes.

Végétation concurrente : ensemble de la végétation herbacée (ronce, fougère, clématite, chèvrefeuille) faisant de la compétition aux espèces ligneuses.