Adjusted: Covariate−residual cytokines

MAD ratio > 1 indicates greater variability in Food−diverse; Brown−Forsythe p−values with BH−FDR

SCF p=0.058 FDR=0.291
GRO.. p=0.432 FDR=0.648
TNF.. p=0.040 FDR=0.291
Eotaxin p=0.038 FDR=0.291
IL.1. p=0.048 FDR=0.291
MCP.3 p=0.055 FDR=0.291
VEGF p=0.053 FDR=0.291
IL.4 p=0.083 FDR=0.361
SCGF.. p=0.280 FDR=0.538
IL.9 p=0.302 FDR=0.558
IL.15 p=0.061 FDR=0.291
IL.7 p=0.010 FDR=0.291
..NGF p=0.044 FDR=0.291
MIP.1. p=0.581 FDR=0.734
IL.13 p=0.050 FDR=0.291
PDGF.BB p=0.183 FDR=0.419
Basic.FGF p=0.469 FDR=0.682
GM.CSF p=0.236 FDR=0.472
IL.12..p70. p=0.139 FDR=0.395
IL.6 p=0.174 FDR=0.419
M.CSF p=0.509 FDR=0.719
G.CSF p=0.120 FDR=0.395
IL.1ra p=0.326 FDR=0.580
IL.12..p40. p=0.549 FDR=0.732
IL.10 p=0.572 FDR=0.734
TNF.. p=0.750 FDR=0.864
RANTES p=0.176 FDR=0.419
SDF.1. p=0.135 FDR=0.395
IL.2 p=0.140 FDR=0.395
IL.5 p=0.805 FDR=0.879
IL.2R. p=0.775 FDR=0.865
IL.1. p=0.208 FDR=0.434
IL.3 p=0.134 FDR=0.395
MIP.1. p=0.404 FDR=0.625
MIF p=0.345 FDR=0.589
MIG p=0.994 FDR=0.994
IP.10 p=0.839 FDR=0.894
LIF p=0.170 FDR=0.419
IL.16 p=0.873 FDR=0.911
HGF p=0.368 FDR=0.589
IL.18 p=0.978 FDR=0.994
IL.17 p=0.101 FDR=0.395
CTACK p=0.622 FDR=0.746
IFN.. p=0.756 FDR=0.864
MCP.1 p=0.359 FDR=0.589
TRAIL p=0.617 FDR=0.746
IL.8 p=0.201 FDR=0.434
IFN..2 p=0.528 FDR=0.724

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

MAD ratio: Food−diverse / Food−limited