After: Stage 1 outliers excluded

MAD ratio > 1 indicates greater variability in Food−diverse; Brown−Forsythe p−values with BH−FDR

IL.3 p=0.051 FDR=0.187
SCF p=0.040 FDR=0.187
IL.15 p=0.056 FDR=0.187
TNF.. p=0.003 FDR=0.143
IL.13 p=0.062 FDR=0.187
IL.2 p=0.009 FDR=0.143
MIP.1. p=0.391 FDR=0.504
MCP.3 p=0.015 FDR=0.143
GRO.. p=0.083 FDR=0.201
Eotaxin p=0.027 FDR=0.172
SCGF.. p=0.113 FDR=0.226
RANTES p=0.136 FDR=0.261
IFN.. p=0.696 FDR=0.759
VEGF p=0.145 FDR=0.267
IL.4 p=0.056 FDR=0.187
..NGF p=0.012 FDR=0.143
IL.9 p=0.095 FDR=0.217
IL.6 p=0.032 FDR=0.172
IL.5 p=0.113 FDR=0.226
PDGF.BB p=0.106 FDR=0.226
M.CSF p=0.235 FDR=0.376
IL.12..p70. p=0.066 FDR=0.187
MIP.1. p=0.764 FDR=0.797
GM.CSF p=0.250 FDR=0.387
IL.2R. p=0.170 FDR=0.293
MIF p=0.186 FDR=0.307
G.CSF p=0.077 FDR=0.201
SDF.1. p=0.047 FDR=0.187
IL.18 p=0.837 FDR=0.854
IP.10 p=0.420 FDR=0.504
IL.7 p=0.012 FDR=0.143
IL.17 p=0.063 FDR=0.187
IL.1. p=0.019 FDR=0.149
MCP.1 p=0.275 FDR=0.400
MIG p=0.940 FDR=0.940
TNF.. p=0.292 FDR=0.413
IL.12..p40. p=0.416 FDR=0.504
HGF p=0.740 FDR=0.790
CTACK p=0.171 FDR=0.293
LIF p=0.084 FDR=0.201
Basic.FGF p=0.263 FDR=0.394
IL.10 p=0.325 FDR=0.445
IL.1ra p=0.399 FDR=0.504
IL.16 p=0.584 FDR=0.667
IL.1. p=0.032 FDR=0.172
IFN..2 p=0.351 FDR=0.469
IL.8 p=0.535 FDR=0.626
TRAIL p=0.613 FDR=0.684

1
2
3

MAD ratio: Food−diverse / Food−limited