Before: All cytokines

MAD ratio > 1 indicates greater variability in Food−diverse; Brown−Forsythe p−values with BH−FDR

SCF p=0.060 FDR=0.310
IL.15 p=0.083 FDR=0.310
TNF.. p=0.035 FDR=0.310
IL.3 p=0.078 FDR=0.310
IL.13 p=0.052 FDR=0.310
IL.2 p=0.062 FDR=0.310
IL.4 p=0.147 FDR=0.391
MIP.1. p=0.572 FDR=0.747
Eotaxin p=0.078 FDR=0.310
GRO.. p=0.466 FDR=0.735
SCGF.. p=0.296 FDR=0.593
IFN.. p=0.922 FDR=0.922
RANTES p=0.236 FDR=0.492
VEGF p=0.084 FDR=0.310
IL.5 p=0.637 FDR=0.747
IL.9 p=0.365 FDR=0.649
MCP.3 p=0.048 FDR=0.310
GM.CSF p=0.220 FDR=0.492
..NGF p=0.042 FDR=0.310
MIP.1. p=0.653 FDR=0.747
G.CSF p=0.232 FDR=0.492
IL.6 p=0.108 FDR=0.347
MIF p=0.392 FDR=0.672
IL.12..p70. p=0.073 FDR=0.310
IL.12..p40. p=0.522 FDR=0.737
IL.2R. p=0.627 FDR=0.747
IP.10 p=0.750 FDR=0.804
PDGF.BB p=0.169 FDR=0.405
SDF.1. p=0.124 FDR=0.351
IL.7 p=0.021 FDR=0.310
IL.1ra p=0.585 FDR=0.747
MCP.1 p=0.494 FDR=0.737
IL.18 p=0.761 FDR=0.804
IL.1. p=0.057 FDR=0.310
CTACK p=0.563 FDR=0.747
M.CSF p=0.509 FDR=0.737
TNF.. p=0.676 FDR=0.755
IL.10 p=0.650 FDR=0.747
HGF p=0.432 FDR=0.715
IL.17 p=0.105 FDR=0.347
LIF p=0.123 FDR=0.351
IFN..2 p=0.360 FDR=0.649
Basic.FGF p=0.475 FDR=0.735
IL.16 p=0.869 FDR=0.888
MIG p=0.771 FDR=0.804
IL.8 p=0.360 FDR=0.649
IL.1. p=0.167 FDR=0.405
TRAIL p=0.654 FDR=0.747

1
2
3

MAD ratio: Food−diverse / Food−limited