

International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

Notice is hereby given that, in accordance with article 3 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances, the names given in the list on the following pages are under consideration by the World Health Organization as Proposed International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Proposed International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy.

Lists of Proposed (1–117) and Recommended (1–78) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 17, 2017* (available in CD-ROM only). The statements indicating action and use are based largely on information supplied by the manufacturer. **This information is merely meant to provide an indication of the potential use of new substances at the time they are accorded Proposed International Nonproprietary Names.** WHO is not in a position either to uphold these statements or to comment on the efficacy of the action claimed. Because of their provisional nature, these descriptors will neither be revised **nor included in the Cumulative Lists of INNs.**

Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

Il est notifié que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques les dénominations ci-dessous sont mises à l'étude par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales proposées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI proposées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie.

On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–117) et recommandées (1–78) dans la *Liste récapitulative No. 17, 2017* (disponible sur CD-ROM seulement). Les mentions indiquant les propriétés et les indications des substances sont fondées sur les renseignements communiqués par le fabricant. **Elles ne visent qu'à donner une idée de l'utilisation potentielle des nouvelles substances au moment où elles sont l'objet de propositions de DCI.** L'OMS n'est pas en mesure de confirmer ces déclarations ni de faire de commentaires sur l'efficacité du mode d'action ainsi décrit. En raison de leur caractère provisoire, ces informations **ne figureront pas dans les listes récapitulatives de DCI.**

Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

De conformidad con lo que dispone el párrafo 3 del "Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas", se comunica por el presente anuncio que las denominaciones detalladas en las páginas siguientes están sometidas a estudio por la Organización Mundial de La Salud como Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas. La inclusión de una denominación en las listas de las DCI

Propuestas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia.

Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–117) y Recomendadas (1–78) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 17, 2017* (disponible sólo en CD-ROM). Las indicaciones sobre acción y uso que aparecen se basan principalmente en la información facilitada por los fabricantes. **Esta información tiene por objeto dar una idea únicamente de las posibilidades de aplicación de las nuevas sustancias a las que se asigna una DCI Propuesta.** La OMS no está facultada para respaldar esas indicaciones ni para formular comentarios sobre la eficacia de la acción que se atribuye al producto. Debido a su carácter provisional, esos datos descriptivos **no deben incluirse en las listas recapitulativas de DCI.**

Proposed International Nonproprietary Names: List 129

Comments on, or formal objections to, the proposed names may be forwarded by any person to the INN Programme of the World Health Organization within four months of the date of their publication in *WHO Drug Information*, i.e., for **List 129 of Proposed INN not later than 3 December 2023. Publication date: 04.08.2023**

Dénominations communes internationales proposées: Liste 129

Des observations ou des objections formelles à l'égard des dénominations proposées peuvent être adressées par toute personne au Programme des Dénominations communes internationales de l'Organisation mondiale de la Santé dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur publication dans *WHO Drug Information*, c'est à dire pour la **Liste 129 de DCI Proposées le 3 décembre 2023 au plus tard. Date de publication : 04.08.2023**

Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas: Lista 129

Cualquier persona puede dirigir observaciones u objeciones respecto de las denominaciones propuestas, al Programa de Comunes Internacionales de la Organización Mundial de la Salud, en un plazo de cuatro meses, contados desde la fecha de su publicación en *WHO Drug Information*, es decir, para **la Lista 129 de DCI Propuestas el 3 de Diciembre de 2023 a más tardar.**

Fecha de publicación: 04.08.2023

<i>Proposed INN</i> (Latin, English, French, Spanish)	<i>Chemical name or description: Action and use: Molecular formula</i> <i>Chemical Abstracts Service (CAS) registry number:</i> <i>Graphic formula</i>
<i>DCI Proposée</i>	<i>Nom chimique ou description: Propriétés et indications: Formule brute</i> <i>Numéro dans le registre du CAS: Formule développée</i>
<i>DCI Propuesta</i>	<i>Nombre químico o descripción: Acción y uso: Fórmula molecular</i> <i>Número de registro del CAS: Fórmula desarrollada</i>

abefolastatum tesaroxetanum
abefolastat tesaroxetan

(3S,3'S,7S,7'S,23R,23'R,26R,26'R)-32,32'-
[(3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosane-1,8-
diyl)bis(azanediy)]bis(23,26-dibenzyl-
5,13,22,25,28,32-hexaoxo-4,6,12,21,24,27-
hexaazadotriacontane-1,3,7-tricarboxylic) acid
diagnostic agent, antineoplastic

abéfolastat tésaroxétán


acide (3*S*,3'*S*,7*S*,7'*S*,23*R*,23'*R*,26*R*,26'*R*)-32,32'-
 [(3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosane-1,8-
 diyl)bis(azanediyl)]bis(23,26-dibenzyl-5,13,22,25,28,32-
 hexaoxo-4,6,12,21,24,27-hexaazadotriacontane-1,3,7-
 tricarboxylique)
agent diagnostique, antinéoplasique

abefolastat tesaroxetán

ácido (3*S*,3'*S*,7*S*,7'*S*,23*R*,23'*R*,26*R*,26'*R*)-32,32'-
 [(3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosano-1,8-
 diil)bis(azanodiil)]bis(23,26-dibencil-5,13,22,25,28,32-
 hexaoxo-4,6,12,21,24,27-hexaazadotriacontano-1,3,7-
 tricarboxílico)
agente de diagnóstico, antineoplásico

C₁₀₀H₁₅₀N₂₀O₂₄

2254661-83-9



abiprubartum #
 abiprubart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD40
 (TNFRSF5, tumor necrosis factor receptor (TNFR)
 superfamily member 5, p50)], humanized monoclonal
 antibody;
 gamma4 heavy chain humanized (1-441) [VH (*Homo sapiens*
 IGHV1-3*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-
 IMGT [8.8.7] (26-33.51-58.97-103)) (1-114)-*Homo sapiens*
 IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (115-212),
 hinge 1-12 S10>P (222) (213-224), CH2 L92 (303) (225-
 334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (115-441)], (128-213')-
 disulfide with kappa light chain humanized (1'-213') [V-
 KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-11*01 (82.1%) -IGKJ4*01
 (91.7%), CDR-IMGT [5.3.9] (27'-31'.49'-51'.88'-96'') (1'-106')
 -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (152'), V101
 (190') (107'-213')]; dimer (220-220":223-223")-bisdisulfide,
 produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, derived
 from the cell line CHO-DG44, glycoform alfa
immunosuppressant

abiprubart

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD40
 (TNFRSF5, membre 5 de la superfamille des récepteurs des
 facteurs de nécrose tumorale (TNFR), p50], anticorps
 monoclonal humanisé;

chaîne lourde gamma4 humanisée (1-441) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-3*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.7] (26-33.51-58.97-103)) (1-114)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (115-212), charnière 1-12 S10>P (222) (213-224), CH2 L92 (303) (225-334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (115-441)], (128-213')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-213') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-11*01 (82.1%) -IGKJ4*01 (91.7%), CDR-IMGT [5.3.9] (27'-31'.49'-51'.88'-96')) (1'-106') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (152'), V101 (190') (107'-213')]; dimère (220-220":223-223")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), dérivant de la lignée cellulaire CHO-DG44, glycoforme alfa immunosupprimeur

abiprubart

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD40 (TNFRSF5, miembro 5 de la superfamilia de los receptores de los factores de necrosis tumoral (TNFR), p50], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma4 humanizada (1-441) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-3*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.7] (26-33.51-58.97-103)) (1-114)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (115-212), bisagra 1-12 S10>P (222) (213-224), CH2 L92 (303) (225-334), CH3 (335-439), CHS (440-441)) (115-441)], (128-213')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-213') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-11*01 (82.1%) -IGKJ4*01 (91.7%), CDR-IMGT [5.3.9] (27'-31'.49'-51'.88'-96')) (1'-106') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (152'), V101 (190') (107'-213')]; dímero (220-220":223-223")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular derivada de CHO-DG44, forma glicosilada alfa immunosupresor

2765071-95-0

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGYTFT	NYWMHWVRQA	PGQRLEWIGY	50
INPSNDYTKY	NQKFKDRATL	TADKSANTAY	MELSSLRSED	TAVYYCARQG	100
FPTWGGGTLV	TVSSASTKGP	SVFPLAPCSR	STSESTAALG	CLVKDYFPEP	150
VTVSWNSGAL	TSGVHTFFPAV	LQSSGLYLSL	SVTVTPSSSL	GTKTYTCNVD	200
HKPSNTKVDK	RVESKYGPCC	PPCPAPEFLG	GPSVFLFPFK	PKDTLMISRT	250
PEVTCVVVDV	SQEDPEVQFN	WYVDGVEVHN	AKTKPREEQF	NSTYRVVSVL	300
TVLHQDWLNG	KEYCKVSNK	GLPSSIEKTI	SKAKGPQREP	QVYTLPPSQE	350
EMTKNQVSLT	CLVKGFYPSD	IAVEWESNGQ	PENNNKTTTP	VLDSDGSFFL	400
YSRLTVDKSR	WQEGNVFSCS	VMHEALHNHY	TQKSLSLSPG	K	441

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

EIVLTQSPAT	LSLSPPERAT	LSCSASSSVS	YMHVYQKQPG	QAPRRWIYDT	50
SKLASGVPAR	FSGSGSGTDY	TLTISSLEPE	DFAVYVCHQL	SSDPFTFGGG	100
TKVEIKRTVA	APSVFIFFPS	DEQLKSGTAS	VVCLLNNFYP	REAKVQWKVD	150
NALQSGNSQE	SVTEQDSKDS	TYSLSSTLTL	SKADYEKKHV	YACEVTHQGL	200
SSPVTKSFNR	GEC				213

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22"-96"	141"-197"	255"-315"	361"-419"
	22"-96"	141"-197"	255"-315"	361"-419"
Intra-L (C23-C104)	23"-87"	133"-193"		
	23"-87"	133"-193"		

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 128"-213" 128"-213"

Inter-H-H (h 8, h 11) 220-220" 223-223"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /

Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxoprolyle) /

piroglutamilo (pE, 5-oxoprolylo)

H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 291, 291"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal

H CHS K2: 441, 441"

alexatatumum #

alexatatum

immunoglobulin G1-lambda7, anti-[*Homo sapiens* tumor-restricted extracellular ribonucleoprotein (RNP) complex containing PABPC1 (polyadenylate-binding protein cytoplasmic 1, PABP1) bound to poly(A)RNA], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain *Homo sapiens* (1-469) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-15*02 (95.0%) -(IGHD) -IGHJ6*04 (85.0%), CDR-IMGT [8.10.31] (26-33.51-60.99-129)) (1-140) -*Homo sapiens*IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14 (CH1 R120 (237) (141-238), hinge 1-15 (239-253), CH2 (254-363), CH3 E12 (379), M14 (381) (364-468), CHS K2>del (469)) (141-469)], (243-215')- disulfide with lambda7 light chain *Homo sapiens* (1'-216') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-47*01 (93.8%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [8.3.11] (26'-33'.51'-53'.90'-100')) (1'-110') - *Homo sapiens* IGLC7*01 (100%) (111'-216')]; dimer (249-249":252-252")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, glycoform alfa

antineoplastic

alexatatum

immunoglobuline G1-lambda7, anti-[*Homo sapiens* complexe ribonucléoprotéique (RNP) extracellulaire et restreint à la tumeur contenant PABPC1 (protéine cytoplasmique 1 fixant le polyadénylate, PABP1) liée à l'ARNpoly(A)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*; chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens* (1-469) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-15*02 (95.0%) -(IGHD) -IGHJ6*04 (85.0%), CDR-IMGT [8.10.31] (26-33.51-60.99-129)) (1-140) -*Homo sapiens*IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14 (CH1 R120 (237) (141-238), charnière 1-15 (239-253), CH2 (254-363), CH3 E12 (379), M14 (381) (364-468), CHS K2>del (469)) (141-469)], (243-215')- disulfure avec la chaîne légère lambda7 *Homo sapiens* (1'-216') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-47*01 (93.8%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [8.3.11] (26'-33'.51'-53'.90'-100')) (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC7*01 (100%) (111'-216')]; dimère (249-249":252-252")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa

antineoplasique

alexatatum

inmunoglobulina G1-lambda7, anti-[*Homo sapiens* complejo ribonucleoproteico (RNP) extracelular y restringido al tumor que contiene PABPC1 (proteína citoplasmática 1 que fija el poliadenilato, PABP1) de unión al ARNpoli(A)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*; cadena pesada gamma1 *Homo sapiens* (1-469) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-15*02 (95.0%) -(IGHD) -IGHJ6*04 (85.0%), CDR-IMGT [8.10.31] (26-33.51-60.99-129)) (1-140) -*Homo sapiens*IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14 (CH1 R120 (237) (141-238), bisagra 1-15 (239-253), CH2 (254-363), CH3 E12 (379), M14 (381) (364-468), CHS K2>del (469)) (141-469)], (243-215')- disulfuro con la cadena ligera lambda7 *Homo sapiens* (1'-216') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-47*01 (93.8%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [8.3.11] (26'-33'.51'-53'.90'-100')) (1'-110') -*Homo sapiens* IGLC7*01 (100%) (111'-216')]; dímero (249-249":252-252")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, forma glicosilada alfa

antineoplásico

2768264-93-1

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFS KAWMSWVRQA PGKGLEWVGR 50
IKSVTDGETT DYAAPVKGRF TISRDDSKST LYLQMNLSKT EDTAVVYCTS 100
SFCCRGGSCP SHDTSYCGGQ YKSYYYMDVW GKGTTVTVSS ASTKGPSVFP 150
LAPSSKSTSG GTAALGCLVK DYFFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS 200
GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT YICNVNHKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP 250
PCPAPELLGG PSVFLFPPPK KDTLMISRTF EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW 300
YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLGQDVLNGK EYKCKVSNKA 350
LPAPIEKTTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI 400
AVEWESNGQP ENNYKTTTPFV LDSGDGFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV 450
MHEALHNHYT QKSLSLSPG 469

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
QSVLTQPPSA SGTPEGQRTI SCSGSSSNIG SSSVSWYQQL PGTAPKLLIY 50
KNNQRPSGVP DRFSGSKSGT SASLAISGLR SEDEADYYCS TWDDSLSVRV 100
FGGGTKLTVL GQPKAAPSVT LFPPSSEELQ ANKATLVCLV SDFYPGAVTV 150
AWKADGPSVK VGVETTKPSK QSNNKYAASS YLSLTPEQWK SHRSYSCRVT 200
HEGSTVEKTV APAECS 216

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22"-98" 167"-223" 284-344 390-448
22"-98" 167"-223" 284"-344" 390"-448"
Intra-H CDR3-IMGT* 103-117 104-109
103"-117" 104"-109"
Intra-L (C23-C104) 22"-89" 138"-197"
22"-89" 138"-197"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 243-215" 243"-215"
Inter-H-H (h 11, h 14) 249-249" 252-252"
* Additional disulfide bridges CDR3-IMGT numbering: 109-112.7, 110-111.4

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
L VL V-LAMBDA Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 320, 320"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

alisvetcelum
alisvetcel

equine allogeneic chondrogenic-induced mesenchymal stromal/stem cells (MSCs), isolated from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) collected from donor horses. The MSCs are selected for by growing the PBMCs in media containing fetal bovine serum (FBS) and dexamethasone. The cells are then expanded in media containing FBS, and prior to differentiation towards chondrocytes by growth in media containing FBS, transforming growth factor beta-3 (TGF-β3) and insulin-like growth factor I (IGF-I).


The final cells have a cobblestone morphology, express cellular surface markers CD90 (≥95%) and CD40 (≥85%) and are negative for MHC class II expression (≤2%). The cells secrete prostaglandin E2 (PGE2) and upregulate the cartilage oligomeric matrix protein (COMP) gene (>2.6 fold). The homogenous adhesion of the cells to cartilage lesions is measured using *ex vivo* cartilage explants

cell therapy (veterinary use)

alisvetcel

cellules souches/stromales mésenchymateuses (CSM) allogènes équines induites par chondrogenèse, isolées à partir de cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC) prélevées sur des chevaux donneurs. Les CSM sont sélectionnées en cultivant les PBMC dans un milieu contenant du sérum bovin fœtal (FBS) et de la dexaméthasone. Les cellules sont ensuite amplifiées dans un milieu contenant du FBS, et avant la différenciation en chondrocytes par croissance dans un milieu contenant du FBS,

	du facteur de croissance transformant bêta-3 (TGF-β3) et du facteur de croissance analogue à l'insuline I (IGF-I). Les cellules finales ont une morphologie en forme de pavé, expriment les marqueurs de surface cellulaire CD90 (≥95%) et CD40 (≥85%) et sont négatives pour l'expression du CMH de classe II (≤2%). Les cellules sécrètent de la prostaglandine E2 (PGE2) et régulent à la hausse le gène de la protéine de la matrice oligomérique du cartilage (COMP) (>2.6 fois). L'adhésion homogène des cellules aux lésions cartilagineuses est mesurée en utilisant des explants de cartilage <i>ex vivo</i> <i>thérapie cellulaire (usage vétérinaire)</i>
alisvetcel	células madre/estromales mesenquimales (MSC) equinas, alogénicas, inducidas a condrogenia, aisladas de células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) recogida de caballos donantes. Las MSCs se seleccionan mediante crecimiento de las PBMCs en medio que contiene suero bovino fetal (FBS) y dexametasona. Las células se expanden después en medio que contiene FBS, y antes de la diferenciación hacia condrocitos mediante crecimiento en medio que contiene FBS, factor de crecimiento transformante beta-3 (TGF-β3) y factor de crecimiento similar a insulina I (IGF-I). Las células finales tienen una morfología de empedrado, expresan los marcadores de superficie CD90 (≥95%) y CD40 (≥85%) y son negativas para MHC de clase II (≤2%). Las células secretan prostaglandina E2 (PGE2) y sobre regulan el gen de la proteína de matriz oligomérica del cartílago (COMP) (>2.6 veces). La adhesión homogénea de las células a lesiones de cartílago se mide usando explantes de cartílago <i>ex vivo</i> <i>terapia celular (uso veterinario)</i>
aneratriginum aneratrigrine	5-chloro-2-fluoro-4-(4-fluoro-2-{methyl[2-(methylamino)ethyl]amino}anilino)-N-(1,3-thiazol-4-yl)benzene-1-sulfonamide <i>sodium channel protein type 9 subunit alpha blocker</i>
anéatrigrine	5-chloro-2-fluoro-4-(4-fluoro-2-{méthyl[2-(méthylamino)éthyl]amino}anilino)-N-(1,3-thiazol-4-yl)benzène-1-sulfonamide <i>bloqueur de la sous-unité alpha des canaux sodiques de type 9</i>
aneratrigrina	5-cloro-2-fluoro-4-(4-fluoro-2-{metil[2-(metilamino)etil]amino}anilino)-N-(1,3-tiazol-4-il)benceno-1-sulfonamida <i>bloqueante del subunidad alfa de los canales del sodio de tipo 9</i>
	C₁₉H₂₀ClF₂N₅O₂S₂ 2097163-74-9



arbemnifosbuvirum

arbemnifosbuvir

propan-2-yl *N*-[(*P*^{6'}*R*,2'*R*)-2-amino-2'-deoxy-2'-fluoro-*N*⁶,2'-dimethyl-*O*^{*P*}-phenyl-5'-adenylyl]-L-alaninate
antiviral

arbemnifosbuvir


N-[(*P*^{6'}*R*,2'*R*)-2-amino-2'-désoxy-2'-fluoro-*N*⁶,2'-diméthyl-*O*^{*P*}-phényl-5'-adénylyl]-L-alaninate de propan-2-yle
antiviral

arbemnifosbuvir

N-[(*P*^{6'}*R*,2'*R*)-2-amino-2'-desoxi-*O*^{*P*}-fenil-2'-fluoro-*N*⁶,2'-dimetil- 5'-adenilil]-L-alaninato de propan-2-ilo
antiviral

C₂₄H₃₃FN₇O₇P

1998705-63-7

**avenciguatum**

avenciguat

1⁵-ethoxy-3³,6⁵-dimethyl-4-oxa-6(6,2)-isoquinolina-2(2,6)-pyridina-1(1)-pyrazola-7(4)-oxana-3(1,2)-benzenaheptaphane-1⁴-carboxylic acid
guanylate cyclase activator

avenciguat


acide 1⁵-éthoxy-3³,6⁵-diméthyl-4-oxa-6(6,2)-isoquinoléina-2(2,6)-pyridina-1(1)-pyrazola-7(4)-oxana-3(1,2)-benzénaheptaphane-1⁴-carboxylique
activateur de la guanylate cyclase

avenciguat

ácido 1⁵-etoxi-3³,6⁵-dimetil-4-oxa-6(6,2)-isoquinoleína-2(2,6)-piridina-1(1)-pirazola-7(4)-oxana-3(1,2)-bencenaheptafano-1⁴-carboxílico
activador de la guanilato ciclase

C₃₄H₃₈N₄O₅

1579514-06-9



bavtavinum

bavtavirine

4-[(4-amino-8-{4-[(1*E*)-2-cyanoethen-1-yl]-2,6-dimethylphenyl}quinazolin-2-yl)amino]benzonitrile
antiviral

bavtavirine


4-[(4-amino-8-{4-[(1*E*)-2-cyanoéthén-1-yl]-2,6-diméthylphényl}quinazolin-2-yl)amino]benzonitrile
antiviral

bavtavirina

4-[(4-amino-8-{4-[(*E*)-2-cianoeten-1-il]-2,6-dimetilfenil}quinazolin-2-il)amino]benzonitrilo
antiviral

C₂₆H₂₀N₆

1956373-71-9

**bemfivastatinum**

bemfivastatin

(3*R*,5*R*)-7-[2-(4-fluorophenyl)-4-{[4-(hydroxymethyl)phenyl]carbamoyl}-3-phenyl-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid
antihyperlipidaemic

bemfivastatine


acide (3*R*,5*R*)-7-[2-(4-fluorophényl)-4-{[4-(hydroxyméthyl)phényl]carbamoyl}-3-phényl-5-(propan-2-yl)-1*H*-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoïque
antihyperlipédiant

bemfivastatina

ácido (3*R*,5*R*)-7-[3-fenil-2-(4-fluorofenil)-4-{[4-(hidroximetil)fenil]carbamoil}-5-(propan-2-il)-1*H*-pirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoico
antihiperlipémico

C₃₄H₃₇FN₂O₆

805241-79-6

**bemiltenasum alfa #**

bemiltenase alfa

Daboia siamensis metalloproteinase (human coagulation factor X-activating enzyme, RVV-X, russellysin, snake venom metalloproteinase (SVMP), EC 3.4.24.58), natural variant)
covalent heterotrimer with alpha heavy chain

(GenBank ID: AUF41652.1; 1-431, containing a metalloproteinase domain, a disintegrin (platelet aggregation inhibitor) domain and a cysteine-rich region) disulfide-bridged to beta light chain (GenBank ID: AUF41655; 1-135, C-type lectin-like domain) disulfide-bridged to gamma light chain (GenBank ID: AAB22478.1; 1-123, C-type lectin-like domain), purified from the venom of *Daboia siamensis*, glycoform alfa
haemostatic

bémilténase alfa

métalloprotéinase de *Daboia siamensis* (enzyme activant le facteur humain de coagulation X, RVV-X, russellysine, métalloprotéinase du venin de serpent (SVMP), EC 3.4.24.58), variant naturel, hétérotrimère covalent avec chaîne lourde alpha (GenBank ID: AUF41652.1; 1-431, contenant un domaine métalloprotéinase, un domaine désintégrine (inhibiteur de l'agrégation plaquettaire) et une région riche en cystéine) réuni par un pont disulfure à la chaîne légère bêta (GenBank ID: AUF41655; 1-135, domaine de type lectine) réuni par un pont disulfure à la chaîne légère gamma (GenBank ID: AAB22478.1; 1-123, domaine similaire à la lectine de type C), purifié à partir du venin de *Daboia siamensis*, glycoforme alfa
hémostatique

bemiltenasa alfa

Daboia siamensis metaloproteinasa (factor X de coagulación humano-activador de la enzima, RVV-X, russellisina, metaloproteinasa de veneno de serpiente (SVMP), EC 3.4.24.58), variante natural, heterotrímtero covalente con cadena pesada alfa (GenBank ID: AUF41652.1; 1-431, que contiene un dominio de metaloproteinasa, un dominio de desintegrina (inhibidor de la agregación plaquetaria) y una región rica en cisteína) unido a través de un puente disulfuro a la cadena ligera beta (GenBank ID: AUF41655; 1-135, dominio de tipo C similar a la lectina) unido a través de un puente disulfuro a la cadena ligera gamma (GenBank ID: AAB22478.1; 1-123, dominio de tipo C similar a la lectina), purificado del veneno de *Daboia siamensis*, forma glicosilada alfa
hemostático

2766038-73-5

Sequence / Séquence / Secuencia

alpha heavy chain (H)

LVATSAQFNK	AFIELIIIVD	HSMAKKCNST	ATNTRIYEIV	NSANEIFNPL	50
NIHVTLLIGVE	FWCDRLINV	TSSADETLDS	FGEWRAEDLM	TRKSHDNALL	100
FTDMRFDLNT	LGITFLAGMC	QAYRSVGIVQ	VQGNRRNFKA	VIMAHLSHN	150
LGMYHDGKNC	ICNDSSCVMS	PVLSQPSKL	FSNCSIHDYQ	RYLTRYPKPC	200
ILYPLRKDI	VSPFVCGNEI	WEEGEECDGC	SPADQNPCC	DAATCKLKPG	250
AECGNGLCCY	QCKIKTAGTV	RRARNECDV	PEHCTGQSAE	CPRDQLQQNG	300
QPCQNNRGYC	YNGDCPIMRN	QCISLFGSRA	NVAKDSCFQE	NLKGSIYYGVC	350
RKENGKRKIPC	APQDVKCGRL	FCLNNSPGNK	NPCNMHYSYM	DQHKGMVDPG	400
TKCEDGKVCN	NKRQCVDVNT	AYQSTTGFSQ	I		431

beta light chain (L')

GLDCPPDSSL	YRYFCYRVFK	EHKTWAAER	FCMEHPNNGH	LVSVESMEEA	50
EFVAKLLSNI	TEKFITHFWI	GLMIKDKEQE	CSSEWSDGSS	VSYDNLDKRE	100
FRKCFVLEKE	SGYRMWFNRN	CEERYLFVCK	VPPEC		135

gamma light chain (L'')

VLDPCSGWLS	YEQHCYKGFN	DLKNWTDAEK	FCTEQKKGSH	LVSLHSREEE	50
EFVVNLISEN	LEYPATWIGL	GNMWKDCRME	WSDRGNVKYG	ALAEESYCLI	100
MITHEKEWKS	MTCNFIAPVV	CKF			123

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-alpha H chain: 120-200, 160-184, 162-167, 322-372, 337-383, 350-360, 403-415

Intra-beta L chain: 4'-15', 32'-129', 104'-121'

Intra-gamma L chain: 4"-15", 32"-121", 98"-113"

Inter-alpha H chain - beta L chain: 389-135'

Inter-beta L chain - gamma L chain: 81'-77"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

alpha H chain: N28, N69, N163, N183

beta L chain: N59'

gamma L chain: N24"

bevemipretidum

bevemipretide

D-arginyl-*N*⁵-[(1*S*)-5-amino-1-(3-benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pentyl]-2,6-dimethyl-L-tyrosinamide
antioxydant

bévémiprétide


D-arginyl-*N*⁵-[(1*S*)-5-amino-1-(3-benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)pentyl]-2,6-diméthyl-L-tyrosinamide
antioxydant

bevemipretida

D-arginil-*N*⁵-[(1*S*)-5-amino-1-(3-bencil-1,2,4-oxadiazol-5-il)pentil]-2,6-dimetil-L-tirosinamida
antioxydante

C₃₁H₄₅N₉O₄

2356106-71-1

**bexicaserinum**

bexicaserin

(7*R*)-*N*-(2,2-difluoroethyl)-7-methyl-1,2,3,4,6,7-hexahydro[1,4]diazepino[6,7,1-*h*]indole-8-carboxamide
serotonin 5-HT2C receptor agonist

bexicasérine


(7*R*)-*N*-(2,2-difluoroéthyl)-7-méthyl-1,2,3,4,6,7-hexahydro[1,4]diazépino[6,7,1-*h*]indole-8-carboxamide
agoniste du récepteur 5-HT2C de la sérotonine

bexicaserina

(7*R*)-*N*-(2,2-difluoroetil)-7-metil-1,2,3,4,6,7-hexahidro[1,4]diazepino[6,7,1-*h*]indol-8-carboxamida
agonista del receptor 5-HT2C de la serotonina

C₁₅H₁₉F₂N₃O

2035818-24-5



bezetabartum #
bezetabart

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD74 (major histocompatibility complex class II invariant chain)], monoclonal antibody, modified at two specific positions with reactive 4-(azidomethyl)-L-phenylalanine residues; gamma1 heavy chain (1-454) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30-5*03 (95.9%) -IGHD) -IGHJ6*01 (93.8%), CDR-IMGT [8.8.16] (27-34.52-59.98-113)] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (221) (125-222), hinge 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365), F85.2>F (pAMF) (411) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-215')-disulfide with kappa light chain (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (92.6%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (28'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimer (233-233":236-236")-bisdisulfide, produced by a cell-free protein expression system based on *Escherichia coli* lysate, non-glycosylated, substituted at C-4 of the two L-phenylalanyl residues 411 and 411" with azidomethyl (*tazide*) groups
antineoplastic

bézétabart

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD74 (chaîne invariante du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II)], anticorps monoclonal, modifié sur deux positions spécifiques avec des résidus 4-(azidométhyl)-L-phénylalanine réactifs; chaîne lourde gamma1 (1-454) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30-5*03 (95.9%) -IGHD) -IGHJ6*01 (93.8%), CDR-IMGT [8.8.16] (27-34.52-59.98-113)] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (221) (125-222), charnière 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365), F85.2>F (pAMF) (411) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (92.6%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (28'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimère (233-233":236-236")-bisdisulfure, produit par un système acellulaire de l'expression des protéines à base de lysat d'*Escherichia coli*, non-glycosylé; substitué en C-4 des deux résidus L-phénylalanyle 411 et 411" avec des groupes azidométhyle (*tazide*)
antineoplasique

bezetabart

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD74 (cadena invariante del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II)], anticuerpo monoclonal, modificado en dos posiciones específicas con residuos 4-(azidometil)-L-fenilalanina reactivos; cadena pesada gamma1 (1-454) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30-5*03 (95.9%) -IGHD) -IGHJ6*01 (93.8%), CDR-IMGT [8.8.16] (27-34.52-59.98-113)] (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (221) (125-222), bisagra1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365), F85.2>F (pAMF) (411) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (92.6%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (28'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dímero (233-233":236-236")-bisdisulfuro, producido por un sistema de expresión de proteínas sin células basado en lisado de *Escherichia coli*, no glicosilado; substituida en C-4 de los dos residuos de L-fenilalanilo 411' y 411" con grupos azidometilo (*tazida*)
antineoplásico

2763746-69-4

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada		
MQVQLVESGG	GVVQPGRLR	LSCAASGFNF SDYGMHWVRQ APGKGLEWYA 50
VIWYDGSISY	YADSVKGRFT	ISRDNSKNTL YLQMNSLRAE DTAVYYCARG 100
GTVEHGAIVY	TDVWGGGTV	TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG 150
CLVKDYFPEP	VTVSWNSGAL	TSGVHTFPFV LQSSGLYSLV SVVTVPSSSL 200
GTQTYICNVN	HKPSNTKVDK	KVEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF 250
PPKPKDTLMI	SRTPEVTCVY	VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE 300
EQYNSTYRVV	SVLTVLHQDW	LNGKEYCKVY SNKALPAPIE KTISKAKGQP 350
REPQVYTLPP	SREEMTKNQV	SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT 400
TPPVLDSDGS	F FLYSKLTVD	KSRWQGNVVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL 450
SPGK		454

F non-natural amino acid *p*-azidomethyl-L-phenylalanine (pAMF) /
acide aminé non naturel *p*-azidométhyl-L-phénylalanine (pAMF) /
aminoácido no natural *p*-azidometil-L-fenilalanina (pAMF)


Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera				
MDIQTQSPS	SVSASVGRV	TITCRASQGI	GSWLAWYQQK	PGKAPKLLIY 50
AADRLQSGVP	SFSGSGSGT	DFTLTISLQ	PEDFATYYCQ	QYHTYPLTFG 100
GGTKVEIKRT	VAAPSVFIFP	PSDEQLKSGT	ASVVCLLNMF	YPREAKVQWK 150
VDNALQSGNS	QESVTEQDSK	DSTYLSSTLT	TLSKADYEKH	KVYACEVTHQ 200
GLSSPVTKSF	NRGEC			215

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 23-97 151-207 268-328 374-432
23"-97" 151"-207" 268"-328" 374"-432"
Intra-L (C23-C104) 24'-89' 135'-195'
24"-89" 135"-195"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 227-215' 227"-215"
Inter-H-H (h 11, h 14) 233-233" 236-236"

N-terminal methionine / Méthionine N-terminale / Metionina N-terminal
H VH M1.1: 1, 1"
L V-KAPPA M1.1: 1', 1"
No N-terminal methionine clipping (expressed in a cell-free expression system) / Pas de
coupure de la méthionine N-terminale (exprimé dans un système d'expression acellulaire /
Sin recorte de metionina N-terminal (expresado en un sistema de expresión libre de células)

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 304, 304"
Aglycosylated (expressed in a cell-free expression system) / aglycosylé (exprimé dans un système
d'expression acellulaire / aglicosilado (expresado en un sistema de expresión libre de células)

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados
H CH3 F85.2->**F** (pAMF): 411, 411"



bezetabartum debotansinum #
bezetabart debotansine

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD74 (major histocompatibility complex class II invariant chain)], monoclonal antibody, conjugated at C-4 of two specific phenylalanine residues with *N*²-deacetylmaytansine via a non cleavable linker;
gamma1 heavy chain (1-454) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30-5*03 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (93.8%), CDR-IMGT [8.8.16] (27-34.52-59.98-113)) (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (221) (125-222), hinge 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365), F85.2->**F** (pAMF) (411) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-215')-disulfide with kappa light chain (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (92.6%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (28'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimer (233-233":236-236")-bisdisulfide; produced by a cell-free protein expression system based on *Escherichia coli* lysate, non-glycosylated; substituted at C-4 of the L-phenylalanyl residues 411 and 411" with {8-[(2S)-1-[[[(1⁴S,1⁶S,2R,3²S,3³S,4S,10E,12E,14R)-8⁶-chloro-1⁴-hydroxy-

8⁵,14-dimethoxy-2,3³,7,10-tetramethyl-1²,6-dioxo-7-aza-1(6,4)-[1,3]oxazinana-3(2,3)-oxirana-8(1,3)-benzenacyclotetradecaphane-10,12-dien-4-yl]oxy]-2,3,9-trimethyl-1,4,8,24-tetraoxo-12,15,18,21-tetraoxa-3,9,25-triazaoctacosan-28-oyl]-8,9-dihydro-1H(or 3H)-dibenzo[b, f][1,2,3]triazolo[4,5-d]azocin-1(or 3)-yl]methyl
(*debotansine*) groups
antineoplastic

bézétabart débotansine

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD74 (chaîne invariante du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II)], anticorps monoclonal; conjugué en C-4 de deux résidus phénylalanine spécifiques avec N⁶-désacétylmaitansine via un linker non-clivable;
chaîne lourde gamma1 (1-454) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-30-5*03 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (93.8%), CDR-IMGT [8.8.16] (27-34.52-59.98-113)) (1-124) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (221) (125-222), charnière 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365), F85.2>F (pAMF) (411) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (92.6%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (28'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimère (233-233'':236-236'')-bisdisulfure, produit par un système acellulaire de l'expression des protéines à base de lysat de *Escherichia coli*, non-glycosylé; substitué en C-4 des résidus L-phénylalanyle 411 et 411" par des groupes {8-[(2S)-1-[[[(1⁴S,1⁶S,2R,3²S,3³S,4S,10E,12E,14R)-8⁶-chloro-1⁴-hydroxy-8⁵,14-diméthoxy-2,3³,7,10-tétraméthyl-1²,6-dioxo-7-aza-1(6,4)-[1,3]oxazinana-3(2,3)-oxirana-8(1,3)-benzénacyclotétradécaphane-10,12-diène-4-yl]oxy]-2,3,9-triméthyl-1,4,8,24-tétraoxo-12,15,18,21-tétraoxa-3,9,25-triazaoctacosan-28-oyl]-8,9-dihydro-1H(ou 3H)-dibenzo[b, f][1,2,3]triazolo[4,5-d]azocin-1(ou 3)-yl]méthyle (*débotansine*)
antineoplasique

bezetabart debotansina

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD74 (cadena invariante del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II)], anticuerpo monoclonal; conjugado en C-4 de dos residuos de fenilalanina específicos con N⁶-desacetilmaitansina a través de un enlace no escindible;
cadena pesada gamma1 (1-454) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-30-5*03 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (93.8%), CDR-IMGT [8.8.16] (27-34.52-59.98-113)) (1-124) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (221) (125-222), bisagra 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365), F85.2>F (pAMF) (411) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (92.6%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (28'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dímero (233-233'':236-236'')-bisdisulfuro, producido por un sistema de expresión de proteínas sin células basado en lisado de *Escherichia coli*, no glicosilado; substituido en C-4 de los residuos L-fenilalanilo 411 y 411" por los grupos {8-[(2S)-1-[[[(1⁴S,1⁶S,2R,3²S,3³S,4S,10E,12E,14R)-8⁶-cloro-1⁴-hidroxi-2,3³,7,10-tetrametil-8⁵,14-dimetoxi-1²,6-dioxo-7-aza-1(6,4)-[1,3]oxazinana-3(2,3)-oxirana-8(1,3)-bencenacyclotetradecafano-10,12-dien-4-il]oxi]-2,3,9-trimetil-1,4,8,24-tetraoxo-12,15,18,21-tetraoxa-3,9,25-triazaoctacosan-28-oil]-8,9-dihidro-1H(o 3H)-dibenzo[b, f][1,2,3]triazolo[4,5-d]azocin-1(u 3)-il]metilo (*debotansina*)
antineoplásico

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada	
MQVQLVESGG GVVQPGRSLR LSCAASGFNF SDYGMHWVRQ APGKGLEWVA	50
VIWYDGSISY YADSVKGRFT ISRDNSKNTL YLQMNSLRAE DTAVYYCARG	100
GTVEHGAVYG TDVWGQGTTV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG	150
CLVKDYFPPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTVPSSSL	200
GTQTYICNVN HKPSNTKVDK KVEPKSCDKT HTCPCCPAPE LLGGPSVFLF	250
PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE	300
EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP	350
REPQVYTLFP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PS DIAVEWES NGQPENNYKT	400
TPFVLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL	450
SPGK	454

E 4-debotansine-L-phenylalanine (pAMF) /
4-débotansine-L-phénylalanine (pAMF) /
4-debotansina-L-fenilalanina (pAMF)


Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera	
MDIQMTQSPS SVSASVGDV TITCRASQGI GSWLAWYQK PGKAPKLLIY	50
AADRLQSGVP SRFSGSGSGT DFTLTISLQ PEDFATYYCQ QYHTYPLTFG	100
GGTKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLNNF YPREAKVQWK	150
VNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKH KVYACEVTHQ	200
GLSSPVTKSF NRGE	215

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 23-97 151-207 268-328 374-432
23"-97" 151"-207" 268"-328" 374"-432"
Intra-L (C23-C104) 24'-89' 135'-195'
24"'-89"' 135"'-195"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 227-215' 227"-215"
Inter-H-H (h 11, h 14) 233-233" 236-236"

N-terminal methionine / Méthionine N-terminale / Metionina N-terminal
H VH M1.1: 1, 1"
L V-KAPPA M1.1: 1', 1"
No N-terminal methionine clipping (expressed in a cell-free expression system) /
Pas de coupure de la méthionine N-terminale (exprimé dans un système d'expression acellulaire /
Sin recorte de metionina N-terminal (expresado en un sistema de expresión libre de células)

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 304, 304"
Aglycosylated (expressed in a cell-free expression system) / aglycosylé (exprimé dans un système
d'expression acellulaire / aglicosilado (expresado en un sistema de expresión libre de células)

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados
H CH3 F85.2>**E** (pAMF): 411, 411"



bezisterim
bezisterim

17α-pregn-5-en-20-yne-3β,7β,17-triol
anti-inflammatory, immunomodulator

bézistérím


17α-prégn-5-én-20-yne-3β,7β,17-triol
anti-inflammatoire, immunomodulateur

bezisterim

17α-pregn-5-en-20-ino-3β,7β,17-triol
antiinflamatorio, inmunomodulador

$C_{21}H_{30}O_3$

1001100-69-1

**bimatoprostum grenodum**

bimatoprost grenod

(1*E*,3*S*)-1-((1*R*,2*R*,3*S*,5*R*)-2-[(2*Z*)-7-(éthylamino)-7-oxohept-2-én-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl)-5-phénylpent-1-én-3-yle 6-(nitrooxy)hexanoate
antiglaucoma

bimatoprost grénod


6-(nitrooxy)hexanoate de (1*E*,3*S*)-1-((1*R*,2*R*,3*S*,5*R*)-2-[(2*Z*)-7-(éthylamino)-7-oxohept-2-én-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl)-5-phénylpent-1-én-3-yle
antiglaucomeux

bimatoprost grenod

6-(nitrooxi)hexanoato de (1*E*,3*S*)-1-((1*R*,2*R*,3*S*,5*R*)-2-[(2*Z*)-7-(etilamino)-7-oxohept-2-en-1-yl]-3,5-dihydroxiciclopentil)-5-fenilpent-1-en-3-ilo
antiglaucoma

 $C_{31}H_{46}N_2O_8$

1194396-71-8

**bivamelagonum**

bivamelagon

N-((3*S*,5*S*)-1-[(3*S*,4*R*)-1-*tert*-butyl-4-(4-chlorophenyl)pyrrolidine-3-carbonyl]-5-(morpholine-4-carbonyl)pyrrolidin-3-yl)-2-méthyl-*N*-[(1*s*,4*s*)-4-méthylcyclohexyl]propanamide
melanocortin receptor agonist

bivamélagon

N-((3*S*,5*S*)-1-[(3*S*,4*R*)-1-*tert*-butyl-4-(4-chlorophényl)pyrrolidine-3-carbonyl]-5-(morpholine-4-carbonyl)pyrrolidin-3-yl)-2-méthyl-*N*-[(1*s*,4*s*)-4-méthylcyclohexyl]propanamide
agoniste du récepteur de la mélanocortine


bivamelagón

N-{[(3*S*,5*S*)-1-[(3*S*,4*R*)-1-*tert*-butil-4-(4-clorofenil)pirrolidina-3-carbonil]-5-(morfolina-4-carbonil)pirrolidin-3-il]-2-metil-*N*-[(1*s*,4*s*)-4-metilciclohexil]propanamida

agonista del receptor de melanocortina

C₃₅H₅₃ClN₄O₄

2641595-54-0

**bleximenibum**

bleximenib

N-ethyl-5-fluoro-2-[[5-(2-[(3*R*)-6-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]-2-methylhexan-3-yl)-2,6-diazaspiro[3.4]octan-6-yl)-1,2,4-triazin-6-yl]oxy]-*N*-(propan-2-yl)benzamide

antineoplastic

bleximénib

N-éthyl-5-fluoro-2-[[5-(2-[(3*R*)-6-[(2-méthoxyéthyl)(méthyl)amino]-2-méthylhexan-3-yl)-2,6-diazaspiro[3.4]octan-6-yl)-1,2,4-triazin-6-yl]oxy]-*N*-(propan-2-yl)benzamide

antinéoplasique


bleximenib

N-etil-5-fluoro-2-[[5-(2-[(3*R*)-6-[metil(2-metoxietil)amino]-2-metilhexan-3-il]-2,6-diazaspiro[3.4]octan-6-il)-1,2,4-triazin-6-il]oxi)-*N*-(propan-2-il)benzamida

antineoplásico

C₃₂H₅₀FN₇O₃

2654081-35-1



bocodepsinum

bocodepsin

S-[(3*E*)-4-[(6*S*,9*S*)-12,12-dimethyl-4,8,11,14-tetraoxo-9-(propan-2-yl)-7-oxa-3,10,13-triaza-1(2,4)-[1,3]thiazolacyclotetradecaphan-6-yl]but-3-en-1-yl]
(2*S*)-2-amino-3-methylbutanethioate
antineoplastic

bocodepsine


(2*S*)-2-amino-3-méthylbutanethioate de S-[(3*E*)-4-[(6*S*,9*S*)-12,12-diméthyl-4,8,11,14-tétraoxo-9-(propan-2-yl)-7-oxa-3,10,13-triaza-1(2,4)-[1,3]thiazolacyclotétradécapan-6-yl]but-3-én-1-yle]
antinéoplasique

bocodepsina

(2*S*)-2-amino-3-metilbutanotioato de S-[(3*E*)-4-[(6*S*,9*S*)-12,12-dimetil-4,8,11,14-tetraoxo-9-(propan-2-il)-7-oxa-3,10,13-triaza-1(2,4)-[1,3]thiazolaciclótetradecafan-6-il]but-3-en-1-ilo]
antineoplásico

 $C_{26}H_{39}N_5O_6S_2$

1834513-65-3

**brinretigenum vesgedparvovecum #**

brinretigenum vesgedparvovec

recombinant, non-replicating adeno-associated virus serotype 5 (rAAV5) vector encoding (1) codon-optimized *Staphylococcus aureus* clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)-associated protein 9 (Cas9) flanked by simian virus 40 (SV40) nuclear localisation signal peptide sequences and (2) two guide RNAs (gRNA-323 and gRNA-64) targeting intron 26 of the human centrosomal protein 290 (CEP290, nephrocystin-6) gene. Expression of the CRISPR Cas9 gene is under control of the human G protein-coupled receptor kinase 1 (GRK1, rhodopsin kinase) promoter along with an SV40 splice donor/splice acceptor site, a Kozak sequence and a small synthetic polyadenylation signal. Expression of the two gRNAs is each under control of a human small nuclear RNA U6 polymerase III promoter. The vector genome is flanked by adeno-associated virus 2 (AAV2) inverted terminal repeats (ITRs). Expression of the gene editing components is intended to remove or invert the mutation-containing intronic region of the CEP290 gene (IVS26), and to restore functional CEP290 protein levels
gene therapy (Leber congenital amaurosis)

brinrétigène vesgedparvovec

vecteur recombinant non répliquant du virus adéno-associé de sérotype 5 (rAAV5) codant (1) la protéine 9 (Cas9) aux codons optimisés associée à des répétitions palindromiques courtes régulièrement espacées et groupées (CRISPR) de *Staphylococcus aureus* et flanquée de séquences de signal de localisation nucléaire du virus simien 40 (SV40) et (2) deux ARN guides (ARNg-323 et ARNg-64) ciblant l'intron 26 du gène de la protéine centrosomale 290 humaine (CEP290, néphrocystine-6). L'expression du gène CRISPR Cas9 est contrôlée par le promoteur du récepteur humain couplé à la protéine G kinase 1 (GRK1, rhodopsine kinase) ainsi que par un site donneur/accepteur d'épissage SV40, une séquence Kozak et un petit signal de polyadénylation synthétique. L'expression des deux ARNg est contrôlée par le promoteur du petit ARN nucléaire humain U6 polymérase III. Le génome du vecteur est flanqué de répétitions terminales inversées (ITR) du virus adéno-associé 2 (AAV2). L'expression des composants d'édition de gènes vise à supprimer ou à inverser la région intronique du gène CEP290 contenant la mutation (IVS26) et à restaurer les niveaux fonctionnels de la protéine CEP290
thérapie génique (amaurose congénitale de Leber)

brinretigén vesgedparvovec

vector de virus adenoasociado del serotipo 5 recombinante (rAAV5), no replicativo, que codifica para (1) la proteína Cas 9 (Cas 9) asociada a repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y espaciadas regularmente (CRISPR) de *Staphylococcus aureus*, con codones optimizados, flanqueado por secuencias del péptido señal de localización nuclear del virus del simio 40 (SV40) y (2) dos ARNs guía (ARNg-323 y ARNg-64) dirigidos al intrón 26 del gen de la proteína 290 del centrosoma humana (CEP290, nefrocistina-6). La expresión del gen CRISPR Cas9 está bajo el control del promotor del receptor de quinasa 1 acoplado a la proteína G humano (GRK1, rodopsina quinasa) junto a un sitio donante/aceptor de procesamiento (splicing) de SV40, una secuencia Kozak y una pequeña señal sintética de poliadenilación. La expresión de cada uno de los dos ARNg está bajo el control de un promotor de polimerasa III del ARN nuclear pequeño U6. El genoma del vector está flanqueado por las repeticiones terminales invertidas (ITRs) del virus adenoasociado 2 (AAV2). La expresión de los componentes editores pretende eliminar o invertir la región intrónica que contiene la mutación del gen CEP290 (IVS26) y restaurar los niveles funcionales de la proteína CDP290
terapia génica (amaurosis congénita de Leber)

2768756-11-0

budoprutugum #
budoprutug

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (B lymphocyte surface antigen B4, Leu-12)], monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-450) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV1-69*02(85.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)/*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (67.3%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%) L123>S (115), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (217) (121-218), hinge 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-211')-disulfide with kappa light chain (1'-211') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV4-70*01 (90.3%) -IGKJ1*01 (100%)/*Homo sapiens* IGKV3D-11*01 (63.8%) -IGKJ4*01 (90.9%) V124>L (101'), CDR-IMGT [5.3.7] (27'-31'.49'-51'.88'-94')) (1'-104') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (150'), V101 (188') (105'-211')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide, produced in YB2/0 cell line, glycoform alfa
immunosuppressant

budoprutug

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antigène de surface B4 des lymphocytes B, Leu-12)], anticorps monoclonal;
chaîne lourde gamma1 (1-450) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV1-69*02 (85.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)/*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (67.3%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%) L123>S (115), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (217) (121-218), charnière 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-211')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-211') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV4-70*01 (90.3%) -IGKJ1*01 (100%)/*Homo sapiens* IGKV3D-11*01 (63.8%) -IGKJ4*01 (90.9%) V124>L (101'), CDR-IMGT [5.3.7] (27'-31'.49'-51'.88'-94')) (1'-104') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (150'), V101 (188') (105'-211')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure, produit dans la lignée cellulaire YB2/0, glycoforme alfa
immunosuppresseur

budoprutug

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antígeno de superficie B4 de los linfocitos B, Leu-12)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-450) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV1-69*02 (85.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%)/*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (67.3%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%) L123>S (115), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (217) (121-218), pesada 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-211')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-211') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV4-70*01 (90.3%) -IGKJ1*01 (100%)/*Homo sapiens* IGKV3D-11*01 (63.8%) -IGKJ4*01 (90.9%) V124>L (101'), CDR-IMGT [5.3.7] (27'-31'.49'-51'.88'-94')) (1'-104') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (150'), V101 (188') (105'-211')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro, producido en la línea celular YB2/0, forma glicosilada alfa
inmunosupresor

2720478-38-4

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLQPGAE VVKPGASVKV SCKTSGYTFT SNWMHWVKQT PGKGLEWIGE 50
IDPDSYTNV NQKFDGKAKL TVDKSSSTAY MEVSDLTAED SATYYCARGS 100
NPYYVAMDYW GQGTSTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNHHKS NTKVDKRVEP KSCDKHTTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP 250
KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
STYRVVSVLT VLHQDVLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ 350
VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNCQP ENNYKTTTPV 400
LSDSGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNNHYT QKSLSLSPGK 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
QIVLTQSPAT LSASPCSEKAT MTCASSGVN YMHWYQQKPG TSPKRWIYDT 50
DKTASGVPAR FSGSGSGTSY SLTISSEAE DAATYYCHQR GSYTFGGGTK 100
LEIKRTVAAP SVFIFFPSDE QLKSGTASV CLLNNFYFRE AKVQWKVDNA 150
LQSGNSQESV TEQDSKSTY SLSSLTLSK ADYEKHKVYA CEVTHQGLSS 200
PVTKSFNRGE C 211

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22°-96" 147°-203" 264°-324" 370°-428"
22°-96" 147°-203" 264°-324" 370°-428"
Intra-L (C23-C104) 23°-87" 131°-191"
23°-87" 131°-191"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 223°-211" 223°-211"
Inter-H-H (h 11, h 14) 229°-229" 232°-232"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxoprolyle) /
piroglutamilo (pE, 5-oxoproliolo)
H VH Q1: 1, 1"
L VL Q1: 1', 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84: 300, 300"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados
C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 450, 450"

cabotamigum #
cabotamig

immunoglobulin VH-G1CH1h-G4CH2CH3-scFv_L-kappa dimer, anti-
[*Homo sapiens* CDH17 (cadherin 17)], anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3
epsilon, Leu-4)], monoclonal antibody humanized, bispecific;
VH-G1CH1h-G4CH2CH3-scFv fused heavy chain humanized (1-697) [VH-
G1CH1h-G4CH2CH3 heavy chain anti-CDH17 humanized (1-446) [(VH
(*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (89.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (91.7%) S128>A
(116), CDR-IMGT [8.8.9] (26-33.51-58.97-105))] (1-116)-*Homo sapiens*
IGHG1*03 (100%) G1m3 CH1-h, CH1 R120 (CH1 R120 (213) (117-214),
hinge 1-15 (215-229)) (117-229) -*Homo sapiens* IGHG4*01 CH2-CH3,
nG4m(a) CH2 L92, G4v1 CH2 L1.3 (CH2 F1.3>L (233), L92 (308) (230-
339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (230-446) -7-mer (prolyl-alanyl-
tetraglycyl-seryl) linker (447-453) -scFv heavy-kappa anti-CD3E humanized
(454-697) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01
(93.3%), CDR-IMGT [8.8.15] (479-486.504-511.550-564)) (454-575) -15-
mer tris(tetraglycyl-seryl) linker (576-590) -V-KAPPA (*Homo sapiens*
IGKV1-NL1*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (617-
622.640-642.679-687)) (591-697)]], (219-214')-disulfide with kappa light
chain anti-CDH17 humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-
16*01 (83.2%) -IGKJ4*01 (91.7%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-
97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1(153'), V101
(191') (108'-214')]; dimer (225-225":228-228")-bisdisulfide, produced in
Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, glycoform alfa
antineoplastic

cabotamig

immunoglobuline VH-G1CH1h-G4CH2CH3-scFv_L-kappa dimer, anti-
[*Homo sapiens* CDH17 (cadherine 17)], anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3
epsilon, Leu-4)], anticorps monoclonal humanisé, bispécifique;

chaîne lourde fusionnée VH-G1CH1h-G4CH2CH3-scFv humanisée (1-697) [VH-G1CH1h-G4CH2CH3 chaîne lourde anti-CDH17 humanisée (1-446) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-23*04 (89.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (91.7%) S128>A (116), CDR-IMGT [8.8.9] (26-33.51-58.97-105)) (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3 CH1-h, CH1R120 (CH1 R120 (213) (117-214), charnière 1-15 (215-229)) (117-229) -*Homo sapiens* IGHG4*01 CH2-CH3, nG4m(a) CH2 L92, G4v1 CH2 L1.3 (CH2 F1.3>L (233), L92 (308) (230-339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (230-446)] -7-mer (prolyl-alanyl-tétraglycyl-séryl) linker (447-453) -scFv heavy-kappa anti-CD3E humanisé (454-697) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.15] (479-486.504-511.550-564)) (454-575) -15-mer tris(tétraglycyl-séryl) linker (576-590) -V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-NL1*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (617-622.640-642.679-687)) (591-697)]], (219-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa anti-CDH17 humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (83.2%) -IGKJ4*01 (91.7%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (225-225'':228-228'')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa
antineoplasique

cabotamig

inmunoglobulina VH-G1CH1h-G4CH2CH3-scFv_L-kappa dimère, anti-[*Homo sapiens* CDH17 (cadherina 17)], anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3 épsilon, Leu-4)], anticuerpo monoclonal humanizado, biespecífico;
cadena pesada fusionada VH-G1CH1h-G4CH2CH3-scFv humanizada (1-697) [VH-G1CH1h-G4CH2CH3 cadena pesada anti-CDH17 humanizada (1-446) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-23*04 (89.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (91.7%) S128>A (116), CDR-IMGT [8.8.9] (26-33.51-58.97-105)) (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3 CH1-h, CH1R120 (CH1 R120 (213) (117-214), bisagra 1-15 (215-229)) (117-229) -*Homo sapiens* IGHG4*01 CH2-CH3, nG4m(a) CH2 L92, G4v1 CH2 L1.3 (CH2 F1.3>L (233), L92 (308) (230-339), CH3 (340-444), CHS (445-446)) (230-446)] -7-mer (prolil-alanil-tetraglicil-seril) enlace (447-453) -scFv pesado-kappa anti-CD3E humanizado (454-697) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.15] (479-486.504-511.550-564)) (454-575) -15-mer tris(tetraglicil-seril) enlace (576-590) -V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-NL1*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (617-622.640-642.679-687)) (591-697)]], (219-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa anti-CDH17 humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-16*01 (83.2%) -IGKJ4*01 (91.7%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (225-225'':228-228'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, forma glicosilada alfa
antineoplásico

2755301-09-6

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-CDH17 G1-4 -anti-CD3 scFv
EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS SYAMSWVRQT PGKLEWVAV 50
IDSGGGSTYY PDTVKDRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCSSYT 100
NLGAYWGQGT LVTVSAASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP 150
EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVVTVPSS SLGTQTYICN 200
VNHKPSNTKV DKRVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF LFPPKPKDTL 250
MISRTPEVTC VVVDVSQEDP EVQFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQFNSTYR 300
VVSILTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNGKLPSS IEKTIKAKG QPREPQVYTL 350
PPSQEEMTKN QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNQGPNENY KTTFPVLDS 400
GSFFLYSRLT VDKSRWQEGN VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSLGPAGG 450
GGSEVQLVES GGGVLVQPGGS LRLSCAASGY SFTGYTMNWV RQAPGKLEW 500
VALINPYKGV STYNQKFKDR FTISVDKSKN TAYLQMNSLR AEDTAVYYCA 550
RSGYYGSDSW YFDVWGQGT LVTVSSGGGS GGGSGGGGS DIQMTQSPSS 600
LSASVGRDVT ITCRASQDIR NYLNNWYQKPK GKAPKLLIYY TSRLSGSVPS 650
RFSGSGGSDT YTLTISSLQF EDFATYYCQG GNTLPWTFQG GTKVEIK 697

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera: anti-CDH17
DIQMTQSPSS LSASVGRDVT ITCRASQDIS GYLNWLQKPK GGAIKRLIYT 50
TSTLDSGVPK RFSGSGGSDT FTLTISSLQS EDFATYYCLQ YASSPFTFGG 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQNKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSSTL LSKADYKHKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 143-199 260-320 366-424
22"-96" 143"-199" 260"-320" 366"-424"
475-549 613-678
475"-549" 613"-678"
Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'
23"-88"" 134""-194""
Inter-H-L (h 5-CL 126) 219-214' 219"-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 225-225" 228-228"
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 296, 296"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

canlitinibum
canlitinib

6-{{3²,9⁴-difluoro-1⁶-methoxy-5,7-dioxo-2-oxa-4,8-diaza-1(4)-quinolina-3(1,4),9(1)-dibenzena-6(1,1)-cyclopropananonaphan-1⁷-yl}oxy}hexanoic acid
tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic

canlitinib


acide 6-{{3²,9⁴-difluoro-1⁶-méthoxy-5,7-dioxo-2-oxa-4,8-diaza-1(4)-quinoléina-3(1,4),9(1)-dibenzéna-6(1,1)-cyclopropananonaphan-1⁷-yl}oxy}hexanoïque
inhibiteur de tyrosine kinase, antinéoplasique

canlitinib

ácido 6-{{3²,9⁴-difluoro-1⁶-metoxi-5,7-dioxo-2-oxa-4,8-diaza-1(4)-quinoleína-3(1,4),9(1)-dibencena-6(1,1)-ciclopropananonafan-1⁷-il}oxi}hexanoico
inhibidor de la tirosina kinasa, antineoplásico

C₃₃H₃₁F₂N₃O₇

2222730-78-9



cemacabtagenum ansegedleucelum #

cemacabtagene ansegedleucel

allogeneic T lymphocytes obtained from peripheral blood mononuclear cells by leukapheresis of healthy volunteer donors, transduced with a self-inactivating, non-replicating lentiviral vector encoding a chimeric antigen receptor (CAR) targeting human CD19. The cells are also genetically modified using transcription activator-like (TAL) effector nucleases that are transiently delivered into the cell as mRNAs via electroporation and code for two pairs: one pair is designed for disruption of the T-cell receptor alpha constant (TRAC) and the other for disruption of the CD52 locus.

The expressed transgene comprises a mouse kappa light chain leader sequence, an anti-CD19 single chain variable fragment (scFv) derived from clone 4G7, a CD8 α hinge and transmembrane domain, and a 4-1BB (CD137) and CD3 ζ (TCR ζ) intracellular costimulatory domains, under control of the human elongation factor 1 alpha (EF1 α) short (EFS) promoter. The construct is flanked by 5' and 3' long terminal repeats (LTRs) and contains a ψ packaging signal, a truncated *gag*, a Rev response element (RRE), a central polypurine tract (cPPT) sequence and a mutated woodchuck post-transcriptional regulatory element (WPRE). The vector is pseudotyped with vesicular stomatitis virus (VSV) glycoprotein G.

The leukapheresis material is activated by CD3 and CD28 agonists to stimulate T lymphocyte growth in media containing serum and interleukin 2 (IL-2), transduced with the lentiviral vector, genetically modified, and then culture expanded. At the end of expansion, TCR⁻ cells are enriched by positive selection and residual TCR⁺ cells are depleted using magnetic bead purification. The T lymphocytes ($\geq 90\%$) are positive for the transgene ($\geq 30\%$ CAR positive) and are $\geq 50\%$ CD52⁻ and $\leq 3\%$ TCR $\alpha\beta$ ⁺. The cells respond to CD19 expressing target cells by releasing IFN gamma, and demonstrate cytotoxicity against cells expressing CD19 *cell-based gene therapy (antineoplastic)*

cémacabtagène anségedleucel

lymphocytes T allogéniques obtenus par leucaphérèse à partir de cellules mononucléaires de sang périphérique de donneurs volontaires sains, transduits avec un vecteur lentiviral auto-inactif et non répliquant codant un récepteur antigénique chimérique (CAR) ciblant le CD19 humain. Les cellules sont également modifiées génétiquement à l'aide de nucléases effectrices de type activateur de transcription (TAL) qui sont délivrées transitoirement dans la cellule sous forme d'ARNm par électroporation et qui codent deux paires: une paire est conçue pour la perturbation du récepteur des cellules T alpha constant (TRAC) et l'autre pour la perturbation du locus CD52.

Le transgène exprimé comprend une séquence de tête de chaîne légère kappa de souris, un fragment variable à chaîne unique (scFv) anti-CD19 dérivé du clone 4G7, une charnière et un domaine transmembranaire CD8 α , ainsi que des domaines co-stimulateurs intracellulaires 4-1BB (CD137) et CD3 ζ (TCR ζ), sous le contrôle du promoteur court (EFS) du facteur d'élongation 1 alpha (EF1 α) humain. La construction est flanquée de répétitions terminales longues (LTR) en 5' et 3' et contient un signal d'encapsulation ψ , un *gag* tronqué, un élément de réponse Rev (RRE), une séquence du tractus polypurine central

(cPPT) et un élément de régulation post-transcriptionnelle de la marmotte (WPRE) muté. Le vecteur est pseudotypé avec la glycoprotéine G du virus de la stomatite vésiculaire (VSV).

Le matériel de leucaphérèse est activé par des agonistes CD3 et CD28 pour stimuler la croissance des lymphocytes T dans un milieu contenant du sérum et de l'interleukine 2 (IL-2), transduites avec le vecteur lentiviral, génétiquement modifiées, puis amplifiées dans un milieu de culture. À la fin de l'expansion, les cellules TCR- sont enrichies par sélection positive et épuisement des cellules TCR+ résiduelles à l'aide d'une technologie de purification magnétique. Les lymphocytes T ($\geq 90\%$) sont positifs au transgène ($\geq 30\%$ CAR positif), et sont $\geq 50\%$ CD52- et $\leq 3\%$ TCR $\alpha\beta$ +. Les cellules répondent aux cellules cibles exprimant le CD19 en libérant de l'IFN gamma, et démontrent une cytotoxicité contre les cellules exprimant le CD19

thérapie génique à base de cellules (antineoplasique)

cemacabtagén ansegedleucl

linfocitos T alogénicos obtenidos de células mononucleares de sangre periférica mediante leucoaféresis de donantes voluntarios sanos, transducidos con un vector lentiviral auto inactivante, no replicativo, que codifica para un receptor de antígenos quimérico (CAR) dirigido al CD19 humano. Las células son también modificadas genéticamente usando nucleasas efectoras similares a un activador de la transcripción (TAL) que se administran de forma transitoria en la célula como ARNm por electroporación y que codifican para dos pares: un par está diseñado para romper el locus de la cadena constante α del receptor del linfocito T (TRAC) y el otro para romper el locus de CD52.

El transgén expresado contiene una secuencia líder de la cadena ligera kappa de ratón, un fragmento variable de cadena sencilla (scFv) anti-CD19 derivado del clon 4G7, un dominio bisagra y transmembrana de CD8 α y unos dominios co-estimuladores intracelulares de 4-1BB (CD137) y CD3z (TCR ζ), bajo el control del promotor corto del factor de elongación 1 α (EF1 α) humano. El constructo está flanqueado por repeticiones terminales largas (LTRs) en 5' y 3' y contiene una señal de empaquetamiento ψ , un gag truncado, un elemento de respuesta Rev (RRE), una secuencia de tracto de polipurina central (cPPT), y un elemento regulador post-transcripcional mutado de la marmota (WPRE). El vector está pseudotipado con la glicoproteína G del virus de la estomatitis vesicular (VSV).

El material de leucoaféresis se activa mediante agonistas de CD3 y CD28 para estimular el crecimiento de linfocitos T en medio que contiene suero e interleuquina 2 (IL-2), se transduce con el vector lentiviral, se modifica genéticamente y después se expande en cultivo con medio. Al final de la expansión, las células TCR- se enriquecen mediante selección positiva y depleción de células TCR+ residuales usando tecnología de purificación magnética. Los linfocitos T ($\geq 90\%$) son positivos para el transgén ($\geq 30\%$ CAR positivos) y son $\geq 50\%$ CD52- y $\leq 3\%$ TCR $\alpha\beta$ +. Las células responden a células diana que expresan CD19 liberando IFN gamma y demuestran citotoxicidad contra células que expresan CD19

terapia génica basada en células (antineoplásico)

cepeprubartum #

cepeprubart

immunoglobulin G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* SELPLG (selectin P ligand, PSGL-1, P-selectin glycoprotein ligand 1, CD162)], monoclonal antibody;
 gamma2 heavy chain (1-439) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*03 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%) , CDR-IMGT [8.8.6] (26-33.51-58.97-102))] (1-113) -*Homo sapiens* IGHG2*02, G2m23 CH2 M45.1, A105 (CH1 (114-211), hinge 1-12 (212-223), CH2 M45.1 (274), K105>A (314) (224-332), CH3 (333-437), CHS (438-439)) (114-439)], (127-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV1-110*01 (90.0%) -IGKJ2*03 (81.8%), S120>Q (105'), K123>R (108')/*Homo sapiens* IGKV2D-29*02 (86.0%) -IGKJ5*01 (91.7%) CDR-IMGT [11.3.9] (27'-37'.55'-57'.94'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')]; dimer (215-215":216-216":219-219":222-222")-tetrakisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-S, glycoform alfa
immunosuppressant

cépéprubart

immunoglobuline G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* SELPLG (ligand de la sélectine P, PSGL-1, ligand 1 de la glycoprotéine P-sélectine, CD162)], anticorps monoclonal;
 chaîne lourde gamma2 (1-439) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*03 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%) , CDR-IMGT [8.8.6] (26-33.51-58.97-102))] (1-113) -*Homo sapiens* IGHG2*02, G2m23 CH2 M45.1, A105 (CH1 (114-211), charnière 1-12 (212-223), CH2 M45.1 (274), K105>A (314) (224-332), CH3 (333-437), CHS (438-439)) (114-439)], (127-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV1-110*01 (90.0%) -IGKJ2*03 (81.8%), S120>Q (105'), K123>R (108')/*Homo sapiens* IGKV2D-29*02 (86.0%) -IGKJ5*01 (91.7%) CDR-IMGT [11.3.9] (27'-37'.55'-57'.94'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')]; dimère (215-215":216-216":219-219":222-222")- tétrakisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-S, glycoforme alfa
immunosuppresseur

cepeprubart

inmunoglobulina G2-kappa, anti-[*Homo sapiens* SELPLG (ligando de la selectina P, PSGL-1, ligando 1 de la glicoproteína P-selectina, CD162)], anticuerpo monoclonal;
 cadena pesada gamma2 (1-439) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*03 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%) , CDR-IMGT [8.8.6] (26-33.51-58.97-102))] (1-113) -*Homo sapiens* IGHG2*02, G2m23 CH2 M45.1, A105 (CH1 (114-211), bisagra 1-12 (212-223), CH2 M45.1 (274), K105>A (314) (224-332), CH3 (333-437), CHS (438-439)) (114-439)], (127-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV1-110*01 (90.0%) -IGKJ2*03 (81.8%), S120>Q (105'), K123>R (108')/*Homo sapiens* IGKV2D-29*02 (86.0%) -IGKJ5*01 (91.7%) CDR-IMGT [11.3.9] (27'-37'.55'-57'.94'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')]; dímero (215-215":216-216":219-219":222-222")- tetrakisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-S, forma glicosilada alfa
inmunosupresor

2769758-59-8

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVESGGG VVQPGKSLRL SCAASGFTFS SFGMHWRQA PGKLEWVAY 50
ISSASSTIYY ADTVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCASSY 100
GYWGQGTLLVTVSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC LVKDYFFPEPV 150
TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VVTVTSSNFG TQTYTCNVDH 200
KPSNTKVDKT VERKCCVECF FCPAPPVAGP SVFLFPKPK DTLMISRTPE 250
VTCVVVDVSH EDPEVQFNWY VDGMEVHNAK TKPREEQFNS TFRVVSVLTV 300
VHQDNLNGKE YKCAVSNKGL PAPIEKTISK TKGQPREPQV YTLPPSREEM 350
TKNQVSLTCL VKGFIYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPML DSDGFFFLYS 400
KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK 439

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIVMTQTPLS LPVTPGEPAS ISCRSSRSRLV HSGNNTYLHW YLQKPGQSPQ 50
LLIYKVSNNRF SGVPDRFSGS GSGTDFTLKI SRVEADVGV YYCSQTTTHVP 100
LTFGQGTLLV LKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVCL LNNFYPREAK 150
VQWVKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSTYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE 200
VTHQGLSSPV TKSFNRGEC 219

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 140-196 253-313 359-417
22"-96" 140"-196" 253"-313" 359"-417"
Intra-L (C23-C104) 23"-93" 139"-199"
23"-93" 139"-199"
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 127-219" 127"-219"
Inter-H-H (h 4, h 5, h 8, h11) 215-215" 216-216" 219-219" 222-222"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprollyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxoprolyle) /
piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, I"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 289, 289"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 439, 439"

ciboterceptum #
cibotercept

human activin receptor type 2-B (activin receptor type IIB, ACTR-IIB) extracellular domain (ECD) fragment (2-116, 1-115 in the current sequence), engineered variant (S¹>del, I¹¹>L, L²⁷>V, Q³⁴>K, ⁵⁰T⁵¹>SL, I⁵³>I, ⁶⁹QE⁷⁰>DT, E⁷⁵>K, F⁸⁹>M) fused via the peptide linker ¹¹⁶GGG¹¹⁸ to a human immunoglobulin G1 Fc fragment (h-CH2-CH3-CHS domains [Homo sapiens IGHG1*01 (hinge (119-128), CH2 (129-238), CH3 (239-343), CHS K³⁴⁵>del (344-344))]) (119-344), disulfide bridged homodimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa
activin receptor type-2B ligand trap

cibotercept

fragment du domaine extracellulaire (ECD) du récepteur humain de l'activine de type 2-B (récepteur de l'activine de type IIB, ACTR-IIB) (2-116, 1-115 dans la séquence actuelle), variant modifié (S¹>del, I¹¹>L, L²⁷>V, Q³⁴>K, ⁵⁰T⁵¹>SL, I⁵³>I, ⁶⁹QE⁷⁰>DT, E⁷⁵>K, F⁸⁹>M), fusionné via la liaison peptidique ¹¹⁶GGG¹¹⁸ au fragment Fc de l'immunoglobuline G1 humaine (domaines h-CH2-CH3-CHS [Homo sapiens IGHG1*01 (charnière (119-128), CH2 (129-238), CH3 (239-343), CHS K³⁴⁵>del (344-344))]) (119-344), homodimère à ponts disulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa
piège à ligand du récepteur d'activine de type 2B

cibotercept

fragmento del dominio extracelular (ECD) del receptor humano de activina de tipo 2-B (receptor de activina de tipo IIB, ACTR-IIB) (2-116, 1-115 en la secuencia actual), variante diseñada (S¹>del, I¹¹>L, L²⁷>V, Q³⁴>K, ⁵⁰T⁵¹>SL, L⁵³>I, ⁶⁹QE⁷⁰>DT, E⁷⁵>K, F⁸⁹>M) fusionada a través de un enlace peptídico ¹¹⁶GGG¹¹⁸ a un fragmento Fc de una inmunoglobulina humana G1 (dominios h-CH2-CH3-CHS [*Homo sapiens* IGHG1*01 (bisagra (119-128), CH2 (129-238), CH3 (239-343), CHS K³⁴⁵>del (344-344))]) (119-344), homodímero unido a través de puentes disulfuro, producido en células ováricas de hámster Chino (CHO), forma glicosilada alfa

trampa de ligando del receptor de activina tipo 2B

2769700-97-0

Sequence / Séquence / Secuencia	
GRGEAETREC L YYNANWELE RTNQSG V ERC EGE K DKRLHC YASWRNSSGS	50
L E I VKKGCWL DDFNCYDR D T CVAT K ENPQV YFCCCEGN M C NERFTHLPEA	100
GGPEVTYEPPTAPT G GGDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM	150
ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV	200
VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYITLP	250
PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG	300
SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSLS LSPG	344

Mutation / Mutation / Mutación
S¹, S¹>del, I¹¹, I¹¹>**L**, L²⁷, L²⁷>**V**, Q³⁴, Q³⁴>**K**, T⁵⁰, T⁵⁰>**S**, I⁵¹, I⁵¹>**L**, L⁵³, L⁵³>**I**, Q⁶⁹, Q⁶⁹>**D**, E⁷⁰, E⁷⁰>**T**, E⁷⁵, E⁷⁵>**K**, F⁸⁹, F⁸⁹>**M**

Peptide linker / Peptide liant / Péptido de unión
¹¹⁶GGG¹¹⁸

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-chain: 10-40, 30-58, 65-84, 71-83, 85-90, 159-219, 265-323,
10'-40', 30'-58', 65'-84', 71'-83', 85'-90', 159'-219', 265'-323'
Inter-chain: 124-124', 127-127'

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
N23, N46, N195, N23', N46', N195'

cibigrirsenum
cibigrirsen

all-P-ambo-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxythymidine
insulin-like growth factor 1 (IGF-1) receptor synthesis reducer, antineoplastic

cibigrirsen

tout-P-ambo-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-désoxy-P-thioguanylyl-(3'→5')

-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxythymidine
réducteur de la synthèse du facteur de croissance de type 1 apparenté à l'insuline (IGF-1), antinéoplasique

cibigrisén

todo-P-ambo-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tiocitidilil-(3'→5')-P-titimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tiocitidilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxitimidina
reductor de la síntesis del factor de crecimiento 1 similar a la insulina (IGF-1), antineoplásico

160614-28-8

(3'-5')d(*P*-thio)(T-C-C-T-C-C-G-G-A-G-C-C-A-G-A-C-T-T)**cinsebrutinibum**

cinsebrutinib

2-fluoro-1-[(3*S*)-1-(prop-2-enoyl)piperidin-3-yl]-5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta[*b*]indole-4-carboxamide
Bruton's tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic

cinsébrutinib


2-fluoro-1-[(3*S*)-1-(prop-2-énoyl)pipéridin-3-yl]-5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta[*b*]indole-4-carboxamide
inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton, antinéoplasique

cinsebrutinib

2-fluoro-1-[(3*S*)-1-(prop-2-enoyl)piperidin-3-il]-5,6,7,8,9,10-hexahidrocioclohepta[*b*]indol-4-carboxamida
inhibidor de la tirosina kinasa de Bruton, antineoplásico

C₂₂H₂₆FN₃O₂

2724962-58-5

**civorebrutinibum**

civorebrutinib


5-amino-3-{4-[(5-chloropyridin-2-yl)oxy]phenyl}-1-[(6*R*)-4-cyano-4-azaspiro[2.5]octan-6-yl]-1*H*-pyrazole-4-carboxamide
Bruton's tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic

civorébrutinib

5-amino-3-{4-[(5-chloropyridin-2-yl)oxy]phényl}-1-[(6*R*)-4-cyano-4-azaspiro[2.5]octan-6-yl]-1*H*-pyrazole-4-carboxamide
inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton, antinéoplasique

civorebrutinib

5-amino-3-{4-[(5-cloropiridin-2-il)oxil]fenil}-1-[(6*R*)-4-ciano-4-azaspiro[2.5]octan-6-il]-1*H*-pirazolo-4-carboxamida
inhibidor de la tirosina kinasa de Bruton,
antineoplásico



clémidsogenum lanparvovecum #
 clémidsogene lanparvovec

recombinant, non-replicating adeno-associated virus serotype 9 (rAAV9) vector encoding human iduronate 2-sulfatase (IDS, α -L-iduronate sulfate sulfatase) under control of a human cytomegalovirus (CMV) immediate-early enhancer/chicken β -actin (CBA) promoter, with a chicken β -actin intron, terminated with the rabbit β -globin polyadenylation signal, and flanked by adeno-associated virus 2 (AAV2) inverted terminal repeats (ITRs)
gene therapy (mucopolysaccharidosis type 2)

clémidsogène lanparvovec

vecteur recombinant non répliquant du virus adéno-associé de sérotype 9 (rAAV9) codant pour l'iduronate 2-sulfatase humaine (IDS, α -L-iduronate sulfate sulfatase) sous le contrôle d'un amplificateur immédiat et précoce du cytomégalo virus (CMV) humain/promoteur de la β -actine de poulet (CBA), avec un intron de β -actine de poulet, terminé par le signal de polyadénylation de la β -globine de lapin, et encadré par des répétitions terminales inversées (ITR) du virus adéno-associé 2 (AAV2)
thérapie génique (mucopolysaccharidose de type 2)

clémidsogén lanparvovec

vector de virus adenoasociado del serotipo 9 recombinante (rAAV9), no replicativo, que codifica para la iduronato 2 sulfatasa (IDS, α -L-iduronato sulfato sulfatasa) bajo el control de un potenciador inmediato-temprano de citomegalovirus (CMV) humano /promotor de la β -actina de pollo (CBA), con un intrón de la β -actina de pollo, terminado con una señal de poliadenilación de la β -globina de conejo y flanqueado por repeticiones terminales invertidas (ITRs) del virus adenoasociado 2 (AAV2)
terapia génica (mucopolisacaridosis tipo 2)

2766142-50-9

clofutribenum
 clofutriben

4-{5-[2-(4-chloro-2,6-difluorophenoxy)propan-2-yl]-4-methyl-4*H*-1,2,4-triazol-3-yl}-3-fluorobenzamide
11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 1 inhibitor

clofutribène


4-{5-[2-(4-chloro-2,6-difluorophénoxy)propan-2-yl]-4-méthyl-4*H*-1,2,4-triazol-3-yl}-3-fluorobenzamide
inhibiteur de la 11-β-hydroxystéroïde déshydrogénase 1

clofutribén

4-{5-[2-(4-cloro-2,6-difluorofenoxi)propan-2-il]-4-metil-4*H*-1,2,4-triazol-3-il}-3-fluorobenzamida
inhibidor de la 11-β-hidroxiesteroide deshidrogenasa 1

C₁₉H₁₆ClF₃N₄O₂

1204178-50-6



coramitugum #

coramitug

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TTR (transthyretin) misfolded], monoclonal antibody; gamma1 heavy chain (1-454) [VH (*Mus musculus* IGHV5-12-2*01 (92.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (84.6%) S123>L (119), CDR-IMGT [8.8.17] (26-33.51-58.97-113)) (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (221) (125-222), hinge 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV2-137*01 (89.0%) -IGKJ2*03 (90.9%) S120>Q (105'), CDR-IMGT [11.3.9] (27'-37'.55'-57'.94'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')]; dimer (233-233":236-236")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DG44, glycoform alfa
clearance of transthyretin aggregates

coramitug

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TTR (transthyréline) mal repliée], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-454) [VH (*Mus musculus* IGHV5-12-2*01 (92.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (84.6%) S123>L (119), CDR-IMGT [8.8.17] (26-33.51-58.97-113)) (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (221) (125-222), charnière 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV2-137*01 (89.0%) -IGKJ2*03 (90.9%) S120>Q (105'), CDR-IMGT [11.3.9] (27'-37'.55'-57'.94'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')]; dimère (233-233":236-236")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DG44, glycoforme alfa
élimination des agrégats de transthyréline

coramitug

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TTR (transtiretina) mal plegada], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-454) [VH (*Mus musculus* IGHV5-12-2*01 (92.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (84.6%) S123>L (119), CDR-IMGT [8.8.17] (26-33.51-58.97-113)) (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (221) (125-222), bisagra 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV2-137*01 (89.0%) -IGKJ2*03 (90.9%) S120>Q (105'), CDR-IMGT [11.3.9] (27'-37'.55'-57'.94'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')]; dímero (233-233":236-236")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-DG44, forma glicosilada alfa

eliminación de los agregados de transtirretina

2626841-92-5

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
EVQMTVESGGG LVQPGGSLKL SCAASGFTFS SYTMSWVRQT PEKRLRLVAE 50
INNSGDDTTY PDTVKGRFTI SRDNAKNTLY LQMSSLKSED TAMYYCARHY 100
YYGGGYGGWF FDVWGQGLTV TVSSASTKGP SVFPLAPSSK STSGGTAALG 150
CLVGDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPFV LQSSGLYSLS SVVTVPSSSL 200
GTQYICNVN HKPSNTKVDK RVEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF 250
PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE 300
EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP 350
REPQVYTLPP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT 400
TPPVLDSDGS FFYLSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKLSLSL 450
SPGK 454

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIVMTQSPLS LPVTPGEPAS ISCRSSKSL L HSGNTYLYW FLQKPGQSPQ 50
LLIYRVSNLA SGVPSRFSGS GSGTDFTLKI SRVEAEDVGV YYCMQHLEYP 100
LTFGGGTKLE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC L LNNFYYPREK 150
VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDSYSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE 200
VTHQGLSSPV TKSFNRGEC 219

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 151-207 268-328 374-432
22"-96" 151"-207" 268"-328" 374"-432"
Intra-L (C23-C104) 23-93 139-199
23"-93" 139"-199"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 227-219 227"-219"
Inter-H-H (h 11, h 14) 233-233 236-236"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 304, 304"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 454, 454"

dasminapantum
dasminapant

(5S,5'S,8S,8'S,10aR,10'aR)-3,3'-[1,3-phenylenebis(sulfonyl)]bis{N-(diphenylmethyl)-5-[(2S)-2-(methylamino)propanamido]-6-oxodecahydropyrrolo[1,2-a][1,5]diazocine-8-carboxamide}
inhibitor of apoptosis protein (IAP) antagonist

dasminapant


(5S,5'S,8S,8'S,10aR,10'aR)-3,3'-[1,3-phénylènebis(sulfonyl)]bis{N-(diphénylméthyl)-5-[(2S)-2-(méthylamino)propanamido]-6-oxodécahydropyrrolo[1,2-a][1,5]diazocine-8-carboxamide}
antagoniste de la protéine inhibitrice de l'apoptose (PIA)

dasminapant

(5*S*,5'*S*,8*S*,8'*S*,10*aR*,10'*aR*)-3,3'-[1,3-fenilenobis(sulfonil)]bis(*N*-(difenilmetil)-5-[(2*S*)-2-(metilamino)propanamido]-6-oxodecahidropirrol[1,2-*a*][1,5]diazocina-8-carboxamida)
antagonista de la proteína inhibidora de la apoptosis (PIA)

C₆₀H₇₂N₁₀O₁₀S₂

1570231-89-8

**davelizomibum**

davelizomib

{{(4*S*)-2-[(1*R*)-1-{2-[(2*S*)-1-(2,4-difluorophenyl)azetidine-2-carboxamido]acetamido}-3-methylbutyl]-5-oxo-1,3,2-dioxaborolan-4-yl}acetic acid
proteasome inhibitor, antineoplastic

davélizomib


acide {{(4*S*)-2-[(1*R*)-1-{2-[(2*S*)-1-(2,4-difluorophényl)azétidine-2-carboxamido]acétamido}-3-méthylbutyl]-5-oxo-1,3,2-dioxaborolan-4-yl}acétique
inhibiteur du protéasome, antinéoplasique

davelizomib

ácido {{(4*S*)-2-[(1*R*)-1-{2-[(2*S*)-1-(2,4-difluorofenil)azetidina-2-carboxamido]acetamido}-3-metilbutil]-5-oxo-1,3,2-dioxaborolan-4-il}acético
inhibidor de proteasoma, antineoplásico

C₂₁H₂₆BF₂N₃O₇

2409841-51-4

**dazagamglogenum autogedtemcelum #**

dazagamglogene autogedtemcel

autologous CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs) collected by leukapheresis and genetically modified *ex vivo* by a pair of zinc finger nucleases (ZFN) directed against the genomic sequence of the erythroid-specific enhancer (ESE) located in the second intron of the

B-cell lymphoma/leukemia 11A (*BCL11A*) gene on chromosome 2. The ZFN editing components comprise two messenger RNAs (mRNAs) with one mRNA encoding the left optimized ZFN (mRENH1), and the other mRNA encoding the right optimized ZFN (mRENH2). The two mRNAs are introduced *ex vivo* into the target cell population via electroporation. Subsequent endogenous non-homologous end joining DNA repair results in an insertion or deletion (indel) event thus permanently disrupting the *BCL11A* erythroid enhancer region.

The cell suspension is enriched for CD34+ cells using magnetic bead separation and cultured in media containing Fms-related tyrosine kinase 3 ligand (Flt3L), stem cell factor (SCF), and thrombopoietin (TPO), prior to electroporation. The substance consists of cells with ≥80% CD34+ purity and detectable on-target editing
cell-based gene therapy (hemoglobinopathy)

dazagamglogène autogedtemcel

cellules souches et progénitrices hématopoïétiques CD34+ autologues (HSPC) prélevées par leucaphérèse et génétiquement modifiées *ex vivo* par une paire de nucléases à doigts de zinc (ZFN) dirigées contre la séquence génomique de l'amplificateur spécifique de l'érythroïde (ESE) situé dans le deuxième intron du gène du lymphome/de la leucémie des cellules B 11A (*BCL11A*) présent sur le chromosome 2. Les composants d'édition ZFN comprennent deux ARN messagers (ARNm) dont l'un codant la ZFN optimisée à gauche (mRENH1) et l'autre la ZFN optimisée à droite (mRENH2). Les deux ARNm sont introduits *ex vivo* dans la population cellulaire cible par électroporation. La réparation endogène subséquente de l'ADN par jonction non homologue aboutit à un événement d'insertion ou de délétion (indel) qui perturbe de manière permanente la région de l'amplificateur érythroïde de *BCL11A*.

La suspension cellulaire est enrichie en cellules CD34+ par séparation avec billes magnétiques et cultivée dans un milieu contenant du ligand de la tyrosine kinase 3 de type FMS (Flt3L), du facteur de cellules souches (SCF) et de la thrombopoïétine (TPO), avant l'électroporation. La substance est constituée de cellules d'une pureté en CD34+ ≥80% et d'une édition sur cible détectable
thérapie génique à base de cellules (hémoglobinopathie)

dazagamglogén autogedtemcel

células madre y progenitoras hematopoyéticas (HSPCs) CD34+ autólogas, obtenidas mediante leucoaféresis y modificadas genéticamente *ex vivo* mediante un par de nucleasas con dedos de zinc (ZFN) dirigidas contra la secuencia genómica del potenciador específico eritroide (ESE) localizado en el segundo intrón del gen de linfoma/leucemia de linfocitos B 11A (*BCL11A*) en el cromosoma 2. Los componentes editores de ZFN contienen dos ARN mensajeros (ARNm), con un ARm que codifica para la ZFN izquierda optimizada (mRENH1) y otro ARNm que codifica para la ZFN derecha optimizada (mRENH2). Los dos ARNm se introducen *ex vivo* en la población celular diana mediante electroporación. La reparación endógena subsiguiente de los extremos de unión no homólogos del ADN resulta en un evento de inserción o delección (indel)

que interrumpe permanentemente la región potenciadora eritroide del *BCL11A*. La suspensión celular se enriquece en células CD34+ usando separación por bolas magnéticas y se cultivan en medio que contiene el ligando de tirosina quinasa 3 tipo FMS (Flt3L), factor de células madre (SCF) y trombopoyetina (TPO) antes de la electroporación. La sustancia consiste en células con una pureza de $\geq 80\%$ CD34+ y edición detectable en el sitio deseado (*on-target*) *terapia génica basada en células (hemoglobinopatía)*

demannosum

demannose

D-mannopyranose
congenital glycosylation disorders

démannose


D-mannopyranose
anomalies congénitales de la glycosylation

demanosa

D-manopiranososa
defectos congénitos de la glicosilación

 $C_6H_{12}O_6$

530-26-7

**deupsilocinum**

deupsilocin

3-[2-{di[(2H_3)methyl]amino}(2H_4)ethyl]-1*H*-indol-4-ol
psychodysleptic

deupsilocine


3-[2-{di[(2H_3)méthyl]amino}(2H_4)éthyl]-1*H*-indol-4-ol
psychodysleptique

deupsilocina

3-[2-{di[(2H_3)metil]amino}(2H_4)etil]-1*H*-indol-4-ol
psicodisléptico

 $C_{12}H_6^2H_{10}N_2O$

1435934-64-7

**digadoglucitolum**


digadoglucitol

μ -[2,2',2'',2''',2''''-{{{[(2*S*,3*R*,4*R*,5*R*)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]azanediyl}}bis[[2-(hydroxy- κ O)propane-3,1-diyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-10,1,4,7-tetrayl- $\kappa^4N^1,N^4,N^7,N^{10}$]}hexa(acetato- κ O)]digadolium
diagnostic agent

- digadoglucitol μ -[2,2',2'',2''',2''''-({[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]azanediyl})bis{[2-(hydroxy- κ O)propane-3,1-diyl]-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-10,1,4,7-tétrayl- $\kappa^4N^1,N^4,N^7,N^{10}$)}hexa(acétato- κ O)]digadolínio
agent diagnostique
- digadoglucitol μ -[2,2',2'',2''',2''''-({[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxihexil]azanodil})bis{[2-(hidroxi- κ O)propano-3,1-dil]-1,4,7,10-tetraazaciclododecano-10,1,4,7-tetrayl- $\kappa^4N^1,N^4,N^7,N^{10}$)}hexa(acetato- κ O)]digadolínio
agente de diagnóstico

 $C_{40}H_{69}Gd_2N_9O_{19}$

2098944-37-5



donzakimigum #
donzakimig

immunoglobulin G1(VH-CH1-h)-scFv_L-kappa-scFv, anti-[*Homo sapiens* IL22 (interleukin 22, IL-22, ILTIF, IL-TIF)], anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukin 13, IL-13)] and anti-[*Homo sapiens* ALB (albumin, human serum albumin, HAS)], humanized, trispecific, trivalent; fused G1(VH-CH1-h)-scFv heavy-kappa heavy chain humanized (1-486) [G1(VH-CH1-h) anti-IL22 humanized (1-222) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (83.7%) -IGHD) -IGHJ5*02 (100%), CDR-IMGT [8.7.13] (26-33.51-57.96-108)] (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-h, G1m17 (CH1 K120 (216) (120-217), hinge 1-5 (218-222)) (120-222)] -11-mer seryl-bis(tetraglycyl-seryl) linker (223-233) -scFv heavy-kappa anti-ALB humanized, scFv-v1 C49 (VH)-C120 (VL) (234-486) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (78.6%) -IGHD) -IGHJ2*01 (93.3%) C49 (277), R120>Q (346) (CDR-IMGT [8.7.15] (259-266.284-290.329-343)) (234-354) -20-mer tetrakis(tetraglycyl-seryl) linker (355-374) -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (86.5%) -IGKJ1*01 (90.9%) C120 (477), CDR-IMGT [7.3.11] (401-407.425-427.464-474)) (375-486)]]; fused L-kappa-scFv heavy-kappa light chain humanized (1'-474') [L-KAPPA anti-IL22 humanized (1'-219') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*03 (89.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.14] (27'-32'.50'-52'.89'-102'') (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')] -11-mer seryl-bis(tetraglycyl-seryl) linker (220'-230') -scFv heavy-kappa anti-IL13 humanized, scFv-1 C49 (VH)-C120 (VL) (231'-474') [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*08 (81.6%) -IGHD) -IGHJ1*01 (100%), C49 (274), CDR-IMGT [8.8.9] (256'-263'.281'-288'.327'-335'') (231'-346') -20-mer tetrakis(tetraglycyl-seryl) linker (347'-366') -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.9%) -IGKJ2*01 (91.7%) C120 (465'), CDR-IMGT [6.3.8] (393'-398'.416'-418'.455'-462'') (367'-474')]]; produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DG44, non-glycosylated anti-inflammatory

- donzakimig immunoglobuline G1(VH-CH1-h)-scFv_L-kappa-scFv, anti-[*Homo sapiens* IL22 (interleukine 22, IL-22, ILTIF, IL-TIF)], anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukine 13, IL-13)] et anti-[*Homo sapiens* ALB (albumine, sérum albumine humaine, SAH)], anticorps monoclonal humanisé, trispécifique, trivalent; chaîne lourde gamma1 fusionnée G1(VH-CH1-h)-scFv lourd-kappa humanisée (1-486) [G1(VH-CH1-h) anti-IL22 humanisée (1-222) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%), CDR-IMGT [8.7.13] (26-33.51-57.96-108))] (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-h, G1m17 (CH1 K120 (216) (120-217), charnière 1-5 (218-222)) (120-222)] -11-mer séryl-bis(tétraglycyl-séryl) linker (223-233) -scFv lourd-kappa anti-ALB humanisé, scFv-v1 C49 (VH)-C120 (VL) (234-486) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (78.6%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (93.3%), C49 (277), R120>Q (346), CDR-IMGT [8.7.15] (259-266.284-290.329-343)) (234-354) -20-mer tétrakis(tétraglycyl-séryl) linker (355-374) -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (86.5%) -IGKJ1*01 (90.9%) C120 (477), CDR-IMGT [7.3.11] (401-407.425-427.464-474)) (375-486)]; chaîne légère kappa fusionnée L-kappa-scFv humanisée (1'-474') [L-KAPPA anti-IL22 humanisée (1'-219') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*03 (89.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.14] (27'-32'.50'-52'.89'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')] -11-mer séryl-bis(tétraglycyl-séryl) linker (220'-230') -scFv lourd-kappa anti-IL13 humanisé, scFv-1 C49 (VH)-C120 (VL) (231'-474') [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*08 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), C49 (274'), CDR-IMGT [8.8.9] (256'-263'.281'-288'.327'-335')) (231'-346') -20-mer tétrakis(tétraglycyl-séryl) linker (347'-366') -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.9%) -IGKJ2*01 (91.7%) C120 (465'), CDR-IMGT [6.3.8] (393'-398'.416'-418'.455'-462')) (367'-474')]; produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DG44, non-glycosylé
anti-inflammatoire
- donzakimig immunoglobulina G1(VH-CH1-h)-scFv_L-kappa-scFv, anti-[*Homo sapiens* IL22 (interleukina 22, IL-22, ILTIF, IL-TIF)], anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukina 13, IL-13)] y anti-[*Homo sapiens* ALB (albúmina, albúmina sérica humana, SAH)], anticuerpo monoclonal humanizado, triespecífico, trivalente; cadena pesada gamma1 fusionada G1(VH-CH1-h)-scFv pesada-kappa humanizada (1-486) [G1(VH-CH1-h) anti-IL22 humanizada (1-222) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%), CDR-IMGT [8.7.13] (26-33.51-57.96-108))] (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-h, G1m17 (CH1 K120 (216) (120-217), bisagra 1-5 (218-222)) (120-222)] -11-mer seril-bis(tetraglicil-seril) enlace (223-233) -scFv pesado-kappa anti-ALB humanizado, scFv-v1 C49 (VH)-C120 (VL) (234-486) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (78.6%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (93.3%), C49 (277), R120>Q (346), CDR-IMGT [8.7.15] (259-266.284-290.329-343)) (234-354) -20-mer tetraakis(tetraglicil-seril) enlace (355-374) -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (86.5%) -IGKJ1*01 (90.9%) C120 (477), CDR-IMGT [7.3.11] (401-407.425-427.464-474)) (375-486)]; cadena ligera kappa fusionada L-kappa-scFv humanizada (1'-474') [L-KAPPA anti-IL22 humanizada (1'-219') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*03 (89.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.14] (27'-32'.50'-52'.89'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')] -11-mer seril-bis(tetraglicil-seril) enlace (220'-230') -scFv pesado-kappa anti-IL13 humanizado, scFv-1 C49 (VH)-C120 (VL) (231'-474') [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*08 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), C49 (274'), CDR-IMGT [8.8.9] (256'-263'.281'-288'.327'-335')) (231'-346') -20-mer tetraakis(tetraglicil-seril) enlace (347'-366') -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.9%) -IGKJ2*01 (91.7%) C120 (465'), CDR-IMGT [6.3.8] (393'-398'.416'-418'.455'-462')) (367'-474')]; producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-DG44, no glicosilado
antiinflamatorio

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-IL22 G1(VH-CH1-h) - anti-ALB scFv
EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAVSGFSL SYAMIWVRQA PGKGLEWIGI 50
IDIEGSTYYA SWAKGRFTIS RDNSKNTVYL QMNSLRAEDT AVYYCARDRF 100
VGVDFIDFPWG QGTLVTVSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD 150
YFPEPVTWSW NSGALTSGVH TFFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY 200
ICNVNHHKPSN TKVDKKVEPK SCSGGGGSGG GGEVQLLES GGLVQPGGS 250
LRLSCAVSGI DLSNYAINWV RQAPGKCLEW IGIIWASGTT FYATWAKGRF 300
TISRDN SKNT VYLQMNSLRA EDTAVYYCAR TVPGYSTAPY FDLWGQGTLV 350
TVSSGGGGSG GGGSGGGSGG GGGSDIQMTQ SPSSVSASVG DRVTITCQSS 400
PSVWSNFLSW YQQKPGKAPK LLIYEASKLT SGVPSRFSGS GSGTDFTLTI 450
SSLQPEDFAT YYCGGYSSI SDTTFGCGTK VEIKRT 486

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera: anti-IL22 L-kappa - anti-IL13 scFv
AVQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCQASEDIY TNLAWYQKP GKAPKLLIYW 50
ASTLASGVPV RFSGSGSGTD FTLTISSLQF EDFATYYCQA SVYGNAAADR 100
YTFGGGTKVE IKRTVAAPSV FIFPPSDEQL KSGTASVVC LNNFYPREAK 150
VQWKVDNALQ SGNSQESVTE QDSKDYSTSL SSTLTLSKAD YEKHKVYACE 200
VTHQGLSSPV TKSFNRGES GGGSGGGGGS EVQLVQSGAE VKKPGSSVKV 250
SCKASGYSTF SYIIHWVRQA PGQCLEWMGR IGPSSGDIN YNEKFKGRATF 300
TVDKSTSTAY MELSLRSED TAVYYCARFH YDGADWGGQT LVTVSSGGGG 350
SGGGSGGGG SGGGGSDIQM TQSPSSLSAS VGDRVTITCK ASQININENLD 400
WYQQKPGKAP KLLIYYTDIL QTGIPSRFSG SSGSDYTLT ISSLQPEDFA 450
TYICYQYYSG YTFGCGTKLE IKRT 474

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-95 146-202 255-328 397-463
Intra-H scFv C49 (VH)-C120 (VL)* 277-477
Intra-L (C23-C104) 23'-88' 139'-199' 252'-326' 389'-454'
Intra-L scFv C49 (VH)-C120 (VL)* 274'-465'
Inter-H-L (h 5-CL 126) 222-219'
*Engineered additional disulfide bond to stabilize the scFv.

No N-glycosylation sites / pas de sites de N-glycosylation / ninguna posición de N-glycosilación

dorocubicelum


dorocubiceal allogeneic human umbilical cord blood derived CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells (HSPCs). The CD34+ HSPC fraction is selected from cord blood and expanded ex vivo in serum-free growth medium in the presence of UM171 (trans-N¹-[2-benzyl-7-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-9H-pyrimido[4,5-b]indol-4-yl]cyclohexane-1,4-diamine) dihydrobromide dihydrate and recombinant cytokines such as stem cell factor (SCF), FMS-related tyrosine kinase 3 ligand (Flt3L), thrombopoietin (TPO) and interleukin-6 (IL-6). The expanded fraction predominantly consists of HSPCs (CD34+ CD45RA-cells), with varying levels of dendritic cell progenitors (CD34+ CD86+ cells), mast cell progenitors (Fc epsilon receptor 1a (FCER1A)+ CD117+ cells), and other cell types
cell therapy (stem cell transplantation)

dorocubiceal cellules souches et progénitrices hématopoïétiques CD34+, allogéniques, dérivées du sang de cordon ombilical humain (HSPC). La fraction CD34+ des HSPC est sélectionnée à partir de sang de cordon ombilical et amplifiée ex vivo dans un milieu de croissance sans sérum en présence du dihydrate de bromhydrate de UM171 (trans-N¹-[2-benzyl-7-(2-méthyl-2H-tétrazol-5-yl)-9H-pyrimido[4, 5-b]indol-4-yl]cyclohexane-1,4-diamine) et des cytokines recombinantes telles que le facteur de cellules souches (SCF), le ligand de la tyrosine kinase 3 de type FMS (Flt3L), la thrombopoïétine (TPO) et l'interleukine-6 (IL-6)). La fraction amplifiée se compose principalement de cellules souches et progénitrices hématopoïétiques (HSPC) (cellules CD34+ CD45RA-), avec des niveaux variables de progéniteurs de cellules dendritiques (cellules

	CD34+ CD86+), de progéniteurs de mastocytes (cellules CD117+ de la sous-unité alpha du récepteur Fc de l'IgE (FCER1A)), et d'autres types cellulaires <i>thérapie cellulaire (transplantation de cellules souches)</i>
dorocubice	células madre y progenitoras hematopoyéticas (HSPCs) CD34+, alogénicas, humanas, derivadas de sangre de cordón umbilical. La fracción de HSPC CD34+ se selecciona de sangre de cordón y se expande <i>ex vivo</i> en medio de crecimiento sin suero en presencia de dihidrato de dihidrobromida de UM171 (<i>trans-N</i> ¹ -[2-bencil-7-(2-metil-2 <i>H</i> -tetrazol-5-il)-9 <i>H</i> -pirimido [4,5- <i>b</i>]indol-4-il]ciclohexano-1,4-diamina) y citoquinas recombinantes tales como factor de células madre (SCF), ligando de tirosina quinasa 3 tipo FMS (Flt3L), trombopoietina (TPO) e interleuquina 6 (IL-6). La fracción expandida consiste predominantemente en células madre y progenitoras hematopoyéticas (HSPCs) (células CD34+ CD45RA-), con niveles variables de progenitores de células dendríticas (células CD34+ CD86+), progenitores de mastocitos (células FCER1A (subunidad alfa del receptor Fc de IgE)+ CD117+) y otros tipos celulares <i>terapia celular (trasplante de células madre)</i>
edelinontrinum edelinontrine	6-{{(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-methyl-1-[(pyrimidin-2-yl)methyl]pyrrolidin-3-yl}-1-(oxan-4-yl)-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4-one <i>phosphodiesterase 9 (PDE9) inhibitor</i>
édélinontrine	6-{{(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-méthyl-1-[(pyrimidin-2-yl)méthyl]pyrrolidin-3-yl}-1-(oxan-4-yl)-1,5-dihydro-4 <i>H</i> -pyrazolo[3,4- <i>d</i>]pyrimidin-4-one <i>inhibiteur de la phosphodiesterase 9 (PDE9)</i>
edelinontrina	6-{{(3 <i>S</i> ,4 <i>S</i>)-4-metil-1-[(pirimidin-2-il)metil]pirrolidin-3-il}-1-(oxan-4-il)-1,5-dihidro-4 <i>H</i> -pirazolo[3,4- <i>d</i>]pirimidin-4-ona <i>inhibidor de la fosfodiesterasa 9 (PDE9)</i>

C₂₀H₂₅N₇O₂

1082744-20-4



efercoleukinum alfa #
efercoleukin alfa

human immunoglobulin G1 Fc fragment (h-CH2-CH3-CHS domains [*Homo sapiens* IGHG1*01 (hinge (1-10), CH2 N⁷⁷>A (11-120), CH3 Y¹²⁹>C, T¹⁴⁶>S, L¹⁴⁸>A, Y¹⁸⁷>V (121-225), CHS K²²⁷>del (226-226))]) (1-226), fused via the peptide linker ²²⁷GPPSGSSPMPYDLYHPSGGG²⁴⁶ to interleukin 2 receptor subunit beta (IL2RB, high affinity IL-2 receptor subunit β, CD122) fragment (27-239, 247-459 in the current sequence), variant (C¹²²>S³⁶⁸, C¹⁶⁸>S⁴¹⁴), disulfide bridged to human immunoglobulin G1 Fc

efercoleukine alfa

fragment (h-CH2-CH3-CHS domains [*Homo sapiens* IGHG1*01 (hinge (1'-10'), CH2 N⁷⁷>A (11'-120'), CH3 S¹³⁴>C, T¹⁴⁶>W (121'-225'), CHS K²²⁷>del (226'-226'))]), fused via peptide linker ²²⁷GGSSPPGGGSSGGSGP²⁴³ to human interleukin 2 (IL2) (21-153, 244-376 in the current sequence), variant (R⁵⁸>A²⁸¹, F⁶²>A²⁸⁵, Y⁶⁵>A²⁸⁸, E⁸²>A³⁰⁵, C¹⁴⁵>A³⁶⁸), heterodimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) K1 cells, glycoform alfa
interleukin-2 analogue, antineoplastic

efercoleukina alfa

fragment Fc de l'immunoglobuline G1 humaine (domaines h-CH2-CH3-CHS [*Homo sapiens* IGHG1*01 (charnière (1-10), CH2 N⁷⁷>A (11-120), CH3 Y¹²⁹>C, T¹⁴⁶>S, L¹⁴⁸>A, Y¹⁸⁷>V (121-225), CHS K²²⁷>del (226-226))]) (1-226), fusionné via le peptide liant ²²⁷GPPSGSSPMPYDLYHPSSGGG²⁴⁶ au fragment (27-239, 247-459 dans la séquence actuelle) de la sous-unité bêta du récepteur de l'interleukine 2 (IL2RB, sous-unité β du récepteur de l'IL-2 à haute affinité, CD122), variant (C¹²²>S³⁶⁸, C¹⁶⁸>S⁴¹⁴), réuni par des ponts disulfure au fragment Fc de l'immunoglobuline G1 humaine (domaines h-CH2-CH3-CHS [*Homo sapiens* IGHG1*01 (charnière (1'-10'), CH2 N⁷⁷>A (11'-120'), CH3 S¹³⁴>C, T¹⁴⁶>W (121'-225'), CHS K²²⁷>del (226'-226'))]), fusionné via la liaison peptidique ²²⁷GGSSPPGGGSSGGSGP²⁴³ à l'interleukine 2 humaine (IL2) (21-153, 244-376 dans la séquence actuelle), variant (R⁵⁸>A²⁸¹, F⁶²>A²⁸⁵, Y⁶⁵>A²⁸⁸, E⁸²>A³⁰⁵, C¹⁴⁵>A³⁶⁸), hétérodimère, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) K1, glycoforme alfa
analogue de l'interleukine 2, antinéoplasique

fragmento Fc de la inmunoglobulina humana (dominio h-CH2-CH3-CHS [*Homo sapiens* IGHG1*01 (bisagra (1-10), CH2 N⁷⁷>A (11-120), CH3 Y¹²⁹>C, T¹⁴⁶>S, L¹⁴⁸>A, Y¹⁸⁷>V (121-225), CHS K²²⁷>del (226-226))]) (1-226), fusionado a través del enlace peptídico ²²⁷GPPSGSSPMPYDLYHPSSGGG²⁴⁶ a la subunidad beta del receptor de la interleukina 2 (IL2RB, subunidad β del receptor de la IL-2 de alta afinidad, CD122) fragmento (27-239, 247-459 en la secuencia actual), variante (C¹²²>S³⁶⁸, C¹⁶⁸>S⁴¹⁴), unido a puentes disulfuro al fragmento Fc de la inmunoglobulina humana G1 (dominios h-CH2-CH3-CHS [*Homo sapiens* IGHG1*01 (bisagra (1'-10'), CH2 N⁷⁷>A (11'-120'), CH3 S¹³⁴>C, T¹⁴⁶>W (121'-225'), CHS K²²⁷>del (226'-226'))]), fusionado a través del enlace peptídico ²²⁷GGSSPPGGGSSGGSGP²⁴³ a la interleukina 2 humana (IL2) (21-153, 244-376 en la secuencia actual), variante (R⁵⁸>A²⁸¹, F⁶²>A²⁸⁵, Y⁶⁵>A²⁸⁸, E⁸²>A³⁰⁵, C¹⁴⁵>A³⁶⁸), heterodímero, producido en células ováricas de hámster Chino (CHO) K1, forma glicosilada alfa
análogo de la interleukina 2, antineoplásico

2760549-52-6

Sequence / Séquence / Secuencia		
Fc-IL2RB		
DKTHTCPPCP	APELLGGPSV	FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED 50
PEVKFNWYVD	GVEVHNAKTK	PREEQYASTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK 100
CKVSNKALPA	PIEKTISKAK	GQPREPQVCT LPPSRDELTK NQVSLSCAVK 150
GFYPSDIAVE	WESNGQPENN	YKTTTPVLDS DGSFFLVSKL TVDKSRWQQG 200
NVFSCSVMEH	ALHNHYTQKS	LSLSPGGGPPS GSSPMFYDLY HPSSGGGAVNG 250
TSQFTCFYNS	RANISCVWSQ	DGALQDTSCQ VHAWPDRRRW NQTCELLFPVS 300
QASWACNLIL	GAPDSQKLTT	VDIVTLRVLC REGVRWRVMA IQDFKPFENL 350
RLMAPISLQV	VHVETHRSNI	SWEISQASHY FERHLEFEAR TLPSPGHTWEE 400
APLLTLKQKQ	EWISLETITP	DTQYEFQVRV KPLQGEFTTW SPWSQPLAFR 450
TKPAALGKD		459

Fc-IL2		
DKTHTCPPCP	APELLGGPSV	FLFPPKPKDT LMISRTPEVT CVVVDVSHED 50
PEVKFNWYVD	GVEVHNAKTK	PREEQYASTY RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK 100
CKVSNKALPA	PIEKTISKAK	GQPREPQVYT LPFCDDELTK NQVSLWCLVK 150
GFYPSDIAVE	WESNGQPENN	YKTTTPVLDS DGSFFLYSKL TVDKSRWQQG 200
NVFSCSVMEH	ALHNHYTQKS	LSLSPGGGSS PPGGGSSGGG SGPAHTSSST 250
KKTQLQLEHL	LLDLQMILNG	INNYKNPKLT AMLTAKFAMP KKATELKHQL 300
CLEEAKLPKE	EVLNLAQSKN	FHLRPRDLIS NINIVLELK GSETTFMCEY 350
ADETATIVVF	LNRWITFAQS	IISTLT 376

Mutations / Mutation / Mutación
Fc-IL2RB chain: N⁷⁷>A, Y¹²⁹>C, T¹⁴⁶>S, L¹⁴⁸>A, Y¹⁸⁷>V, K²²⁷>del, C¹²²>S³⁶⁸, C¹⁶⁸>S⁴¹⁴
Fc-IL2 chain: N⁷⁷>A, S¹³⁴>C, T¹⁴⁶>W, K²²⁷>del, R⁵⁸>A²⁸¹, F⁶²>A²⁸⁵, Y⁶⁵>A²⁸⁸, E⁸²>A³⁰⁵, C¹⁴⁵>A³⁶⁸

Peptide linker / Peptide liant / Péptido de unión
Fc-IL2RB chain: ²²⁷GPPSGSSPMFYDLYHPSSGGG²⁴⁶
Fc-IL2 chain: ²²⁷GGSSPPGGGSSGGGSGP²⁴³

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra Fc-IL2RB: 41-101, 147-205, 256-266, 279-330, 294-306
Intra Fc-IL2: 41'-101', 147'-205', 301'-348'
Inter Fc-IL2RB chain- Fc-IL2 chain: 6-6', 9-9', 129-134'

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
Fc-IL2RB: N249, N263, N291, N369

O-glycosylation sites / Sites de O-glycosylation / Posiciones de O-glicosilación
O-glycosylation is experimentally confirmed in the 220-261 peptide of the Fc-IL2RB chain and in the 220-251 peptide of the Fc-IL2 chain with uncertainty on precise Ser and Thr glycosylated residues

efpegerglucagonum # efpegerglucagon	human immunoglobulin G4 Fc fragment (h-CH2-CH3-CHS domains [Homo sapiens IGHG4*01 (hinge (1-4), CH2 (5-114), CH3 (115-219), CHS (220-221))] (1-221), disulfide bridged dimer, produced in Escherichia coli, with one Fc chain conjugated (P ¹ →C ^{30'}) via a bifunctional maleimide-polyethylene glycol-aldehyde linker to a synthetic glucagon peptide analogue (1"-30") (E ^{16''} →K ^{20''} linked by a lactam ring) glucagon analogue
efpégerglucagon	fragment Fc de l'immunoglobuline G4 humaine (domaines h-CH2-CH3-CHS [Homo sapiens IGHG4*01 (charnière (1-4), CH2 (5-114), CH3 (115-219), CHS (220-221))] (1-221), dimère à ponts disulfure, produit chez Escherichia coli, avec une chaîne Fc conjuguée (P ¹ →C ^{30'}) via une liaison bifonctionnelle maléimide-polyéthylène glycol-aldéhyde à un analogue synthétique du peptide du glucagon (1"-30") (E ^{16''} →K ^{20''} liés par un anneau lactame) analogue du glucagon

efpegerglucagón

fragmento Fc de la inmunoglobulina G4 humana (dominios h-CH2-CH3-CHS [*Homo sapiens* IGHG4*01 (bisagra (1-4), CH2 (5-114), CH3 (115-219), CHS (220-221))]) (1-221), dímero unido a través de puentes disulfuro, producido en *Escherichia coli*, con una cadena Fc conjugada (P¹→ C^{30''}), a través de un enlace bifuncional maleimido-poliétileno glicol-aldehído a un análogo peptídico del glucagón sintético (1"-30'') (E^{16''}→ K^{20''} unido a través de un anillo lactámico) *análogo de glucagón*

2766774-81-4


Sequence / Séquence / Secuencia		
IgG4 Fc		
PSCPAPEFLG	GPSVFLFPFK	PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SQEDPEVQFN 50
WYVDGVEVHN	AKTKPREEQF	NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK 100
GLPSSIEKTI	SKAKGQPREP	QVYTLPPSQE EMTKNQVSLT CLVKGFPSPD 150
IAVEWESNGQ	PENNYKTTPP	VLDSDGSFFL YSRLTVDKSR WQEGNVFSCS 200
VMHEALHNHY	TQKSLSLSLG	K 221

glucagon
YXQGTFTSDY SKYLDERRAKK EEVQWLMTC 30


Mutation / Mutation / Mutación
glucagon: H1>Y", S2>Aib (X"), S16>E", Q20>K", D21>E", C30" added

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-chain: 35-95, 141-199, 35'-95', 141'-199'
Inter-chain: 3-3'

Amide bridge location / Position du pont amide / Posición del puente amido



Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



elfucosum
elfucose

L-fucopyranose (6-deoxy-L-galactopyranose)
congenital glycosylation disorders


elfucose

L-fucopyranose (6-désoxy-L-galactopyranose)
anomalies congénitales de la glycosylation

elfucosa

L-fucopiranososa (6-desoxi-L-galactopiranososa)
defectos congénitos de la glicosilación

C₆H₁₂O₅ 87-96-7



eltrekibartum #

eltrekibart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL7 and CXCL8 (C-X-C chemokines with the Glu-Leu-Arg (ELR) motif)], humanized monoclonal antibody;
 gamma4 heavy chain humanized (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (86.7%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%), CDR-IMGT [8.8.19] (26-33.51-58.97-115)) (1-126)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (127-224), hinge 1-12 S10>P (234) (225-236), CH2 L92 (315) (237-346), CH3 (347-451), CHS K2>del (452)) (127-452)], (140-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-11*01 (85.3%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (232-232":235-235")-bisdisulfide, produced in a Chinese hamster ovary (CHO)-derived cell line transfected with the glutamine synthetase (GS) gene, glycoform alfa
anti-inflammatory

eltrekibart

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL7 et CXCL8 (chémokines C-X-C avec le motif Glu-Leu-Arg (ELR))], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma4 humanisée (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (86.7%) - (IGHD) - IGHJ4*01 (92.3%), CDR-IMGT [8.8.19] (26-33.51-58.97-115)) (1-126)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (127-224), charnière 1-12 S10>P (234) (225-236), CH2 L92 (315) (237-346), CH3 (347-451), CHS K2>del (452)) (127-452)], (140-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-11*01 (85.3%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (232-232":235-235")-bisdisulfure, produite dans une lignée cellulaire dérivée des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) transfectée avec le gène de la glutamine synthétase (GS), glycoforme alfa
anti-inflammatoire

eltrekibart

immunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL7 y CXCL8 (quimiocinas C-X-C con el motivo Glu-Leu-Arg (ELR))], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma4 humanizada (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (86.7%) - (IGHD) - IGHJ4*01 (92.3%), CDR-IMGT [8.8.19] (26-33.51-58.97-115)) (1-126)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (127-224), bisagra 1-12 S10>P (234) (225-236), CH2 L92 (315) (237-346), CH3 (347-451), CHS K2>del (452)) (127-452)], (140-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-11*01 (85.3%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (232-232":235-235")-bisdisulfuro, producido en una línea celular derivada de las células ováricas de hámster chino (CHO) transfectada con el gen de la glutamina sintetasa (GS), forma glicosilada alfa
antiinflamatorio

2484883-56-7

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYEFT SYWIHWVRQA PGQGLEWMGN 50
ISPNSSGSANY NEKFKSRVTM TRDTSTSTVY MELSSLRSED TAVYYCAREG 100
PYSYYPSPREY YGSDLWQGGT LVTVSSASTK GPSVFPLAPC SRSTSESTAA 150
LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVTPSS 200
SLGKTYTCN VDHKPSNTKV DKRVESKYGP PCPPCPAPEF LGGPSTVFLFP 250
PKPKDTLMIS RTPEVTCVVV DVSQEDPEVQ FNWYVDGVEV HNAKTKFREE 300
QFNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYKCKVS NKGLEPSIEK TISKAKGQPR 350
EPQVYTLPPS QEEMTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT 400
PPVLDSGGSF FLYSRLTVDK SRWQEGNVFS CSVMHEALHN HYTQKSLSL 450
LG 452

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
EIVLTQSPAT LSLSPGERAT LSCRASQSSIS NNLHWYQQKP GQAPRLLIYY 50
TSRSVSGIPA RFGSGSGSTD FTLTISSLEP EDFAVYYCGQ NNEWPEVFGG 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEC 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 153-209 267-327 373-431
22"-96" 153"-209" 267"-327" 373"-431"
Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 140-214' 140"-214"
Inter-H-H (h 8, h 11) 232-232" 235-235"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) /
piroglutamilo (pE, 5-oxopropilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 303, 303"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

emidurdarum
emidurdar

N-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-bromo-2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]urea
ATP-binding cassette transporter subfamily G member 2
(ABCG2) efflux pump inhibitor


émidurdar

N-[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-N'-[4-bromo-2-(1H-tétrazol-5-yl)phényl]urée
inhibiteur de la pompe à efflux du membre 2 de la sous-famille G
des transporteurs à cassette liant l'ATP (ABCG2)

emidurdar

N-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]-N'-[4-bromo-2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]urea
inhibidor de la bomba de eflujo del miembro 2 de la subfamilia G
del transportador del casete de unión al ATP (ABCG2)

C₁₆H₉BrF₆N₆O 265646-85-3



emilumenibum

emilumenib

(5¹*R*,5³*S*,5⁴*R*)-1⁵,1⁶-dimethoxy-6-methyl-7⁶-(2,2,2-trifluoroethyl)-4,6-diaza-7(4)-thieno[2,3-*d*]pyrimidina-1(3)-pyridazina-2(1,4)-benzena-5(1,3)-cyclopentanaheptaphan-5⁴-ol
antineoplastic

émiluménib


(5¹*R*,5³*S*,5⁴*R*)-1⁵,1⁶-diméthoxy-6-méthyl-7⁶-(2,2,2-trifluoroéthyl)-4,6-diaza-7(4)-thiéno[2,3-*d*]pyrimidina-1(3)-pyridazina-2(1,4)-benzéna-5(1,3)-cyclopentanaheptaphan-5⁴-ol
antinéoplasique

emilumenib

(5¹*R*,5³*S*,5⁴*R*)- 6-metil-1⁵,1⁶-dimetoxi-7⁶-(2,2,2-trifluoroetil)-4,6-diaza-7(4)-tieno[2,3-*d*]pirimidina-1(3)-piridazina-2(1,4)-bencena-5(1,3)-ciclopentanaheptafan-5⁴-ol
antineoplásico

C₂₇H₂₉F₃N₆O₃S

2440018-29-9

**emzadiribum**

emzadirib

propan-2-yl [3-(*tert*-butylsulfamoyl)-4-{2-[*trans*-4-(((propan-2-yl)oxy)carbonyl)amino]cyclohexyl}-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]carbamate
DNA repair protein RAD51 inhibitor, antineoplastic

emzadirib


[3-(*tert*-butylsulfamoyl)-4-{2-[*trans*-4-(((propan-2-yl)oxy)carbonyl)amino]cyclohexyl}-1,3-thiazol-5-yl)phényl]carbamate de propan-2-yle
inhibiteur de la protéine de réparation de l'ADN RAD51, antinéoplasique

emzadirib

[3-(*tert*-butilsulfamoil)-4-{2-[*trans*-4-(((propan-2-il)oxi]carbonil)amino]ciclohexil}-1,3-tiazol-5-il)fenil]carbamato de propan-2-ilo
inhibidor de la proteína de reparación del ADN RAD51, antineoplásico

C₂₇H₄₀N₄O₆S₂

2301085-04-9



enavermotidum

enavermotide

L-lysyl-L-seryl-L-valyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-lysyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-seryl-L-iso-leucylglycyl-L-iso-leucyl-L-arginyl-L-glutamyl-L-histidine
immunological agent for active immunization (antineoplastic)

énavermotide

L-lysyl-L-séryl-L-valyl-L-tryptophyl-L-séryl-L-lysyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-séryl-L-iso-leucylglycyl-L-iso-leucyl-L-arginyl-L-glutamyl-L-histidine
agent immunologique d'immunisation active (antinéoplasique)

enavermotida

L-lisil-L-seril-L-valil-L-triptofil-L-seril-L-lisil-L-leucil-L-glutaminiil-L-seril-L-iso-leucilglicil-L-iso-leucil-L-arginil-L-glutaminiil-L-histidina
agente inmunológico para inmunización activa (antineoplásico)

C₇₉H₁₃₁N₂₅O₂₁

524060-93-3

Lys — Ser — Val — Trp — Ser — Lys — Leu — Gln — Ser — Ile — Gly — Ile — Arg — Gln — His

enristomigum #

enristomig

immunoglobulin VH-VH'-G1(h-CH2-CH3) heavy chain dimer, anti-[*Homo sapiens* CD274 (programmed cell death 1 ligand 1, PDL1, PD-L1, B7 homolog 1, B7H1, B7-H1, PDCD1LG1)] and anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (TNF receptor superfamily member 9, 4-1BB, T-cell antigen ILA, CD137)], monoclonal antibody humanized, bispecific, tetravalent;
 IG VH-VH'-G1(h-CH2-CH3) heavy chain humanized (1-466) [VH anti-CD274 humanized (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (78.1%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (81.8%) S127>K (110), S128>P (111), CDR-IMGT [8.7.5] (26-33.51-57.96-100)) (1-111) -6-mer bis(diglycyl-seryl) linker (112-117) -VH' anti-TNFRSF9 humanized (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (80.2%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (81.8%) S127>K (237), S128>P (238), CDR-IMGT [8.7.15] (143-150.168-174.213-227)) (118-238) -4-mer tetraglycyl linker (239-242) -*Homo sapiens*IGHG1*01 h-CH2-CH3 (100%), G1m1CH3 D12, L14G1v71 CH2 ELL1-4-1.2>del (hinge 6-15 (243-252), CH2 ELL1.4-1.2>del (254*255) (253-359), CH3 D12 (375), L14 (377) (360-464), CHS (465-466)) (243-466)]; dimer (248-248":251-251")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa
immunostimulant, antineoplastic

enristomig

immunoglobuline VH-VH'-G1(h-CH2-CH3) chaîne lourde dimère, anti-[*Homo sapiens* CD274 (ligand 1 de mort programmée 1, PDL1, PD-L1, B7 homologue 1, B7H1, B7-H1, PDCD1LG1)] and anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (membre 9 de la superfamille des récepteurs du TNF, 4-1BB, antigène ILA des cellules T, CD137)], anticorps monoclonal humanisé, bispécifique, tétravalent;

enristomig

IG VH-VH'-G1(h-CH2-CH3) chaîne lourde humanisée (1-466) [VH anti-CD274 humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (78.1%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (81.8%) S127>K (110), S128>P (111), CDR-IMGT [8.7.5] (26-33.51-57.96-100)) (1-111) -6-mer bis(diglycyl-séryl) linker (112-117) -VH' anti-TNFRSF9 humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (80.2%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (81.8%) S127>K (237), S128>P (238), CDR-IMGT [8.7.15] (143-150.168-174.213-227)) (118-238) -4-mer tétraglycyl linker (239-242) -*Homo sapiens* IGHG1*01 h-CH2-CH3 (100%), G1m1CH3 D12, L14,G1v71 CH2 ELL1.4-1.2>del (charnière 6-15 (243-252), CH2 ELL1.4-1.2>del (254^255) (253-359), CH3 D12 (375), L14 (377) (360-464), CHS (465-466)) (243-466)]; dimère (248-248":251-251")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa immunostimulant, antinéoplasique

immunoglobulina VH-VH'-G1(h-CH2-CH3) cadena pesada dímero, anti-[*Homo sapiens* CD274 (ligando 1 de muerte programada 1, PDL1, PD-L1, B7 homólogo 1, B7H1, B7-H1, PDCD1LG1)] y anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (miembro 9 de la superfamilia de los receptores del TNF, 4-1BB, antígeno ILA de las células T, CD137)], anticuerpo monoclonal humanizado, biespecífico, tetravalente; IG VH-VH'-G1(h-CH2-CH3) cadena pesada humanizada (1-466) [VH anti-CD274 humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (78.1%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (81.8%) S127>K (110), S128>P (111), CDR-IMGT [8.7.5] (26-33.51-57.96-100)) (1-111) -6-mer bis(diglicil-seril) enlace (112-117) -VH' anti-TNFRSF9 humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (80.2%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (81.8%) S127>K (237), S128>P (238), CDR-IMGT [8.7.15] (143-150.168-174.213-227)) (118-238) -4-mer tetraglicil enlace (239-242) -*Homo sapiens* IGHG1*01 h-CH2-CH3 (100%), G1m1CH3 D12, L14,G1v71 CH2 ELL1.4-1.2>del (bisagra 6-15 (243-252), CH2 ELL1.4-1.2>del (254^255) (253-359), CH3 D12 (375), L14 (377) (360-464), CHS (465-466)) (243-466)]; dímero (248-248":251-251")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), forma glicosilada alfa immunoestimulante, antineoplásico

2539845-73-1

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLLESGGG	EVQPGGSLRL	SCAASGGIFA	IKPISWYRQA PGKQREWVST 50
TTSSGATNYA	ESVKGRFTIS	RDNAKNTLYL	QMSSLRAEDT AVYYCNVFEY 100
WGQGTLLTVK	PGSGGGSEVQ	LLESGGGEVQ	PGGSLRLSCA ASGFSFSINA 150
MGWYRQAPGK	RREFVAAIES	GRNTVYAESV	KGRFTISRDN AKNTVYLQMS 200
SLRAEDTAVY	YCGLLKGNRV	VSPSVAYWQ	GTLVTVKPGG GGDKTHTCPP 250
CPAPGGPSVF	LFPKPKDNL	MISRTPEVTC	VVDVSHEDP EVKFNWYVDG 300
VEVHNAKTKP	REEQYNSTYR	VVSVLTIVLHQ	DWLNGKEYKC KVSNAKALPAP 350
IEKTISKAKG	QPREPQVYTL	PPSRDELTKN	QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW 400
ESNGQPENNY	KTPPPVLDSD	GSFFLYSKLT	VDKSRWQQGN VFSCSVMEHA 450
LHNHYTQKSL	SLSPGK		466

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-95' 139-212' 280-340' 386-444'
22'-95' 139'-212' 280'-340' 386'-444'
Inter-H-H (h 11, h 14) 248-248' 251-251'

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 316, 316'
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados.

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 466, 466'

envuretcelum

envuretcel

allogeneic retinal pigment epithelial (RPE) cells derived from human embryonic stem cells (hESC). The hESC are expanded in a defined, serum-free, xeno-free culture medium on plates containing mitomycin C (MitC)-inactivated human dermal fibroblast (HDF) feeder cells, seeded initially on laminin/E-cadherin and finally on a reconstituted basement membrane matrix to generate a master cell bank (MCB).

The manufacturing of the human embryonic stem cell-derived retinal pigment epithelial (hESC-RPE) cells consists of 4 phases. First, expansion of the MCB-derived hESCs on plates containing MitC-inactivated HDF feeder cells, coated with laminin/E-cadherin. Second, the hESCs are induced to differentiate into RPE cells in embryoid body differentiation medium (EBDM) over a time frame of 80-140 days. Third, the resulting pigmented clusters are dissociated and expanded on gelatin-coated plates, in media containing a serum replacement additive, fetal bovine serum, basic human fibroblast growth factor (bFGF) and 2-mercaptoethanol, with the cells monitored for medium pigmentation and typical cobblestone epithelial morphology. Finally, the cells are tested for expression of RPE-specific markers (bestrophin-1 [BEST1] and/or paired box 6 [PAX6]), before cell harvest (step 4).

The final cell population is characterized by the upregulation of RPE-specific cell marker (BEST1, PAX6, microphthalmia-associated transcription factor [MITF] and RPE-65), downregulation of embryonic stem cell genes (NANOG, octamer-binding transcription factor 4 [OCT4] and SOX-2) and the capability to phagocytose fluorescence particles ($\geq 40\%$)

cell therapy (macular degeneration)

envuretcel

cellules allogènes de l'épithélium pigmentaire rétinien (EPR) dérivées de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh). Les CSEh sont amplifiées dans un milieu de culture défini, sans sérum et non-xéno, sur des plaques contenant des cellules nourricières de fibroblastes dermiques humains (HDF) inactivés par la mitomycine C (MitC), ensemencées initialement sur de la laminine/E-cadhérine et finalement sur une matrice de membrane basale reconstituée pour générer une banque cellulaire primaire (MCB). La fabrication des cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien dérivées de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh-EPR) comprend 4 phases.

Premièrement, l'amplification des CSEh dérivées de la MCB sur des plaques contenant des cellules nourricières HDF inactivées par MitC, recouvertes de laminine/E-cadhérine. Deuxièmement, les CSEh sont induites à se différencier en cellules de l'EPR dans un milieu de différenciation de corps embryoïde (EBDM) sur une période de 80 à 140 jours. Troisièmement, les amas pigmentés qui en résultent sont dissociés et étendus sur des plaques recouvertes de gélatine, dans un milieu contenant un additif de remplacement du sérum, du sérum bovin fœtal, du facteur de croissance de base des fibroblastes humains (bFGF) et du 2-mercaptoéthanol, les cellules étant contrôlées pour une pigmentation moyenne et une morphologie épithéliale typique en pavé. Enfin, les cellules sont testées pour l'expression des marqueurs spécifiques de l'EPR (bestrophine-1 [BEST1] et/ou boîte à paire 6 [PAX6]), avant prélèvement des cellules (étape 4).

La population cellulaire finale est caractérisée par la régulation positive des marqueurs cellulaires spécifiques de l'EPR (BEST1, PAX6, facteur de transcription associé à la microphthalmie [MITF] et RPE-65) et la régulation négative des gènes des cellules souches embryonnaires (NANOG, facteur de transcription de liaison à l'octamère 4 [OCT4] et SOX-2) et la capacité de phagocyter des particules fluorescentes ($\geq 40\%$)

thérapie cellulaire (dégénérescence maculaire)

envurectel

células del epitelio pigmentario de retina (RPE), alogénicas, derivadas de células madre embrionarias humanas (hESC). Las hESC se expanden en un medio de cultivo definido, sin suero ni componentes xenogénicos, en placas que contienen fibroblastos dérmicos humanos (HDF) inactivados con mitomicina C (MitC) como células alimentadoras, tras sembrarse inicialmente en laminina/E-caderina y finalmente en una matriz de membrana basal reconstituida para generar un banco de células maestro (MCB). La fabricación de las células del epitelio pigmentario de retina derivadas de células madre embrionarias humanas (hESC-RPE) consiste en 4 fases. Primero, expansión de las células hESCs derivadas del MCB en placas que contienen células alimentadoras HDF inactivadas con MitC, forradas con laminina/E-caderina. Segundo, las hESCs se inducen a diferenciarse a células RPE en medio de diferenciación de cuerpos embrioides (EBDM) durante un rango de tiempo de 80-140 días. Tercero, los agrupamientos pigmentados resultantes se disocian y expanden en placas forradas de gelatina, en medio que contiene como aditivo un sustituto de suero, suero bovino fetal, factor de crecimiento básico de fibroblastos humanos (bFGF) y 2-mercaptoetanol, con las células siendo monitorizadas para pigmentación del medio y morfología típica de empedrado epitelial. Finalmente, las células se evalúan para la expresión de marcadores específicos de RPE (bestrofina-1 [BEST1] y/o caja apareada 6 [PAX6]), antes de ser cosechadas (paso 4). La población celular final se caracteriza por la sobre expresión de marcadores específicos de células RPE (BEST1, PAX6, factor de transcripción asociado a microftalmia (MITF) y REP-65) y la baja expresión de genes de células madre embrionarias (NANOG, factor de transcripción de unión a octámero 4 [OCT4] y SOX-2) y la capacidad de fagocitar partículas fluorescentes (≥40%)

terapia celular (degeneración macular)

evalstotugum #

evalstotug

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4, CTLA-4, CD152)], monoclonal antibody;

gamma1 heavy chain (1-447) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.11] (26-33.51-58.97-107)) (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 R120 (215) (119-216), hinge 1-15 (217-231), CH2 (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS K2>del (447)) (119-447)], (221-215')-disulfide with kappa light chain (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*03 (78.1%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [7.3.9] (27'-33'.51'-53'.90'-98'') (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215'')]; dimer (227-227'':230-230'')-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DG44, glycoform alfa

immunostimulant, antineoplastic

évalstotug

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CTLA4 (protéine 4 associée aux lymphocytes T cytotoxiques, CTLA-4, CD152)], anticorps monoclonal;

chaîne lourde gamma1 (1-447) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.11] (26-33.51-58.97-107)) (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 R120 (215) (119-216), charnière 1-15 (217-231), CH2 (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS K2>del (447)) (119-447)], (221-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*03 (78.1%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [7.3.9] (27'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') - *Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DG44, glycoforme alfa
immunostimulant, antinéoplasique

evalstotug

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CTLA4 (proteína 4 asociada a los linfocitos T citotóxicos, CTLA-4, CD152)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-447) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.11] (26-33.51-58.97-107)) (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 R120 (215) (119-216), bisagra 1-15 (217-231), CH2 (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359) (342-446), CHS K2>del (447)) (119-447)], (221-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*03 (78.1%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [7.3.9] (27'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') - *Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-DG44, forma glicosilada alfa
inmunoestimulante, antineoplásico

2460399-39-5

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
EVQLVESGGG LVQPFGSLRL SCAASGFTFS HYTMHWVRQA PGKGLEWVSF 50
ISYDGNKKYY ADSVKGRETI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCARTG 100
WLGPFYWGQ GTLVTVSSAS TKGPSVFPLA PSSKSTSGGT AALGCLVKDY 150
FPEPVTVSWN SGALTSKVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTQYTI 200
CNVNHKPSNT KVDKKVEPKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VLFPPKPKD 250
TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVKFNWYV DGVEVHNAKT KPREEQYNST 300
YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY 350
TLPSPSRDEL TKNQVSLTCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTTTPVLD 400
SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSFG 447
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
AIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCRASQYVG SSVLAWYLQK PGQSPQLLIY 50
GAFSRATGIP ARFSGSGSGT EFTLTISSLQ SEDFAVYYCQ QDGSSPWTFG 100
QGTVKVEIKRT VAAPSVFIIF PSDEQLKSGT ASVVCLNNF YPREAKVQWK 150
VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYSLSSSTL TSKADYERK KVIACEVTHQ 200
GLSSPVTKSF NRGEK 215
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 145-201 262-322 368-426

22"-96" 145"-201" 262"-322" 368"-426"

Intra-L (C23-C104) 23'-89' 135'-195'

23"-89" 135"-195"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 221-215' 221"-215"

Inter-H-H (h 11, h 14) 227-227" 230-230"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 298, 298"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados

evruleucelum

evruleucel

allogeneic cytotoxic T lymphocytes (CTLs) specific for Epstein-Barr virus (EBV) latency proteins, including latent membrane protein 1 (LMP1), LMP2, and EBV nuclear antigen 1 (EBNA1). Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) isolated by apheresis from healthy EBV-seropositive donors are stored according to human leukocyte antigen (HLA) typing. The PBMCs are then co-cultured in media containing interleukin 2 (IL-2) together with irradiated antigen-presenting cells, created by incubation of PBMCs from the same donor with a replication-deficient adenovirus encoding a transgene that expresses a truncated EBNA1 protein fused to a polypeptide containing multiple epitopes from LMP1 and LMP2. The final cell population consists of >70% CD3+ T lymphocytes (mix of CD4+/CD8+ T lymphocytes), with the remaining cells made up of natural killer (NK) cells, B lymphocytes, and monocytes (typically <1%). The cells are specific for EBV protein antigens (LMP1, LMP2 and EBNA1) and lyse cells presenting epitopes from these EBV antigens in complex with a matching HLA

cell therapy (immunomodulator)

évruleucel

lymphocytes T cytotoxiques allogéniques (CTLs) spécifiques des protéines de latence du virus d'Epstein-Barr (EBV), notamment la protéine de membrane latente 1 (LMP1), la LMP2 et l'antigène nucléaire 1 de l'EBV (EBNA1). Les cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC) isolées par aphérèse à partir de donneurs sains séropositifs pour l'EBV sont stockées en fonction du typage de l'antigène leucocytaire humain (HLA). Les PBMC sont ensuite co-cultivées dans un milieu contenant de l'interleukine 2 (IL-2) avec des cellules présentatrices d'antigènes irradiées, créées par incubation de PBMC provenant du même donneur avec un adénovirus déficient en réplication codant un transgène qui exprime une protéine EBNA1 tronquée fusionnée à un polypeptide contenant de multiples épitopes de LMP1 et LMP2.

La population cellulaire finale est composée à plus de 70% de lymphocytes T CD3+ (mélange de lymphocytes T CD4+/CD8+), le reste étant constitué de cellules tueuses naturelles (NK), de lymphocytes B et de monocytes (typiquement <1%). Les cellules sont spécifiques des antigènes protéiques de l'EBV (LMP1, LMP2 et EBNA1) et lysent les cellules présentant des épitopes de ces antigènes EBV en complexe avec un HLA correspondant

thérapie cellulaire (immunomodulateur)

evruleucel

linfocitos T citotóxicos (CTLs) alogénicos específicos de proteínas de latencia del virus de Epstein-Barr (EBV), incluyendo la proteína latente de membrana 1 (LMP1), LMP2 y el antígeno nuclear 1 de EBV (EBNA1). Las células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) aisladas mediante aféresis de donantes sanos seropositivos para EBV se almacenan según su tipaje de antígeno común leucocitario (HLA). Las PBMCs a continuación se co-cultivan en medio que contiene interleuquina 2 (IL-2) junto con células presentadora de antígeno irradiadas creadas mediante incubación de PBMCs del mismo donante con un adenovirus deficiente para replicación que codifica un transgén que expresa una proteína EBNA1 truncada fusionada a un polipéptido que contiene múltiples epítomos de LMP1 y LMP2.

La población celular final consiste en >70% linfocitos T CD3+ (mezcla de linfocitos T CD4+/CD8+), con el resto de células compuesto por células NK, linfocitos B y monocitos (típicamente <1%). Las células son específicas frente a los antígenos proteicos de EBV (LMP1, LMP2 y EBNA1) y lisan células que presentan epítomos de estos antígenos de EBV en complejo con un HLA concordante

terapia celular (inmunomodulador)

fanastomigum #

fanastomig

immunoglobulin L-kappa-H-gamma1_G1(VH-CH1-h)_L-kappa dimer, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (lymphocyte activating 3, lymphocyte-activation 3, CD223)] and anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD-1, PD1, CD279)], monoclonal antibody, bispecific;
[L-kappa-H-gamma1 heavy chain anti-LAG3 and anti-PDCD1 (1-665) [L-kappa anti-LAG3 (1-214) [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV9-124*01 (88.4%) -IGKJ5*01 (91.7%) A120>Q (100)/*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (84.2%) -IGKJ2*01 (90.9%) I126>L (106), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)] (1-107) -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108-214)] -H-gamma1 heavy chain anti-PDCD1 (215-665) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-48*02 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.14] (240-247.265-272.311-324)) (215-335)-*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, IGHG1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 R120>K (432) (336-433), hinge 1-15 (434-448), CH2 L1.3>A (452), L1.2>A (453)(449-558), CH3 E12 (574), M14 (576) (559-663), CHS (664-665)) (336-665)]; (214-216')-disulfide with G1(VH-CH1-h) light chain anti-LAG3 (1'-216') [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV14-4*01 (86.6%) -IGHD -IGHJ4*01 (92.3%) S123>T (108')/*Homo sapiens* IGHV1-69-2*01 (72.9%) -IGHD -IGHJ6*01 (87.5%), CDR-IMGT [8.8.6] (26'-33'.51'-58'.97'-102')) (1'-113') -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120 (CH1 R120>K (210') (114'-211'), hinge 1-5 (212'-216')) (114'-216')]; (438-214'')-disulfide with L-kappa light chain *Homo sapiens* anti-PDCD1 (1'''-214''') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (86.3%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'''-32'''-51'''-53'''-89'''-97''')) (1''-107''') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'''), V101 (191''') (108'''-214''')]; dimer (444-444'':447-447'')-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, glycoform alfa
immunostimulant, antineoplastic

fanastomig

immunoglobuline L-kappa-H-gamma1_G1(VH-CH1-h)_L-kappa dimère, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activateur 3 des lymphocytes, lymphocyte-activation 3, CD223)] et anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)], anticorps monoclonal, bispécifique;
[L-kappa-H-gamma1 chaîne lourde anti-LAG3 et anti-PDCD1 (1-665) [L-kappa anti-LAG3 (1-214) [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV9-124*01 (88.4%) -IGKJ5*01 (91.7%) A120>Q (100)/*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (84.2%) -IGKJ2*01 (90.9%) I126>L (106), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)] (1-107) -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108-214)] -chaîne lourde H-gamma1 anti-PDCD1 (215-665) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-48*02 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.14] (240-247.265-272.311-324)) (215-335)-*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, IGHG1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 R120>K (432) (336-433), charnière 1-15 (434-448), CH2 L1.3>A (452), L1.2>A (453) (449-558), CH3 E12 (574), M14 (576) (559-663), CHS (664-665)) (336-665)]; (214-216')-disulfure avec la chaîne légère G1(VH-CH1-h) anti-LAG3 (1'-216') [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV14-4*01 (86.6%) -IGHD -IGHJ4*01 (92.3%) S123>T (108')/*Homo sapiens*

fanastomig

IGHV1-69-2*01 (72.9%) -IGHD -IGHJ6*01 (87.5%), CDR-IMGT [8.8.6] (26'-33'.51'-58'.97'-102')) (1'-113') - *Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120 (CH1 R120>K (210') (114'-211'), charnière 1-5 (212'-216')) (114'-216'))]; (438-214''')-disulfure avec la chaîne légère L-kappa anti-PDCD1 (1'''-214''') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (86.3%) - IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'''-32'''-51'''-53'''-89'''-97''')) (1'''-107''') - *Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'''), V101 (191''') (108'''-214''')]; dimère (444-444''-447-447''')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa

immunostimulant, antinéoplasique

immunoglobulina L-kappa-H-gamma1_G1(VH-CH1-h)_L-kappa dímero, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activador 3 de los linfocitos, activación del linfocito 3, CD223)] y anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)], anticuerpo monoclonal, biespecífico; [L-kappa-H-gamma1 cadena pesada anti-LAG3 y anti-PDCD1 (1-665) [L-kappa anti-LAG3 (1-214) [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV9-124*01 (88.4%) -IGKJ5*01 (91.7%) A120>Q (100)]/*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (84.2%) -IGKJ2*01 (90.9%) I126>L (106), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1-107) - *Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108-214)] -cadena pesada H-gamma1 anti-PDCD1 (215-665) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-48*02 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.14] (240-247.265-272.311-324)) (215-335) - *Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, IGHG1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 R120>K (432) (336-433), bisagra 1-15 (434-448), CH2 L1.3>A (452), L1.2>A (453) (449-558), CH3 E12 (574), M14 (576) (559-663), CHS (664-665)) (336-665))]; (214-216')-disulfuro con la cadena ligera G1(VH-CH1-h) anti-LAG3 (1'-216') [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV14-4*01 (86.6%) -IGHD -IGHJ4*01 (92.3%) S123>T (108')/*Homo sapiens* IGHV1-69-2*01 (72.9%) -IGHD -IGHJ6*01 (87.5%), CDR-IMGT [8.8.6] (26'-33'.51'-58'.97'-102')) (1'-113') - *Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120 (CH1 R120>K (210') (114'-211'), bisagra 1-5 (212'-216')) (114'-216'))]; (438-214''')-disulfuro con la cadena ligera L-kappa anti-PDCD1 (1'''-214''') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (86.3%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'''-32'''-51'''-53'''-89'''-97''')) (1'''-107''') - *Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'''), V101 (191''') (108'''-214''')]; dímero (444-444''-447-447''')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, forma glicosilada alfa

inmunostimulante, antineoplásico

2761795-00-8

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada : anti-LAG3 and anti-PDCD1 (H, H^{''})
DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASQEIS GYLSWLQKQP GGAIKRLIYA 50
ASALDSGVSF RFGSGRSRSGD YTLTISSLOP EDFADYYCLQ YASYPLTFGQ 100
GKLELKRITV AAFSVFIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVEFDQSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGECEVQLVE SGGGLVQPGG SRLSCAASG FTSDDYGMHW 250
VQAPAGKGLE WVSYISSGSY TIYYADTVKG RFTISRDNAL NSLYLQMNSL 300
RDEDTAVYYC AKRGSSSHVN VMDYWGQGT VTVSSASTKG PSVFPLAPSS 350
KSTSGGTAAL GCLVKDYFPE PVTVSWSNGA LTSGVHTFFA VLQSSGLYSL 400
SSVTVFPSSS LGTQTYICNV NHKPSNTKVD KKEPKSCDK THTCPPCPAP 450
EAAGGFSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV 500
EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI 550
EKTISKARGQ PREPQVYTLF PSREEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE 600
SNGQPENNYK TTPFVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL 650
HNHYTQKSLS LSPGK 665

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera : anti-LAG3 G1(VH-CH1-h) (L', L^{'''})
EVQLVQSGAE VKKPGATVKL SCTASGFNIK DDYMHVVKQR PEQGLDWIGW 50
IVPENANTVY ASKFGQKATI TADTSTNTAY LELSSLRSED TAVVYCTVYG 100
DYWGQGTITV VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAAALG LVKDYFPEPV 150
TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSS VTVFPSSSLG TQTYICNVNH 200
KPSNTRKVDK VEPKSC 216

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera : anti-PDCD1 L-kappa (L^{''}, L^{'''})
DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCRASDHIN NWLAWYQKQP GKAPKLLIYG 50
ATSLTSGVPS RFGSGSGSTP ETTITSLLOP EDIATYICQQ YWSPYTFGG 100
GKLEIKRITV AAFSVFIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVEFDQSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGECE 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 23^{''}-88^{''} 134^{''}-194^{''} 236^{''}-310^{''} 362^{''}-418^{''} 479^{''}-539^{''} 585^{''}-643^{''}
Intra-L (C23-C104) 23^{'''}-96^{'''} 140^{'''}-196^{'''}
22^{'''}-96^{'''} 140^{'''}-196^{'''}
23^{'''}-88^{'''} 134^{'''}-194^{'''}
23^{'''}-88^{'''} 134^{'''}-194^{'''}
Inter-H-L (CL 126-h 5)^{*} 214^{''}-216^{''} 214^{'''}-216^{'''}
Inter-H-L (h 5-CL 126) 438^{''}-214^{''} 438^{'''}-214^{'''}
Inter-H-H (h 11, h 14) 444^{''}-444^{''} 447^{''}-447^{''}
^{*}crosslink between the H chain (L-kappa-H-gamma-1) and the L chain (G1(VH-CH1-h)).

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 515, 515^{*}
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 675, 675^{*}

fencabtagen^{''}um autoleu^{''}celum #
fencabtagene autoleu^{''}cel

autologous CD4/CD8 enriched T lymphocytes obtained from peripheral blood by leukapheresis, transduced with a self-inactivating, non-replicating lentiviral vector encoding a chimeric antigen receptor targeting human receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 (also known as epidermal growth factor receptor 2 (HER2)). The expressed transgene comprises a human immunoglobulin G (IgG) leader sequence, an extracellular HER2-binding domain provided by a designed ankyrin repeat protein, a human c-Myc tag sequence, an anti-T cell receptor (TCR)/CD3 ϵ binding domain provided by the humanized UCHT1 single-chain antibody fragment (scFv), and a CD4 co-receptor membrane anchoring and intracellular domain, under the control of the murine stem cell virus (MSCV) promoter.

The construct is flanked by 5' and 3' long terminal repeats (LTRs) and also contains a ψ packaging signal, a truncated gag, a Rev response element (RRE), a central polypurine tract (cPPT) sequence, a Woodchuck hepatitis virus posttranscriptional regulatory element (WPRE) and a synthetic ID tag sequence. The vector is pseudotyped by vesicular stomatitis virus (VSV) glycoprotein G.

The leukapheresis material is enriched for CD4⁺ and CD8⁺ T lymphocytes by positive immunoselection. The cells are then activated by CD3 and CD28 agonists and transduced with the lentiviral vector. The cells are further culture expanded in growth media with serum replacement containing interleukin 2 (IL-2) and 7 (IL-7). The cell suspension consists of T lymphocytes (>96% CD3⁺) with greater than 10% (average 45%) of the T lymphocytes expressing the transgene

cell-based gene therapy (antineoplastic)

fencabtagène autoleucel

lymphocytes T autologues enrichis en CD4/CD8 obtenus par leucaphérèse à partir de sang périphérique, transduits avec un vecteur lentiviral auto-inactivant et non répliquant codant un récepteur antigénique chimérique ciblant le récepteur de la tyrosine-protéine kinase humaine erbB-2 (également connu sous le nom de récepteur 2 du facteur de croissance épidermique (HER2)). Le transgène exprimé comprend une séquence de tête de l'immunoglobuline G (IgG) humaine, un domaine extracellulaire de liaison à HER2 fourni par une protéine conçue avec des répétitions d'ankyrine, une séquence de marquage c-Myc humaine, un domaine de liaison au récepteur des cellules T (TCR)/CD3ε fourni par le fragment d'anticorps humanisé à chaîne unique UCHT1 (scFv), et un domaine intracellulaire et d'ancrage à la membrane du co-récepteur CD4, sous le contrôle du promoteur du virus des cellules souches murines (MSCV). La construction est flanquée de longues répétitions terminales (LTR) en 5' et 3' et contient également un signal d'encapsulation ψ, un *gag* tronqué, un élément de réponse Rev (RRE), une séquence du tractus polypurine central (cPPT), un élément régulateur post-transcriptionnel du virus de l'hépatite de Woodchuck (WPRE) et une séquence synthétique avec étiquette d'identification. Le vecteur est pseudotypé par la glycoprotéine G du virus de la stomatite vésiculaire (VSV). Le matériel de leucaphérèse est enrichi en lymphocytes T CD4+ et CD8+ par immunosélection positive. Les cellules sont ensuite activées par des agonistes CD3 et CD28 et transduites avec le vecteur lentiviral. Les cellules en culture sont ensuite amplifiées dans un milieu de croissance avec un remplacement du sérum contenant de l'interleukine 2 (IL-2) et 7 (IL-7). La suspension cellulaire est constituée de lymphocytes T (>96% CD3+) avec plus de 10% (moyenne 45%) des lymphocytes T exprimant le transgène *thérapie génique à base de cellules (antineoplasique)*

fencabtagén autoleucel

linfocitos T autólogos enriquecidos en CD4/CD8 obtenidos de sangre periférica mediante leucoaféresis, transducidos con un vector lentiviral auto inactivante, no replicativo, que codifica para un receptor de antígenos quimérico dirigido al receptor tirosina-proteína quinasa erbB-2 humano (también conocido como receptor del factor de crecimiento epidérmico 2 (HER2)). El transgén expresado contiene una secuencia líder de la inmunoglobulina G (IgG) humana, un dominio extracelular de unión a HER2 proporcionado por una proteína con repeticiones de anquirina diseñada para ello, una secuencia etiqueta c-Myc humana, un dominio de unión anti-receptor del linfocito T (TCR)/CD3ε proporcionado por el fragmento de cadena sencilla (scFv) del anticuerpo UCHT1 humanizado y un dominio de anclaje a la membrana e intracelular del co-receptor CD4, bajo el control de un promotor del virus de células madre murino (MSCV). El constructo está flanqueado por repeticiones terminales largas y también contiene una señal de empaquetamiento ψ, un *gag* truncado, un elemento de respuesta Rev (RRE), una secuencia de tracto de polipurina central (cPPT), un elemento regulador post-transcripcional del virus de la hepatitis de la marmota (WPRE) y una secuencia etiqueta ID sintética. El vector está pseudotipado con la glicoproteína G del virus de la estomatitis vesicular (VSV). El material de leucoaféresis se enriquece para linfocitos T CD4+ y CD8+ mediante inmunoselección positiva. Las células se activan después mediante agonistas de CD3 y CD28, y se transducen con el vector lentiviral. Las células se expanden más en cultivo en medio de crecimiento con sustituto de suero que contiene interleuquinas 2 (IL-2) y 7 (IL-7). La suspensión celular consiste en linfocitos T (>96% CD3+), con más del 10% (media 45%) de los linfocitos T que expresan el transgén. *terapia génica basada en células (antineoplásico)*

fexagratinibum

fexagratinib

N-{5-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1*H*-pyrazol-3-yl}-4-[(3*R*,5*S*)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]benzamide
fibroblast growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic

fexagratinib


N-{5-[2-(3,5-diméthoxyphényl)éthyl]-1*H*-pyrazol-3-yl}-4-[(3*R*,5*S*)-3,5-diméthylpipérazin-1-yl]benzamide
inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes, antinéoplasique

fexagratinib

4-[(3*R*,5*S*)-3,5-dimetilpiperazin-1-il]-*N*-{5-[2-(3,5-dimetoxifenil)etil]-1*H*-pirazol-3-il}benzamida
inhibidor de la tirosina kinasa del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, antineoplásico

C₂₆H₃₃N₅O₃

1035270-39-3

**firicabtagenium autoleucelum #**

firicabtagene autoleucel

autologous T lymphocytes obtained from peripheral blood by leukapheresis, transduced with a self-inactivating, non-replicating lentiviral vector encoding a chimeric antigen receptor (CAR) targeting human CD22. The expressed transgene comprises the granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor subunit alpha (GMCSFR-alpha) signal sequence, an anti-CD22 single chain variable fragment (scFv), a CD8α hinge and transmembrane domain, a 4-1BB costimulatory domain and CD3ζ primary stimulatory domain, under control of the human elongation factor 1 alpha (EF-1α) promoter. The construct is flanked by 5' and 3' long terminal repeats (LTRs) and also contains a ψ packaging signal, a truncated *gag*, a Rev response element (RRE), a central polypurine tract (cPPT) sequence 5' to the transgene, and a partial *neff*/polypurine tract (PPT) sequence 3' to the transgene. The vector is pseudotyped with vesicular stomatitis virus (VSV) glycoprotein G. The leukapheresis material is enriched for CD4/CD8 T lymphocytes by positive immunoselection, activated by CD3 and CD28 agonists and transduced with the lentiviral vector. The cells are then expanded in media containing human AB serum, interleukin 7 (IL-7) and 15 (IL-15). The T lymphocytes (≥70 % CD3+) are positive for the transgene (≥10% CAR positive), demonstrate cytotoxicity against CD22 expressing cells, and secrete interferon gamma in response to CD22 expressing tumour cell lines
cell-based gene therapy (antineoplastic)

firicabtagène autoleucel

lymphocytes T autologues obtenus par leucaphérèse à partir de sang périphérique, transduits avec un vecteur lentiviral auto-inactivant et non répliquant codant un récepteur antigénique chimérique (CAR) ciblant le CD22 humain. Le transgène exprimé comprend la séquence signal du récepteur de la sous-unité alpha du facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages (GMCSFR-alpha), un fragment variable à chaîne unique (scFv) anti-CD22, une charnière et un domaine transmembranaire CD8α, un domaine co-stimulateur 4-1BB et un domaine stimulateur primaire CD3ζ, sous le contrôle du promoteur du facteur d'élongation humain 1 alpha (EF-1α). La construction est flanquée de longues répétitions terminales (LTR) en 5' et 3' et contient également un signal d'encapsulation ψ, un *gag* tronqué, un élément de réponse Rev (RRE) et une séquence du tractus polypurine central (cPPT) en 5' du transgène, ainsi qu'une séquence partielle du tractus *nef*/polypurine (PPT) en 3' du transgène. Le vecteur est pseudotypé avec la glycoprotéine G du virus de la stomatite vésiculaire (VSV).

Le matériel de leucaphérèse est enrichi en lymphocytes T CD4/CD8 par immunosélection positive, activé par des agonistes CD3 et CD28 et transduit avec le vecteur lentiviral. Les cellules sont ensuite amplifiées dans un milieu contenant du sérum AB humain, de l'interleukine 7 (IL-7) et 15 (IL-15). Les lymphocytes T (≥70% CD3+) sont positifs pour le transgène (≥10% CAR positif), démontrent une cytotoxicité contre les cellules exprimant CD22 et sécrètent de l'interféron gamma en réponse à des lignées de cellules tumorales exprimant CD22

thérapie génique à base de cellules (antineoplasique)

firicabtagén autoleucel

linfocitos T autólogos obtenidos de sangre periférica mediante leucoaféresis, transducidos con un vector lentiviral auto inactivante, no replicativo, que codifica para un receptor de antígenos quimérico (CAR) dirigido al CD22 humano. El transgén expresado contiene la secuencia señal de la subunidad alfa del receptor del factor estimulador de colonias de monocitos-macrófagos (GMCSFR-alfa), un fragmento variable de cadena sencilla (scFv) anti-CD22, un dominio bisagra y transmembrana de CD8α, un dominio co-estimulador de 4-1BB y un dominio estimulador primario de CD3ζ, bajo el control del promotor del factor de elongación 1 alfa (EF1α) humano. El constructo está flanqueado por repeticiones terminales largas (LTRs) en 5' y 3' y también contiene una señal de empaquetamiento ψ, un *gag* truncado, un elemento de respuesta Rev (RRE), una secuencia de tracto de polipurina central (cPPT) en posición 5' con respecto al transgén, y una secuencia de tracto de polipurina/*nef* parcial (PPT) en posición 3' con respecto al transgén. El vector está pseudotipado con la glicoproteína G del virus de la estomatitis vesicular (VSV). El material de leucoaféresis se enriquece para linfocitos T CD4/CD8 mediante inmunoselección positiva, se activa mediante agonistas de CD3 y CD28 y se transduce con el vector lentiviral. Las células se expanden después en medio que contiene suero AB e interleuquinas 7 (IL-7) y 15 (IL-15). Los linfocitos T (≥70% CD3+) son positivos para el transgén (≥10% CAR positivos), demuestran citotoxicidad contra células que expresan CD22 y secretan interferón gamma en respuesta a líneas de células tumorales que expresan CD22

terapia génica basada en células (antineoplásico)

firmonertinibum

firmonertinib

N-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino]-5-[[4-(1-methyl-1*H*-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-3-yl]prop-2-enamide
tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic

firmonertinib


N-[2-[[2-(diméthylamino)éthyl](méthyl)amino]-5-[[4-(1-méthyl-1*H*-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridin-3-yl]prop-2-énamide
inhibiteur de tyrosine kinase, antinéoplasique

firmonertinib

N-[2-[[2-(dimetilamino)etil](metil)amino]-5-[[4-(1-metil-1*H*-indol-3-il)pirimidin-2-il]amino]-6-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-3-il]prop-2-enamida
inhibidor de la tirosina kinasa, antineoplásico

C₂₈H₃₁F₃N₈O₂

1869057-83-9

**florbenguanum (¹⁸F)**florbenguane (¹⁸F)

N-[[3-(¹⁸F)fluorophenyl]methyl]guanidine
diagnostic agent

florbenguane (¹⁸F)


N-[[3-(¹⁸F)fluorophényl]méthyl]guanidine
agent diagnostique

florbenguano (¹⁸F)

N-[[3-(¹⁸F)fluorofenil]metil]guanidina
agente de diagnóstico

C₈H₁₀¹⁸FN₃

156021-12-4

**fosigotifatorum**

fosigotifator


((2*S*)-1,4-bis[2-(4-chloro-3-fluorophenoxy)acetamido]bicyclo[2.2.2]octan-2-yl)oxymethyl dihydrogen phosphate
eukaryotic translation initiation factor 2B (eIF2B) activator

fosigotifator
 dihydrogénophosphate de (((2S)-1,4-bis[2-(4-chloro-3-fluorophénoxy)acétamido]bicyclo[2.2.2]octan-2-yl)oxy)méthyle
activateur du facteur d'initiation de la traduction eucaryote 2B (eIF2B)

fosigotifator
 dihidrogenofosfato de (((2S)-1,4-bis[2-(4-cloro-3-fluorofenoxi)acetamido]bicyclo[2.2.2]octan-2-il)oxi)metilo
activador del factor de iniciación de la traducción eucariota 2B (eIF2B)

 $C_{25}H_{27}Cl_2F_2N_2O_9P$

2415715-84-1



friluglanstatum
 friluglanstat


N-(3-chloro-2-methylphenyl)-2-(methoxymethyl)-6-[2-(trifluoromethyl)benzamido]-1*H*-1,3-benzimidazole-4-carboxamide
prostaglandin E synthase inhibitor

friluglanstat
N-(3-cloro-2-méthylphényl)-2-(méthoxyméthyl)-6-[2-(trifluorométhyl)benzamido]-1*H*-1,3-benzimidazole-4-carboxamide
inhibiteur de la prostaglandine E synthase

friluglanstat
N-(3-cloro-2-metilfenil)-2-(metoximetil)-6-[2-(trifluorometil)benzamido]-1*H*-1,3-benzimidazol-4-carboxamida
inhibidor de la prostaglandina E sintasa

 $C_{25}H_{20}ClF_3N_4O_3$

1422203-86-8



frunexianum
 frunexian

(2*S*,3*R*)-3-[(2-aminopyridin-4-yl)methyl]-1-[[[(1*R*)-1-cyclohexylethyl]carbamoyl]-4-oxoazetidine-2-carboxylic acid
blood coagulation factor XIa inhibitor

frunéxian


acide (2*S*,3*R*)-3-[(2-aminopyridin-4-yl)méthyl]-1-[[[(1*R*)-1-cyclohexyléthyl]carbamoïl]-4-oxoazétidine-2-carboxylique
inhibiteur du facteur Xla de coagulation

frunexián

ácido (2*S*,3*R*)-3-[(2-aminopiridin-4-il)metil]-1-[[[(1*R*)-1-ciclohexiletil]carbamoil]-4-oxoazetidina-2-carboxílico
inhibidor del factor Xla de coagulación

C₁₉H₂₆N₄O₄

1803270-60-1



galvokimigum #
galvokimig

immunoglobulin G1(VH-CH1-h)-scFv_L-kappa-scFv, anti-*[Homo sapiens* IL17A (interleukin 17A, IL-17A) and IL17F (interleukin 17F, IL-17F)], anti-*[Homo sapiens* IL13 (interleukin 13, IL-13)], anti-*[Homo sapiens* ALB (albumin, human serum albumin, HSA)], humanized monoclonal antibody, trispecific, trivalent;
fused G1(VH-CH1-h)-scFv heavy-kappa heavy chain humanized (1-492) [VH-IGHG1 CH1-h anti-IL-17A/F humanized (1-228) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-7*01 (88.7%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%) T123>L (120), CDR-IMGT [8.8.18] (26-33.51-58.97-114)] (1-125)-*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (222) (126-223), hinge 1-5 (224-228) (126-228))] -11-mer (seryl-tetraglycyl-threonyl-tetraglycyl-seryl) linker (229-239) -scFv heavy-kappa anti-ALB humanized, scFv-v1 C49 (VH)-C120 (VL) (240-492) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (78.6%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (93.3%), C49 (283), CDR-IMGT [8.7.15] (265-272.290-296.335-349)) (240-360) -20-mer tetrakis(tetraglycyl-seryl) linker (361-380) -V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (86.5%) -(IGHD) -IGKJ1*01 (90.9%) C120 (483), CDR-IMGT [7.3.11] (407-413.431-433.470-480)) (381-492)]], (228-214')-disulfide with the fused L-kappa-scFv heavy-kappa light chain humanized (1'-469') [L-kappa anti-IL-17A/F humanized (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-13*02 (80.0%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')] -11-mer seryl-bis(tetraglycyl-seryl) linker (215'-225') -scFv heavy-kappa anti-IL13 humanized, scFv-v1 C49 (VH)-C120 (VL) (226'-469') [VH (*Homo sapiens*IGHV1-69*08 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), C49 (269'), CDR-IMGT [8.8.9] (251'-258'.276'-283'.322'-330')) (226'-341') -20-mer tetrakis(tetraglycyl-seryl) linker (342'-361') -V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-NL1*01 (83.9%) -(IGHD) -IGKJ2*01 (91.7%), C120 (460'), CDR-IMGT [6.3.8] (388'-393'.411'-413'.450'-457')) (362'-469')]], produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DG44, non-glycosylated
immunosuppressant, anti-inflammatory

galvokimig immunoglobuline G1(VH-CH1-h)-scFv_L-kappa-scFv, anti-[*Homo sapiens* IL17A (interleukine 17A, IL-17A) et IL17F (interleukine 17F, IL-17F)], anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukine 13, IL-13)], anti-[*Homo sapiens* ALB (albumine, sérum albumine humaine, SAH)], anticorps monoclonal humanisé, trispécifique, trivalent; chaîne lourde fusionnée G1(VH-CH1-h)-scFv heavy-kappa humanisée (1-492) [VH-IGHG1 CH1-h anti-IL-17A/F humanisée (1-228) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-7*01 (88.7%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%) T123>L (120), CDR-IMGT [8.8.18] (26-33.51-58.97-114))] (1-125)-*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (222) (126-223), charnière 1-5 (224-228) (126-228))] -11-mer (séryl-tétraglycyl-thréonil-tétraglycyl-séryl) linker (229-239) -scFv heavy-kappa anti-ALB humanisé, scFv-v1 C49 (VH)-C120 (VL) (240-492) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (78.6%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (93.3%), C49 (283), R120>Q (352), CDR-IMGT [8.7.15] (265-272.290-296.335-349))] (240-360) -20-mer tétrakis(tétraglycyl-séryl) linker (361-380) -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (86.5%) -(IGHD) -IGKJ1*01 (90.9%), C120 (483), CDR-IMGT [7.3.11] (407-413.431-433.470-480)) (381-492)], (228-214')-disulfure avec la chaîne légère fusionnée L-kappa-scFv heavy-kappa humanisée (1'-469') [L-kappa anti-IL-17A/F humanisée (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-13*02 (80.0%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')] -11-mer séryl-bis(tétraglycyl-séryl) linker (215'-225') -scFv heavy-kappa anti-IL13 humanized, scFv-v1 C49 (VH)-C120 (VL) (226'-341') [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*08 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), C49 (269'), CDR-IMGT [8.8.9] (251'-258'.276'-283'.322'-330'')) (226'-341') -20-mer tétrakis(tétraglycyl-séryl) linker (342'-361') -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.9%) -(IGHD) -IGKJ2*01 (91.7%), C120 (460'), CDR-IMGT [6.3.8] (388'-393'.411'-413'.450'-457'')) (362'-469')]], produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DG44, non-glycosylé
immunomodulateur, anti-inflammatoire

galvokimig immunoglobulina G1(VH-CH1-h)-scFv_L-kappa-scFv, anti-[*Homo sapiens* IL17A (interleukina 17A, IL-17A) e IL17F (interleukina 17F, IL-17F)], anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukina 13, IL-13)], anti-[*Homo sapiens* ALB (albúmina, sero albúmina humana, SAH)], anticuerpo monoclonal humanizado, trispécífico, trivalente; cadena pesada fusionada G1(VH-CH1-h)-scFv pesada-kappa humanizada (1-492) [VH-IGHG1 CH1-h anti-IL-17A/F humanizada (1-228) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-7*01 (88.7%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (90.9%) T123>L (120), CDR-IMGT [8.8.18] (26-33.51-58.97-114))] (1-125)-*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (222) (126-223), bisagra 1-5 (224-228) (126-228))] -11-mer (seril-tetraglicil-treonil-tetraglicil-seril) enlace (229-239) -scFv pesada-kappa anti-ALB humanizada, scFv-v1 C49 (VH)-C120 (VL) (240-492) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (78.6%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (93.3%), C49 (283), R120>Q (352), CDR-IMGT [8.7.15] (265-272.290-296.335-349))] (240-360) -20-mer tetraakis(tetraglicil-seril) enlace (361-380) -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (86.5%) -(IGHD) -IGKJ1*01 (90.9%), C120 (483), CDR-IMGT [7.3.11] (407-413.431-433.470-480)) (381-492)], (228-214')-disulfuro con la cadena ligera fusionada L-kappa-scFv pesada-kappa humanizada (1'-469') [L-kappa anti-IL-17A/F humanizada (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-13*02 (80.0%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')] -11-mer seril-bis(tetraglicil-seril) enlace (215'-225') -scFv pesada-kappa anti-IL13 humanizada, scFv-v1 C49 (VH)-C120 (VL) (226'-341') [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*08 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), C49 (269'), CDR-IMGT [8.8.9] (251'-258'.276'-283'.322'-330'')) (226'-341') -20-mer tetraakis(tetraglicil-seril) enlace (342'-361') -V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-NL1*01 (83.9%) -(IGHD) -IGKJ2*01 (91.7%), C120 (460'), CDR-IMGT [6.3.8] (388'-393'.411'-413'.450'-457'')) (362'-469')]], producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-DG44, no glicosilado
immunomodulador, antiinflamatorio

2648456-30-6

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-IL-17A/F G1(VH-CH1-h) -anti-ALB scFv
EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS DYNMAWVRQA PGKGLEWVAT 50
ITYEGRNTYY RDSVKGRFTI SRDANKSLY LQMNSLRAED TAVYCASPP 100
QYYEGSIYRL WFAHWGQGTL VTVSSASTKG PSVFPLAPSS KSTSGGTAAL 150
GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVTVFPSSS 200
LGTQTYICNV NHHKPSNTKVD KKVEPKSCSG GGGTGGGSE VQLLESGGGL 250
VQPGGSLRLS CAVSGIDLNS YAINWVRQAF GKCLEWIGII WASGTTYAT 300
WAKGRFTISR DNSKNTVYLQ MNSLRAEDTA VYYCARTVPG YSTAPYFDLW 350
GQGTLLTVSS GGGSGGGGS GGGSGGGGS DIQMTQSPSS VSASVGDRVT 400
ITCQSSPSVM SNFLSWYQQK PGKAPKLLIY EASKLTSGVP SRFSGSGSGT 450
DFTLTISLQ PEDFATYYCG GGYSSISDTT FCGTKVEIK RT 492

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera: anti-IL-17A/F L-kappa -anti-IL13 scFv
AIQLTQSPSS LSASVGDRVT ITCRADESVR TLMHWYQQKP GKAPKLLIYL 50
VSNSEIGVPD RFGSGSGSDT FRLTISLQEP EDFATYYCQQ TWSDPWTFGQ 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEHKK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGECSGGGGS GGGGSEVQLV QSGAEVKKPG SSVKVSCKAS 250
GYSFTSYIYH WVRQAPGQCL EWMGRIGPGS GDINYNKFKF GRATFTVDKS 300
TSTAYMELSS LRSEDVAVY CARFHYDGAD WQGTLLTVTS SGGGSGGGG 350
SGGGSGGGG SDIQMTQSPS SLSASVGDRV TITCKASQNI NENLDWYQQK 400
PGKAPKLLIY YTDILTQGP SRFSGSGSGT DYTLTISLQ PEDFATYYCY 450
QYYSGYTFGC GTKLEIKRT 469

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 152-208 261-334 403-469
Intra-H scFv C49 (VH)-C120 (VL)* 283-483
Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194' 247'-321' 384'-449'
Intra-L scFv C49 (VH)-C120 (VL)* 269'-460'
Inter-H-L (h 5-CL 126) 228-214'
* Engineered additional disulfide bond to stabilize the scFv.

No N-glycosylation sites / pas de site de N-glycosylation / ninguna posición de N-glicosilación

gamcemetinibum
gamcemetinib

(10*R*)-3-[[2-chloro-5-(ethoxymethyl)pyrimidin-4-yl]oxy]-10-methyl-9,10,11,12-tetrahydro-8*H*-[1,4]diazepino[5',6':4,5]thieno[3,2-*f*]quinolin-8-one
MAP kinase-activated protein kinase 2 (MK2) inhibitor, anti-inflammatory

gamcémétinib


(10*R*)-3-[[2-chloro-5-(éthoxyméthyl)pyrimidin-4-yl]oxy]-10-méthyl-9,10,11,12-tétrahydro-8*H*-[1,4]diazépino[5',6':4,5]thiéno[3,2-*f*]quinoléin-8-one
inhibiteur de la protéine kinase 2 activée par la MAP kinase (MK2), anti-inflammatoire

gamcemetinib

(10*R*)-3-[[2-cloro-5-(etoximetil)pirimidin-4-il]oxi]-10-metil-9,10,11,12-tetrahidro-8*H*-[1,4]diazepino[5',6':4,5]tieno[3,2-*f*]quinolein-8-ona
inhibidor de la proteína kinasa 2 activada por MAP kinasa (MK2), antiinflamatorio

C₂₂H₂₀ClN₅O₃S

1887069-10-4



ganipatidium

ganipatide

N^1 -acetyl- $N^{6,24}$ -({{(1*r*,4*r*)-4-[(19-carboxynonadecanamido)methyl]cyclohexane-1-carbonyl}-L- γ -glutamyl-L- γ -glutamyl-L- γ -glutamyl)[D-Tyr¹,Aib²,Ahx¹⁴,Arg¹⁸,Lys²⁴,Pro³¹]human gastric inhibitory polypeptide (GIP)-(52-82)-peptide-31-amide
gastric inhibitory polypeptide (GIP) receptor agonist

ganipatide

N^1 -acétyl- $N^{6,24}$ -({{(1*r*,4*r*)-4-[(19-carboxynonadécanamido)méthyl]cyclohexane-1-carbonyl}-L- γ -glutamyl-L- γ -glutamyl-L- γ -glutamyl)[D-Tyr¹,Aib²,Ahx¹⁴,Arg¹⁸,Lys²⁴,Pro³¹]polypeptide inhibiteur gastrique humaine (GIP)-(52-82)-peptide-31-amide
agoniste du récepteur du polypeptidique insulinothéropé dépendant du glucose (GIP)


ganipatida

N^1 -acetil- $N^{6,24}$ -({{(1*r*,4*r*)-4-[(19-carboxinonadecanamido)metil]ciclohexane-1-carbonil}-L- γ -glutamyl-L- γ -glutamyl-L- γ -glutamyl)[D-Tir¹,Aib²,Ahx¹⁴,Arg¹⁸,Lis²⁴,Pro³¹]polipéptido inhibidor gástrico humano (GIP)-(52-82)-péptido-31-amida
agonista del receptor del polipéptido insulínótropico dependiente de la glucosa (GIP)

2758595-29-6

YXEGTFISDY SIA^{*}XDKIRQQ DFKWLLAQK P 31

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados

**gengleucelum**

gengleucel

allogeneic memory-like natural killer (NK) cells derived after cytokine induction from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of HLA-haploidentical donors. The PBMCs are depleted of CD3⁺ cells and cultured in media containing interleukin 15 and 21 (IL-15, IL-21), hydrocortisone and fetal bovine serum (FBS) to induce trans-differentiation.

The final cell population consists of NK cells (CD3-CD56⁺ >80%), expressing CD122 (>80%) and does not contain CD3⁺ cells (<5%). The cells can produce perforin 1 and granzyme and demonstrate cytotoxicity against myelogenous leukemia cells *in vitro* (≥50%)
cell therapy (immunomodulator, antineoplastic)

gengleucel

cellules tueuses naturelles (NK) allogéniques présentant une fonction mémoire dérivées de cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC) de donneurs HLA-haploidentiques après une induction par cytokines. Les PBMC sont débarrassées des cellules CD3+ et cultivées dans un milieu contenant des interleukines 15 et 21 (IL-15, IL-21), de l'hydrocortisone et du sérum bovin fœtal (FBS) pour induire la transdifférenciation.

La population cellulaire finale se compose de cellules NK (CD3-CD56+ >80%), exprimant CD122 (>80%) et ne contenant pas de cellules CD3+ (<5%). Les cellules peuvent produire de la perforine 1 et de la granzyme, et démontrent une cytotoxicité contre les cellules de leucémie myéloïde K562 (≥50%)

thérapie cellulaire (immunomodulateur, antinéoplasique)

gengleucel

células NK similares a memoria alogénicas, derivadas, tras inducción por citoquinas, de células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) de donantes haploidenticos para HLA. Las PBMCs se deplecionan de células CD3+ y se cultivan en medio que contiene interleuquinas 15 y 21 (IL-15, IL-21), hidrocortisona y suero bovino fetal (FBS) para inducir transdiferenciación.

La población celular final consiste en células NK (CD3-CD56+ >80%) que expresan CD122 (>80%) y no contiene células CD3+ (<5%). Las células pueden producir perforina 1 y granzima y demuestran citotoxicidad (≥50%) frente a las células de leucemia mielógena K562

terapia celular (immunomodulador, antineoplásico)

givastomigum #

givastomig

immunoglobulin G1-scFv_L-kappa, anti-[*Homo sapiens* CLDN18 (claudin 18, claudin-18, SFTPJ, surfactant associated protein J) isoform 2, extracellular domain 1 (EC1)], anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (TNF receptor superfamily member 9, 4-1BB, T cell antigen ILA, CD137)], humanized monoclonal antibody, bispecific, agonist;
fused G1-scFv lambda-heavy chain humanized (1-716) [gamma1 heavy chain anti-CLDN18 humanized (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-3*01 (85.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109))] (1-120)-*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, IGHG1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge 1-15 (219-233), CH2 N84.4>A (300) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)] -15-mer tris(tetraglycyl-seryl) linker (451-465) -scFv lambda-heavy anti-TNFRSF9 humanized, scFv-v2 C120 (VL)-C49 (VH) (466-716) [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-47*02 (91.8%) -IGLJ2*01 (90.9%), C120 (568), CDR-IMGT [8.3.11] (491-498.516-518.555-565)) (466-575) -20-mer tetrakis(tetraglycyl-seryl) linker (576-595) -VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), C49 (639), CDR-IMGT [8.8.14] (621-628.646-653.692-705)) (596-716)]]; (223-220')-disulfide with kappa light chain anti-CLDN18 humanized (1'-220') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (88.1%) -IGKJ2*01 (91.7%) Q120>G (106'), CDR-IMGT [12.3.9] (27'-38'.56'-58'.95'-103'')) (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (159'), V101 (197') (114'-220')]]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, non-glycosylated
immunostimulant, antineoplastic

givastomig

immunoglobuline G1-scFv, anti-[*Homo sapiens* CLDN18 (claudine 18, claudine-18, SFTPJ, protéine J associée au surfactant) isoforme 2, domaine extracellulaire 1 (EC1)], anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (membre 9 de la superfamille des récepteurs du TNF, 4-1BB, antigène ILA des cellules T, CD137)], anticorps monoclonal humanisé, bispécifique, agoniste;

chaîne lourde fusionnée G1-scFv lambda-lourde humanisée (1-716) [chaîne lourde gamma1 anti-CLDN18 humanisée (1-450) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (85.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120)-*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, IGHG1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière 1-15 (219-233), CH2 N84.4>A (300) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)] -15-mer tris(tétraglycyl-séryl) linker (451-465) -scFv lambda-lourd anti-TNFRSF9 humanisé, scFv-v2 C120 (VL)-C49 (VH) (466-575) [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-47*02 (91.8%) -IGLJ2*01 (90.9%), C120 (568), CDR-IMGT [8.3.11] (491-498.516-518.555-565)) (466-575) -20-mer tétrakis(tétraglycyl-séryl) linker (576-595) -VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), C49 (639), CDR-IMGT [8.8.14] (621-628.646-653.692-705)) (596-716)]; (223-220')-disulfure avec la chaîne légère kappa anti-CLDN18 humanisée 1'-220') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (88.1%) -IGKJ2*01 (91.7%) Q120>G (106'), CDR-IMGT [12.3.9] (27'-38'.56'-58'.95'-103'')) (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (159'), V101 (197') (114'-220'')]; dimère (229-229'':232-232'')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, non-glycosylé

immunostimulant, antinéoplasique

givastomig

immunoglobulina G1-scFv, anti-[*Homo sapiens* CLDN18 (claudina 18, claudina-18, SFTPJ, proteína J asociada con surfactante) isoforma 2, dominio extracelular 1 (EC1)], anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (miembro 9 de la superfamilia de los receptores del TNF, 4-1BB, antígeno ILA de las células T, CD137)], anticuerpo monoclonal humanizado, biespecífico, agonista;

cadena pesada fusionada G1-scFv lambda-pesada humanizada (1-716) [cadena pesada gamma1 anti-CLDN18 humanizada (1-450) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-3*01 (85.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120)-*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, IGHG1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra 1-15 (219-233), CH2 N84.4>A (300) (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)] -15-mer tris(tétraglicil-seril) enlace (451-465) -scFv lambda-pesado anti-TNFRSF9 humanizado, scFv-v2 C120 (VL)-C49 (VH) (466-575) [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-47*02 (91.8%) -IGLJ2*01 (90.9%), C120 (568), CDR-IMGT [8.3.11] (491-498.516-518.555-565)) (466-575) -20-mer tétrakis(tétraglicil-seril) enlace (576-595) -VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), C49 (639), CDR-IMGT [8.8.14] (621-628.646-653.692-705)) (596-716)]; (223-220')-disulfuro con la cadena ligera kappa anti-CLDN18 humanizada 1'-220') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (88.1%) -IGKJ2*01 (91.7%) Q120>G (106'), CDR-IMGT [12.3.9] (27'-38'.56'-58'.95'-103'')) (1'-113') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (159'), V101 (197') (114'-220'')]; dímero (229-229'':232-232'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, no glicosilado

inmunoestimulante, antineoplásico

2762499-30-7

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-CLDN18 G1 -anti-TNFRSF9 scFv	
QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT TYPIEWVRQA PGQRLEWMGN	50
FHPYNDDTKY NEKFKGRTVI TRDTSASTAY MELSSLRSED TAVVYICARRA	100
YGYFPYANDYW QGGTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK	150
DYFPPEPTVS WNSGALTSGV HTFFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT	200
YICNVNHHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP	250
KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYA	300
STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ	350
VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV	400
LDSGGGFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK	450
GGGGSGGGGS GGGGSQSVLT QPPSASGTPG QRVTTISCSGS SSNIGNNYVT	500
WYQQLPFGTAP KLLIYADSHR PSGVPDRFSG SKSGTSASLA ISGLRSEDEA	550
DYYCATWDYS LSGYVFGCGT KLTVLGGGS GGGSGGGGS GGGGSEVQLL	600
ESGGGLVQPG GSLRLSCAAS GFTFSSYDMS WVRQAPGKCL EWVSWISYSG	650
GSIIYYADSVK GRFTISRDN S KNTLYLQMNS LRAEDTAVYY CARDAQRNMS	700
REEDYWGQGT LTVTSS	716
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera : anti-CLDN18 L-kappa	
DIWMTQSPDS LAVSLGERAT INCKSSQSLL NAGNQKNYLT WYQQKPGQPP	50
KLLIYRASSR ESGVPDRFSG SGSGTDFTLT ISSLQAEDVA VYYCQNDYIY	100
PYTFGGGTKL EIKRTVAAPS VFIFPPSDEQ LKSGTASVVC LLNNFYPREA	150
KVQWKVDNAL QSGNSQESV E QDSKDYSTYS LSSTLTLSKA DYEKKHYVAC	200
EVTHQGLSSP VTKSFNRGEC	220

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428 487-554 617-691
22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428" 487"-554" 617"-691"
Intra-H scFv VL120-VH49* 568"-639"
23"-94" 140"-200"
23"-94" 140"-200"
Intra-L (C23-C104) 223-220" 223"-220"
Inter-H-H (h 5-CL 126) 223-220" 223"-220"
Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"
*Engineered additional disulfide bond to stabilize the scFv.

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutamínilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolinyl) / pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolinyl) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

No N-glycosylation sites / pas de sites de N-glycosylation / ninguna posición de N-glicosilación
H CH2 N84.4>A (G1v29): 300, 300"

glecirasibum
glecirasib

(1*M*)-7-(2-amino-3,4,5,6-tetrafluorophenyl)-6-chloro-1-[4-methyl-2-(propan-2-yl)pyridin-3-yl]-2-oxo-4-[4-(prop-2-enoyl)piperazin-1-yl]-1,2-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carbonitrile
Kirsten rat sarcoma (KRAS) viral oncogene homolog inhibitor, antineoplastic

glécirasib


(1*M*)-7-(2-amino-3,4,5,6-tétrafluorophényl)-6-chloro-1-[4-méthyl-2-(propan-2-yl)pyridin-3-yl]-2-oxo-4-[4-(prop-2-énoyl)pipérazin-1-yl]-1,2-dihydro-1,8-naphtyridine-3-carbonitrile
inhibiteur de l'homologue de l'oncogène viral du sarcome du rat de Kirsten (KRAS), antinéoplasique

glecirasib

(1*M*)-7-(2-amino-3,4,5,6-tetrafluorofenil)-6-cloro-1-[4-metil-2-(propan-2-il)piridin-3-il]-2-oxo-4-[4-(prop-2-enoil)piperazin-1-il]-1,2-dihidro-1,8-naftiridina-3-carbonitrilo
inhibidor homólogo del oncogén viral del sarcoma de rata de Kirsten (KRAS), antineoplásico

$C_{31}H_{26}ClF_4N_7O_2$

2657613-87-9



golmestrocelum
golmestrocel

allogeneic mesenchymal stromal cells (MSC) derived from synovial donor tissue. The primary culture is performed in serum-free media containing lipids and cytokines (e.g. epidermal growth factor (EGF), fibroblast growth factor (FGF)), followed by expansion and high density culture in media containing additional growth factors (e.g. L-ascorbic acid 2-phosphate, transforming growth factor- β (TGF- β)) to form *ex vivo* a three-dimensional tissue. The final cells express mesenchymal progenitor cell markers CD13, CD44, CD73, and CD90 (>95% each) and are CD11b, CD34 and CD45 negative. The MSCs are capable of differentiating into chondrocytes and produce glycosaminoglycan
cell therapy (tissue regeneration)

golmestrocel

cellules stromales mésenchymateuses (MSC) allogènes dérivées du tissu synovial du donneur. La culture primaire est effectuée dans un milieu sans sérum contenant des lipides et des cytokines (par exemple, facteur de croissance épidermique (EGF), facteur de croissance des fibroblastes (FGF)), suivie d'une expansion et de cultures à haute densité dans un milieu contenant des facteurs de croissance supplémentaires (par exemple, acide L-ascorbique 2-phosphate, facteur de croissance transformant- β (TGF- β)) pour former un tissu tridimensionnel *ex vivo*. Les cellules finales expriment les marqueurs de cellules progénitrices mésenchymateuses CD13, CD44, CD73 et CD90 (>95% chacun) et sont négatives pour CD11b, CD34 et CD45. Les MSCs sont capables de se différencier en chondrocytes et de produire du glycosaminoglycane
thérapie cellulaire (régénération tissulaire)

golmestrocel

células mesenquimales estromales (MSC) alogénicas, derivadas de tejido sinovial donante. El cultivo primario se realiza en medio libre de suero que contiene lípidos y citoquinas (por ejemplo factor de crecimiento

epidérmico (EGF), factor de crecimiento de fibroblastos (EGF)), seguido de expansión y cultivos en alta densidad en medio que contiene factores de crecimiento adicionales (por ejemplo ácido L-ascórbico 2-fosfato, factor de crecimiento transformante β (TGF- β)) para formar un tejido tridimensional *ex vivo*. Las células finales expresan los marcadores de célula mesenquimal progenitora CD13, CD44, CD73 y CD90 (>95% cada uno) y son negativas para CD11b, CD34 y CD45. Las MSCs son capaces de diferenciarse en condrocitos y producen glicosaminoglicano
terapia celular (regeneración tisular)

gruticibartum #
gruticibart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* F11 (coagulation factor XI, FXI, plasma thromboplastin antecedent, PTA)], monoclonal antibody; gamma4 heavy chain (1-443) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV2-6-7*01 (83.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (92.3%) L124>V (112)/*Homo sapiens* IGHV4-38-2*02 (76.5%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%) L123>T (111), CDR-IMGT [8.7.10] (26-33.51-57.96-105)) (1-116) -*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (117-214), hinge 1-12 S10>P (224) (215-226), CH2 L92 (305) (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV6-17*01 (82.1%) -IGKJ2*01 (83.3%) L124>V (104')/*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (82.1%) -IGKJ4*01 (90.9%)), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'') (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214'')]; dimer (222-222'':225-225'')-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO)/dhFr- cell line lacking the enzyme dihydrofolate reductase (DHFR), glycoform alfa
anticoagulant

gruticibart

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* F11 (facteur de coagulation XI, FXI, antécédent de la thromboplastine plasmatique, PTA)], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-443) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV2-6-7*01 (83.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (92.3%) L124>V (112)/*Homo sapiens* IGHV4-38-2*02 (76.5%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%) L123>T (111), CDR-IMGT [8.7.10] (26-33.51-57.96-105)) (1-116) - *Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (117-214), charnière 1-12 S10>P (224) (215-226), CH2 L92 (305) (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV6-17*01 (82.1%) -IGKJ2*01 (83.3%) L124>V (104')/*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (82.1%) -IGKJ4*01 (90.9%)), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'') (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214'')]; dimère (222-222'':225-225'')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) lignée cellulaire CHO/dhFr- ne présentant pas l'enzyme dihydrofolate réductase (DHFR), glycoforme alfa
anticoagulant

gruticibart

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* F11 (factor de coagulación XI, FXI, antecedente de la tromboplastina plasmática, PTA)], anticuerpo monoclonal;
cadena pesada gamma1 (1-443) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV2-6-7*01 (83.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (92.3%) L124>V (112)/*Homo sapiens* IGHV4-38-2*02 (76.5%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%) L123>T (111), CDR-IMGT [8.7.10] (26-33.51-57.96-105)) (1-116) - *Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (117-214), bisagra 1-12 S10>P (224) (215-226), CH2 L92 (305) (227-336), CH3 (337-441), CHS (442-443)) (117-443)], (130-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV6-17*01 (82.1%) -IGKJ2*01 (83.3%) L124>V (104')/*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (82.1%) -IGKJ4*01 (90.9%)), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'') (1'-107'') - *Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214'')]; dímero (222-222"-225-225")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO) línea celular CHO/dhFr- en ausencia de la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR), forma glicosilada alfa
anticoagulante

2704554-77-6

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
QVQLQESGPG	LVKPSSETLSI	TCTVSGFSLT	GYGIYWVRQP
IWGDGRTDYN	SALKSRVTIS	KDNSKSQVSL	KLSSVTAADT
GSKDYWGQGT	TVTVSSASTK	GPSVFPLAPC	SRSTSESTAA
EPVTVSWNSG	ALTSGVHTFP	AVLQSSGLYS	LSSVTVTPSS
VDHKPSNTKV	DKRVESKYGP	PCPPCPAPEF	LGGPSVFLFP
RTP EVTCCVVV	DVSQEDPEVQ	FNWYVDGVEV	HNAKTKPREE
VLTVLHQDWL	NGKEYKCKVS	NKGLPSSIEK	TISKAKGQPR
QEEMTKNQVS	LTCLVKGFYP	SDIAVEWESN	GQPENNYKTT
FLYSRLTVDK	SRWQEGNVFS	CSVMHEALHN	HYTQKSLSL
			LGK
			443
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIQMTQSPSS	LSASVGDRVT	ITCKASQDVS	TAVAWYQQKQ
TSYRNTGVPD	RFGSGSGGTD	FTFTISSLPQ	EDIAVYYCQQ
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFFP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNIFY
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYSLSTLT	LSKADYEKKH
LSSPVTKSFN	RGEC		
			214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-95	143-199	257-317 363-421
	22"-95"	143"-199"	257"-317" 363"-421"
Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'	
	23'''-88'''	134'''-194'''	
Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	130-214'	130"-214"	
Inter-H-H (h 8, h 11)	222-222"	225-225"	

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamide (pE, 5-oxopropyle) /
piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 293, 293"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 443, 443"

ibentatugum #

ibentatug

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CSP1 (cell surface plectin 1)], monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain (1-451) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV5-9-3*01 (87.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (91.7%) A128>S (122)/*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.15] (26-33.51-58.97-111)) (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (219) (123-220), hinge 1-15 (221-235), CH2 (236-345), CH3 D12 (361), L14 (363) (346-450), CHS K2>del (451)) (123-451)], (225-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV2-109*01 (94.0%) -IGKJ2*03 (90.9%) S120>Q (105')/*Homo sapiens* IGKV2-28*01 (83.0.5%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [11.3.9] (27'-32'.55'-57'.94'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')]; dimer (231-231":234-234")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa
antineoplastic

ibentatug

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CSP1 (pectine 1 de surface cellulaire)], anticorps monoclonal;
 chaîne lourde gamma1 (1-451) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV5-9-3*01 (87.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (91.7%) A128>S (122)/*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.15] (26-33.51-58.97-111)) (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (219) (123-220), charnière 1-15 (221-235), CH2 (236-345), CH3 D12 (361), L14 (363) (346-450), CHS K2>del (451)) (123-451)], (225-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-219') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV2-109*01 (94.0%) -IGKJ2*03 (90.9%) S120>Q (105')/*Homo sapiens* IGKV2-28*01 (83.0.5%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [11.3.9] (27'-32'.55'-57'.94'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')]; dimère (231-231":234-234")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa
antineoplasique

ibentatug

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CSP1 (pectina 1 de superficie celular)], anticuerpo monoclonal;
 cadena pesada gamma1 (1-451) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV5-9-3*01 (87.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (91.7%) A128>S (122)/*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.15] (26-33.51-58.97-111)) (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (219) (123-220), bisagra 1-15 (221-235), CH2 (236-345), CH3 D12 (361), L14 (363) (346-450), CHS K2>del (451)) (123-451)], (225-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV2-109*01 (94.0%) -IGKJ2*03 (90.9%) S120>Q (105')/*Homo sapiens* IGKV2-28*01 (83.0.5%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [11.3.9] (27'-32'.55'-57'.94'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (158'), V101 (196') (113'-219')]; dímero (231-231":234-234")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), forma glicosilada alfa
antineoplásico

2767983-94-6

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLVESGGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFS	RYGMSWVRQA
ISIGGTYTY	PDSMKGRFTI	SRDNSKNTLY	LQMNSLRAED
YGQYSYGLD	YWGQGT	LVTV	SSASTKGPSV
VKDYFPEPVT	VSWSNGALTS	GVHTFP	AVLQ
QTYICNVNHR	PSNTKVDKKV	EPKSCDKTHT	CPPCPAPELL
KPKDGLMISR	TPEVTCVVVD	VSHEDPEVKF	NWYVDGVEVH
YNSTYRVVSV	LTIVLHQDWLN	GKEYKCKVSN	KALPAPIEKT
PQVYTLPPSR	DELTKNQVSL	TCLVKGFYFS	DAVEWESNG
PVLDSDGSFF	LYSKLTVDKS	RWQQGNVFSC	SVMHEALHNH
G			
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIVMTQSALS	NPVTLGQSAS	ISCRSSKSL	HSQGITYLYW
LLIYQMSNRA	SGVPDRFSSS	GSGETDFTLKI	SRVEAEDVGV
LTFGQGTKLE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVCL
VQWKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDS	STYSL
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC		

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22"-96" 149"-205" 266"-326" 372"-430"
22"-96" 149"-205" 266"-326" 372"-430"
Intra-L (C23-C104) 23"-93" 139"-199"
23"-93" 139"-199"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 225"-219" 225"-219"
Inter-H-H (h 11, h 14) 231"-231" 234"-234"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 302, 302"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

icalcaprantum
icalcaprant

4-(4-([(2*S*)-2-(3-methoxy-1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)]pyrrolidin-1-yl)methyl)phenoxy)benzamide
kappa-opioid receptor antagonist


icalcaprant

4-(4-([(2*S*)-2-(3-méthoxy-1-méthyl-1*H*-pyrazol-4-yl)]pyrrolidin-1-yl)méthyl)phénoxy)benzamide
antagoniste du récepteur opioïde kappa

icalcaprant

4-(4-([(2*S*)-2-(1-metil-3-metoxi-1*H*-pirazol-4-il)]pirrolidin-1-il)metil)fenoxi)benzamida
antagonista del receptor opioide kappa

C₂₃H₂₆N₄O₃ 2227384-17-8



igermetostatium
igermetostat

N-[(4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl]-3-[ethyl(oxan-4-yl)amino]-2-methyl-5-([(1*r*,3*r*)-3-(piperidin-1-yl)cyclobutyl]oxy)benzamide
antineoplastic

igermétostat


N-[(4,6-diméthyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)méthyl]-3-[éthyl(oxan-4-yl)amino]-2-méthyl-5-([(1*r*,3*r*)-3-(pipéridin-1-yl)cyclobutyl]oxy)benzamide
antinéoplasique

igermetostat

N-[(4,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)metil]-3-[etil(oxan-4-il)amino]-2-metil-5-[[*(1r,3r)*-3-(piperidin-1-il)ciclobutil]oxi]benzamida
antineoplásico

C₃₂H₄₆N₄O₄

2409538-60-7

**imdatifanum**

imdatifan

3-fluoro-5-[[*(2aR,4S)*-1,1,2,2,4-pentafluoro-2a-hydroxy-2,2a,3,4-tetrahydro-1*H*-cyclopenta[*cd*]inden-5-yl]oxy]benzonitrile
hypoxia-inducible factor (HIF) inhibitor, antineoplastic

imdatifan


3-fluoro-5-[[*(2aR,4S)*-1,1,2,2,4-pentafluoro-2a-hydroxy-2,2a,3,4-tétrahydro-1*H*-cyclopenta[*cd*]indén-5-yl]oxy]benzonitrile
inhibiteur de facteur induit par l'hypoxie (HIF), antinéoplasique

imdatifán

3-fluoro-5-[[*(2aR,4S)*-1,1,2,2,4-pentafluoro-2a-hidroxi-2,2a,3,4-tetrahydro-1*H*-ciclopenta[*cd*]inden-5-il]oxi]benzonitrilo
inhibidor de factor inducible por hipoxia (HIF), antineoplásico

C₁₈H₉F₆NO₂

2511247-29-1

**invopressinum**

invopressin

S^{A1}, S^{A6}-cyclo[L-cysteinyl-L-phenylalanyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-prolyl-(2*S*)-2-amino-4-({*N*⁶-[O-methyl-*N*-(2-phenylacetyl)-D-tyrosyl-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-asparaginyl-L-alanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-isoglutaminyl-*N*⁶-acetyl-L-lysyl]-L-lysyl}amino)butanoyl]glycinamide]
vasopressin V1A receptor partial agonist

invopressine

S^{A1}, S^{A6}-cyclo[L-cystéinyl-L-phénylalaninyl-L-isoleucyl-L-glutaminyl-L-asparaginyl-L-cystéinyl-L-prolyl-(2S)-2-amino-4-({N⁶-[O-méthyl-N-(2-phénylacétyl)-D-tyrosyl-L-phénylalaninyl-L-glutaminyl-L-asparaginyl-L-alanyl-L-prolyl-L-arginyl-L-isoglutaminyl-N⁶-acétyl-L-lysyl]-L-lysyl}amino)butanoyl]glycinamide]

agoniste partiel du récepteur de la vasopressine V1A


invopresina

S^{A1}, S^{A6}-ciclo[L-cisteinil-L-fenilalanil-L-isoleucil-L-glutaminil-L-asparaginil-L-cisteinil-L-prolil-(2S)-2-amino-4-({N⁶-[O-metil-N-(2-fenilacetil)-D-tirosil-L-fenilalanil-L-glutaminil-L-asparaginil-L-alanyl-L-prolil-L-arginil-L-isoglutaminil-N⁶-acetil-L-lisil]-L-lisil}amino)butanoil]glicinamida]

agonista parcial del receptor de vasopresina V1A

C₁₁₀H₁₆₁N₃₁O₂₇S₂

1488411-60-4



irpagratinibum

irpagratinib

N-[(3S,4S)-3-{{6-(2,6-difluoro-3,5-dimethoxyphenyl)-8-(3-methoxy-3-methylazetidin-1-yl)pyrido[3,4-d]pyrimidin-2-yl}amino}oxan-4-yl]prop-2-enamide

fibroblast growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic

irpagratinib

N-[(3S,4S)-3-{{6-(2,6-difluoro-3,5-diméthoxyphényl)-8-(3-méthoxy-3-méthylazétidin-1-yl)pyrido[3,4-d]pyrimidin-2-yl}amino}oxan-4-yl]prop-2-énamide

inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes, antinéoplasique


irpagratinib

N-[(3S,4S)-3-{{6-(2,6-difluoro-3,5-dimetoxifenil)-8-(3-metil-3-metoxiazetidin-1-il)pirido[3,4-d]pirimidin-2-il}amino}oxan-4-il]prop-2-enamida

inhibidor de la tirosina kinasa del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, antineoplásico

C₂₈H₃₂F₂N₆O₅

2230974-62-4




irucalantidum


irucalantide $C^{3.3.1}, S^7: C^{5.3.1}, S^{13}$ -dicyclo[*N*-acetyl-*S*-[(3,5-dimethylphenyl)methyl]-*L*-cysteinyl-*L*-seryl-*L*-phenylalanyl-(2*S*)-azetidine-2-carbonyl-*L*-tyrosyl-*N*⁶-carbamimidoyl-*L*-lysyl-*L*-cysteinyl-*L*-alanyl-ψ(CH₂-NH)-*L*-histidyl-*L*-glutaminy-*L*-α-aspartyl-*L*-leucyl-*L*-cysteinamide}
kallikrein inhibitor

irucalantide $C^{3.3.1}, S^7: C^{5.3.1}, S^{13}$ -dicyclo[*N*-acétyl-*S*-[(3,5-diméthylphényl)méthyl]-*L*-cystéinyl-*L*-séryl-*L*-phénylalanyl-(2*S*)-azétidine-2-carbonyl-*L*-tyrosyl-*N*⁶-carbamimidoyl-*L*-lysyl-*L*-cystéinyl-*L*-alanyl-ψ(CH₂-NH)-*L*-histidyl-*L*-glutaminy-*L*-α-aspartyl-*L*-leucyl-*L*-cystéinamide}
inhibiteur de la kallikréine

irucalantida $C^{3.3.1}, S^7: C^{5.3.1}, S^{13}$ -díciclo[*N*-acetil-*S*-[(3,5-dimetilfenil)metil]-*L*-cisteinil-*L*-seril-*L*-fenilalanil-(2*S*)-azetidina-2-carbonil-*L*-tirosil-*N*⁶-carbamimidoil-*L*-lisil-*L*-cisteinil-*L*-alanil-ψ(CH₂-NH)-*L*-histidil-*L*-glutaminil-*L*-α-aspartil-*L*-leucil-*L*-cisteinamida}
inhibidor de la calicreína



1631160-47-8

**izalontamabum brengitecanum #**

izalontamab brengitecan

immunoglobulin G1-scFv_L-kappa dimer, anti-[*Homo sapiens* EGFR (epidermal growth factor receptor, receptor tyrosine-protein kinase erbB-1, ERBB1, HER1, HER-1, ERBB)] and anti-[*Homo sapiens* ERBB3 (receptor tyrosine protein kinase erbB-3, HER3)], chimeric and *Homo sapiens* monoclonal antibody, tetravalent, bispecific, conjugated to a camptothecin derivative;
fused G1-scFv heavy-lambda heavy chain chimeric and *Homo sapiens* (1-702) [gamma1 heavy chain anti-EGFR chimeric (1-448) [VH (*Mus musculus*IGHV2-2*03 (93.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) A128>S (119), CDR-IMGT [8.7.13] (26-33.51-57.96-108)) (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*08p (100%), G1m3.1 (CH1 I103 (201), R120 (216) (120-217), hinge 1-15 (218-232), CH2 (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS K2>del (448)) (120-448))] -10-mer bis(tetraglycyl-seryl) linker (449-458) -scFv heavy-lambda anti-ERBB3 *Homo sapiens* (459-702) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-7*01 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.11] (484-491.509-516.555-565)) (459-576) -15-mer tris(tetraglycyl-seryl) linker (577-591) -V-LAMBDA (*Homo sapiens*IGLV2-14*03 (93.9%) -IGLJ2*01 (83.3%) L124>V (699), CDR-IMGT [9.3.11] (617-625.643-645.682-692)) (592-702)]], (222-214')-disulfide with kappa light chain anti-EGFR chimeric (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus*IGKV5-48*01 (95.8%) -IGKJ5*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (228-228'':231-231'')-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa; substituted at the sulfur atoms of the *L*-cysteinyl residues 214', 214'', 222, 222'', 228, 228'', 231, 231'' with (3*RS*)-1-[[4*S*,13*S*,21*S*]-13-benzyl-1-carboxy-22-[[[(1*S*,9*S*)-9-ethyl-5-fluoro-9-hydroxy-4-methyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1*H*,12*H*-benzo[*de*]pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolin-1-yl]amino]-21-methyl-5,8,11,14,17,22-hexa-oxo-20-oxa-2,6,9,12,15,18-hexaazadocosan-4-yl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl (*brengitecan*) groups
antineoplastic

izalontamab brengitécan

immunoglobuline G1-scFv_L-kappa dimère, anti-[*Homo sapiens* EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique, récepteur tyrosine-protéine kinase erbB-1, ERBB1, HER1, HER-1, ERBB)] et anti-[*Homo sapiens* ERBB3 (récepteur à activité tyrosine kinase erbB-3, HER3)], anticorps monoclonal chimérique et *Homo sapiens*, tétravalent, bispécifique, conjugué à un dérivé de la camptothécine;

chaîne lourde fusionnée G1-scFv lourd-lambda chimérique et *Homo sapiens* (1-702) [gamma1 anti-EGFR chimérique (1-448) [VH (*Mus musculus* IGHV2-2*03 (93.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) A128>S (119), CDR-IMGT [8.7.13] (26-33.51-57.96-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*08p (100%), G1m3,1 (CH1 I103 (201), R120 (216) (120-217), charnière 1-15 (218-232), CH2 (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS K2>del (448)) (120-448)] -10-mer bis(tétraglycyl-séryl) linker (449-458) -scFv lourd-lambda anti-ERBB3 *Homo sapiens* (459-702) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-7*01 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.11] (484-491.509-516.555-565)) (459-576) -15-mer tris(tétraglycyl-séryl) linker (577-591) -V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV2-14*03 (93.9%) -IGLJ2*01 (83.3%) L124>V (699), CDR-IMGT [9.3.11] (617-625.643-645.682-692)) (592-702)]]], (222-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa anti-EGFR chimérique (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV5-48*01 (95.8%) -IGKJ5*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa, substitué sur les atomes de soufre des résidus L-cystéinyl 214', 214"', 222, 222", 228, 228", 231, 231" avec des groupes 3RS)-1-[(4S,13S,21S)-13-benzyl-1-carboxy-22-[[[(1S,9S)-9-éthyl-5-fluoro-9-hydroxy-4-méthyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1*H*,12*H*-benzo[*de*]pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinoléin-1-yl]amino]-21-méthyl-5,8,11,14,17,22-hexa-oxo-20-oxa-2,6,9,12,15,18-hexaazadocosan-4-yl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yle (*brengitécan*)
antinéoplasique

izalontamab brengitecán

immunoglobulina G1-scFv_L-kappa dímero, anti-[*Homo sapiens* EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico, receptor tirosina-proteína kinasa erbB-1, ERBB1, HER1, HER-1, ERBB)] y anti-[*Homo sapiens* ERBB3 (receptor con actividad tirosina kinasa erbB-3, HER3)], anticuerpo monoclonal quimérico y *Homo sapiens*, tetravalente, biespecífico, conjugado con un derivado de la camptotecina;

cadena pesada fusionada G1-scFv pesada-lambda quimérica y *Homo sapiens* (1-702) [gamma1 anti-EGFR quimérico (1-448) [VH (*Mus musculus* IGHV2-2*03 (93.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) A128>S (119), CDR-IMGT [8.7.13] (26-33.51-57.96-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*08p (100%), G1m3,1 (CH1 I103 (201), R120 (216) (120-217), bisagra 1-15 (218-232), CH2 (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS K2>del (448)) (120-448)] -10-mer bis(tetraglicil-seril) enlace (449-458) -scFv pesada-lambda anti-ERBB3 *Homo sapiens* (459-702) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-7*01 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.11] (484-491.509-516.555-565)) (459-576) -15-mer tris(tetraglicil-seril) enlace (577-591) -V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV2-14*03 (93.9%) -IGLJ2*01 (83.3%) L124>V (699), CDR-IMGT [9.3.11] (617-625.643-645.682-692)) (592-702)]]], (222-214')-disulfuro con la

cadena ligera kappa anti-EGFR quimérica (1'-214') [V-KAPPA (*Mus musculus* IGKV5-48*01 (95.8%) -IGKJ5*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), forma glicosilada alfa, substituido en los átomos de azufre de los residuos de L-cisteinil 214', 214"', 222, 222", 228, 228", 231, 231" con grupos (3*RS*)-1-[(4*S*,13*S*,21*S*)-13-bencil-1-carboxi-22-[[[(1*S*,9*S*)-9-etil-5-fluoro-9-hidroxi-4-metil-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahidro-1*H*,12*H*-benzo[*de*]pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolein-1-il]amino]-21-metil-5,8,11,14,17,22-hexaoxo-20-oxa-2,6,9,12,15,18-hexaazadocosan-4-il]-2,5-dioxopirrolidin-3-ilo (*bregitecán*)
antineoplásico

2760528-47-8

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-EGFR G1 - anti-ERBB3 scFv

QVQLKQSGPG LVQPSQSLSI TCTVSGFSLT NYGVHVRQS PGKLEWLGV 50
IWSGGNTDYN TPTFSRLSIN KDNKSQVFF KMNSLQSDNT AIYYCARALT 100
YYDEYFAYWG QGTLTVTSSA STKGPSVFFL APSSKSTSGG TAALGCLVKD 150
YFPEPTVSW NSGALTSGVH TFPVQLQSSG LYSLSSTVTV PSSSLGTQTY 200
ICNVNHHKPSN TKVDKRVKPK SCDKTHTCP CPAPPELLGGP SVFLFPKPK 250
DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS 300
TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIETISK AKGQPREPQV 350
YTLPPSRDEL TKNQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL 400
DSGGGFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGGG 450
GGSGGGGSQV QLQESGGGLV KPGGSLRLSC AASGTFSSY WMSWVRQAPG 500
KGLEWVANIN RDGSASYVD SVKGRFTISR DDAKNSLYLQ MNSLRAEDTA 550
VYYCARDRGV GYFDLWGRGT LVTVSSGGGG SGGGGSGGGG SQSALTQPAS 600
VSGSPGQSIT ISCTGTSSDV GGYNFVSWYQ QHPGKAPKLM IYDVSDRPSG 650
VSDRFSGSKS GNTASLIISG LQADDEADYY CSSYGSSTH VIFGGGKVT 700
VL 702

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera: anti-EGFR L-kappa

DILLTQSPVI LSVSPGERVS FSCRASQSIG TNIHWYQRT NGSPRLLIKY 50
ASEISIGIPS RFGSGSGSDT FTLSINSVES EDIADYYCQQ NNNWPTTFA 100
GTKLELKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGECC 214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22"-95" 146-202 263-323 369-427 480-554 613-681
22"-95" 146"-202" 263"-323" 369"-427" 480"-554" 613"-681"

Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194"
23"-88" 134"-194"

Inter-H-L* (h 5-CL 126) 222-214' 222"-214"

Inter-H-H* (h 11, h 14) 228-228" 231-231"

*The four inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 8 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker.

*Les quatre ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 8 cystéinyl en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif.

*Faltan los cuatro puentes disulfuro inter-catenarios, una media de 8 cisteinil está conjugada a conectores de principio activo.

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /

Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutaminyl (pE, 5-oxoprolyl) / pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolyle) /

piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)

H VH Q1: 1,1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H VH N97: 88, 88"


H CH2 N84.4: 299, 299"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires

complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados

C(214', 214"', 222, 222", 228, 228", 231, 231")



izastobartum #

izastobart

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* C5AR1 (complement C5a receptor 1, C5R1, CD88)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
 gamma1 heavy chain *Homo sapiens* (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-15*07 (92.9%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) M123>L (114), CDR-IMGT [8.10.10] (26-33.51-60.99-108)) (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, G1v43 CH2 A1.3, E1.2, A1, G1v60 S115, S116 (CH1 R120 (216) (120-217), hinge 1-15 (218-232), CH2 L1.3>A (236), L1.2>E (237), G1>A (239), A115>S (332), P116>S (333) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfide with lambda light chain *Homo sapiens* (1'-215') [V-LAMBDA (*Homo sapiens*IGLV1-44*04 (89.5%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [8.3.10] (26'-33'.51'-53'.90'-99')) (1'-109') -*Homo sapiens*IGLC2*01 (100%) (110'-215')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DG44, glycoform alfa
immunostimulant, antineoplastic

izastobart

immunoglobuline G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* C5AR1 (récepteur 1 du complément C5a, C5R1, CD88)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*;
 chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens* (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-15*07 (92.9%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) M123>L (114), CDR-IMGT [8.10.10] (26-33.51-60.99-108)) (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, G1v43 CH2 A1.3, E1.2, A1, G1v60 S115, S116 (CH1 R120 (216) (120-217), charnière 1-15 (218-232), CH2 L1.3>A (236), L1.2>E (237), G1>A (239), A115>S (332), P116>S (333) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfure avec la chaîne légère lambda *Homo sapiens* (1'-215') [V-LAMBDA (*Homo sapiens*IGLV1-44*04 (89.5%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [8.3.10] (26'-33'.51'-53'.90'-99')) (1'-109') -*Homo sapiens*IGLC2*01 (100%) (110'-215')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DG44, glycoforme alfa
immunostimulant, antinéoplasique

izastobart

inmunoglobulina G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* C5AR1 (receptor 1 del complemento C5a, C5R1, CD88)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*;
 cadena pesada gamma1 *Homo sapiens* (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-15*07 (92.9%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) M123>L (114), CDR-IMGT [8.10.10] (26-33.51-60.99-108)) (1-119) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, G1v43 CH2 A1.3, E1.2, A1, G1v60 S115, S116 (CH1 R120 (216) (120-217), bisagra 1-15 (218-232), CH2 L1.3>A (236), L1.2>E (237), G1>A (239), A115>S (332), P116>S (333) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfuro con la cadena ligera lambda *Homo sapiens* (1'-215') [V-LAMBDA (*Homo sapiens*IGLV1-44*04 (89.5%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [8.3.10] (26'-33'.51'-53'.90'-99')) (1'-109') -*Homo sapiens*IGLC2*01 (100%) (110'-215')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-DG44, forma glicosilada alfa
immunomodulador, antineoplásico

2769937-42-8

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLVESGGG	LVPKPGSSRL	SCAASGFTFS	SYAMHWVRQA
IKSKAQGGTT	DYAAHVKGRT	TISRDDSKNT	LYLQMNLSKT
VSFSTFDVWG	QGTLLTVSSA	STKGPSVFPL	APSSKSTSGG
YFPEPVTVSW	NSGALTSGVH	TFFAVLQSSG	LYSLSSVTV
ICNVNKKPSN	TKVDKRVPEK	SCDKTHTCPP	CPAPEAEGAP
DTLMISRTP	VTCVVDVSH	EDPEVKFNWY	VDGVEVHNAK
TYRVVSVLTV	LHQDWLNGKE	YKCKVSNKAL	PSSIEKTIISK
YTLPPSREEM	TKNQVSLTCL	VKGFPYPSDIA	VEWESNGQPE
DSDGSFFLYS	KLTVDKSRWQ	QGNVFSCSVM	HEALHNHYTQ
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
QSVLTQPPSV	SGAPGQRTVI	SCSGSSSNIG	SYVSWYQQL
RNNQRPSGVF	DRFSGSKSGT	SASLAITGLQ	AEDEADYYCD
GGGKLTVLG	QPKAAPSVTL	FPPSSEELQA	NKATLVCLIS
WKADSSPVKA	GVETTTPSKQ	SNNKYAASSY	LSLTPEQWKS
EGSTVEKTV	PTECS		
Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22"-98"	146"-202"	263"-323"
	22"-98"	146"-202"	263"-323"
Intra-L (C23-C104)	22"-89"	137"-196"	
	22"-89"	137"-196"	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	222"-214"	222"-214"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	228"-228"	231"-231"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84.4: 299, 299"			
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados.			
C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal			
H CHS K2: 449, 449"			

labuxtinibum
labuxtinib

N-(5-{5-[(1*R*,2*S*)-2-fluorocyclopropyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl}-2-methylphenyl)imidazo[1,2-*a*]pyridine-3-carboxamide
tyrosine kinase inhibitor


labuxtinib

N-(5-{5-[(1*R*,2*S*)-2-fluorocyclopropyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl}-2-méthylphényl)imidazo[1,2-*a*]pyridine-3-carboxamide
inhibiteur de tyrosine kinase

labuxtinib

N-(5-{5-[(1*R*,2*S*)-2-fluorocyclopropil]-1,2,4-oxadiazol-3-il}-2-metilfenil)imidazo[1,2-*a*]piridina-3-carboxamida
inhibidor de la tirosina kinasa

C₂₀H₁₆FN₅O₂ 1426449-01-5



lacutoclaxum
lacutoclax

4-{4-[(4'-chloro-5,5-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-[1,1'-biphenyl]-2-yl)methyl]piperazin-1-yl}-2-[(3*R*)-3-methyl-2,3-dihydropyrrolo[3',2':5,6]pyrido[2,3-*b*][1,4]oxazin-1(6*H*)-yl]-*N*-(3-nitro-4-[(oxan-4-yl)methyl]amino)benzene-1-sulfonyl)benzamide
antineoplastic

lacutoclax


4-{4-[(4'-chloro-5,5-diméthyl-3,4,5,6-tétrahydro-[1,1'-biphényl]-2-yl)méthyl]pipérazin-1-yl}-2-[(3*R*)-3-méthyl-2,3-dihydropyrrolo[3',2':5,6]pyrido[2,3-*b*][1,4]oxazin-1(6*H*)-yl]-*N*-(3-nitro-4-[(oxan-4-yl)méthyl]amino)benzène-1-sulfonyl)benzamide
antinéoplasique

lacutoclax

4-{4-[(4'-cloro-5,5-dimetil-3,4,5,6-tetrahidro-[1,1'-bifenil]-2-il)metil]piperazin-1-il}-2-[(3*R*)-3-metil-2,3-dihidropirrol[3',2':5,6]pirido[2,3-*b*][1,4]oxazin-1(6*H*)-yl]-*N*-(3-nitro-4-[(oxan-4-il)metil]amino)benceno-1-sulfonil)benzamida
antineoplásico

C₄₈H₅₅ClN₈O₇S

2291166-56-6



lancastotugum #
lancastotug

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TIGIT (T cell immunoreceptor with Ig domain and ITIM, V-set Ig member 9, VSIG9, V-set and transmembrane member 3, VSTM3)], humanized monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain humanized (1-451) [VH (*Homo sapiens* IGHV4-30-4*01 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.3%) L123>S (116), CDR-IMGT [9.7.14] (26-34.52-58.97-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (218) (122-219), hinge 1-15 (220-234), CH2 (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*03 (85.4%) -IGKJ4*01 (90.9%) V124>L (104), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa
immunostimulant, antineoplastic

lancastotug

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TIGIT (immunorécepteur des cellules T avec domaine Ig et ITIM, membre 9 de l'Ig V-set, VSIG9, membre 3 de l'Ig V-set et région transmembranaire, VSTM3)], anticorps monoclonal humanisé;

chaîne lourde gamma1 humanisée (1-451) [VH (*Homo sapiens* IGHV4-30-4*01 (90.8%) -(IGHD) - IGHJ4*01 (92.3%) L123>S (116), CDR-IMGT [9.7.14] (26-34.52-58.97-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (218) (122-219), charnière 1-15 (220-234), CH2 (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*03 (85.4%) -IGKJ4*01 (90.9%) V124>L (104), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa
immunostimulant, antinéoplasique

lancastrutug

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TIGIT (inmunoreceptor de las células T con dominio Ig e ITIM, miembro 9 de la Ig V-set, VSIG9, miembro 3 de la Ig V-set y región transmembranaria, VSTM3)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma1 humanizada (1-451) [VH (*Homo sapiens* IGHV4-30-4*01 (90.8%) -(IGHD) - IGHJ4*01 (92.3%) L123>S (116), CDR-IMGT [9.7.14] (26-34.52-58.97-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (218) (122-219), bisagra 1-15 (220-234), CH2 (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*03 (85.4%) -IGKJ4*01 (90.9%) V124>L (104), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), forma glicosilada alfa
inmunoestimulante, antineoplásico

2768355-20-8

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

DVQLQESGPG	LVKPSQTL	SL	TCTVSGHSFT	SDYAWSWIRQ	PPGKGLEWIG	50
YISYSDSTNY	NPSLKSRTTI		SRDTSKNQFS	LKLSSTVTAAD	TAVYYCARLD	100
YGNYGGMADY	WGQGTSTVTS		SASTKGPSVF	FLAPSSKSTS	GGTAALGCLV	150
KDYFPEPFTV	SWNSGALTSG		VHTFPAVLQS	SGLYSLSSV	TVPSSSLG	200
TYICNVNHKP	SNTKVDKKVE		PKSCDKHTC	PPCPAPELLG	GPSVFLFPKP	250
PKDTLMISRT	PEVTCVVVDV		SHEDPEVKFN	WYVDGVEVHN	AKTKPREEQY	300
NSYRVVSVL	TVLHQDWLNG		KEYKCKVSNK	ALPAPIEKTI	SKAKGQPREP	350
QVYTLPPSRE	EMTKNQVSLT		CLVKGFPYSD	IAVEWESNGQ	PENNYKTTPP	400
VLDSDGSGFFL	YSKLTVDKSR		WQQGNVFCSS	VMHEALHNHY	TQKSLSLSPG	450
K						451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS	LSASVGRDVT		ITCRSSQHVS	TALAWYQKQP	GKSPKLLIYS	50
ASSRYSGVDP	RFGSGSGGTD		FTFTISSLQP	EDFATYYCQQ	HYITPWTFFG	100
GTKLEIKRTV	AAPSVFIFPP		SDEQLKSGTA	SVVCLLNNFY	FREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD		STYLSSTLT	LSKADYERKH	VYACEVTHQG	200
LSPFVTKSFN	RGEC					214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-96	148-204	265-325	371-429
	22"-96"	148"-204"	265"-325"	371"-429"

Intra-L (C23-C104)	23'-88"	134'-194"
	23'''-88'''	134'''-194'''

Inter-H-L (h 5-CL 126) 224-214' 224"-214'''

Inter-H-H (h 11, h 14) 230-230" 233-233'''

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 301, 301"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal

H CHS K2: 451, 451"

latovetcelum

latovetcel

equine allogeneic mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) isolated from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) collected from donor horses. The MSCs are selected for by growing the PBMCs in media containing fetal bovine serum (FBS) and dexamethasone and then further expanded in media containing FBS.

The final cells are characterized by their stretched spindle shaped morphology, and by expression of the cellular surface markers CD90 ($\geq 95\%$) and CD40 ($\geq 85\%$) and absence of MHC class II expression ($\leq 2\%$). The cells secrete prostaglandin E2 (PGE2) and interleukin 6 (IL-6) and can decrease proliferation ($>85\%$) in a mixed lymphocyte reaction assay with concanavalin A (ConA)-stimulated canine PMBCs *cell therapy (veterinary use)*

latovetcel

cellules souches/stromales mésenchymateuses (CSM) allogènes équinées isolées à partir de cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC) prélevées sur des chevaux donneurs. Les CSM sont sélectionnées en cultivant les PBMC dans un milieu contenant du sérum bovin fœtal (FBS) et de la dexaméthasone, puis en les développant dans un milieu contenant du FBS.

Les cellules finales sont caractérisées par leur morphologie fusiforme étirée et par l'expression des marqueurs de surface cellulaire CD90 ($\geq 95\%$) et CD40 ($\geq 85\%$) et l'absence d'expression du CMH de classe II ($\leq 2\%$). Les cellules sécrètent de la prostaglandine E2 (PGE2) et de l'interleukine 6 (IL-6) et peuvent diminuer la prolifération ($>85\%$) dans un test de réaction lymphocytaire mixte avec des PMBC canins stimulés par la concanavaline A (ConA) *thérapie cellulaire (usage vétérinaire)*

latovetcel

células madre/estromales mesenquimales (MSC) equinas, alogénicas, aisladas de células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) recogida de caballos donantes. Las MSCs se seleccionan mediante crecimiento de las PBMCs en medio que contiene suero bovino fetal (FBS) y dexametasona, y después se expanden en medio que contiene FBS.

Las células finales se caracterizan por su morfología en forma de huso estirado y por la expresión de los marcadores de superficie CD90 ($\geq 95\%$) y CD40 ($\geq 85\%$) y ausencia de expresión de MHC de clase II ($\leq 2\%$). Las células secretan prostaglandina E2 (PGE2) e interleuquina 6 (IL-6) y pueden disminuir la proliferación ($>85\%$) en un ensayo de reacción cruzada de linfocitos con PBMCs caninos estimulados con concanavalina A (Con-A) *terapia celular (uso veterinario)*

lepzacitinibum

lepzacitinib

ethyl 4-[[[(3*R*)-1-(cyanoacetyl)piperidin-3-yl]amino]-1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridine-5-carboxylate
Janus kinase inhibitor, anti-inflammatory

lepzacitinib


4-[[[(3*R*)-1-(cyanoacétyle)pipéridin-3-yl]amino]-1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridine-5-carboxylate d'éthyle
inhibiteur de la kinase de Janus, anti-inflammatoire

lepzacitinib

4-[[[(3*R*)-1-(cianoacetil)piperidin-3-il]amino]-1*H*-pirrol[2,3-*b*]piridina-5-carboxilato de etilo
inhibidor de la kinasa de Janus, antiinflamatorio

C₁₈H₂₁N₅O₃

2321488-47-3

**leramistatum**

leramistat

4'-chloro-2'-cyano-*N*-[(1*r*,4*r*)-4-hydroxy-4-methylcyclohexyl][1,1'-biphenyl]-4-sulfonamide
mitochondrial complex 1 inhibitor

léramistat


4'-chloro-2'-cyano-*N*-[(1*r*,4*r*)-4-hydroxy-4-méthylcyclohexyl][1,1'-biphényl]-4-sulfonamide
inhibiteur du complexe mitochondrial 1

leramistat

2'-ciano-4'-cloro-*N*-[(1*r*,4*r*)-4-hidroxi-4-metilciclohexil][1,1'-bifenil]-4-sulfonamida
inhibidor del complejo mitocondrial 1

C₂₀H₂₁ClN₂O₃S

1642602-54-7

**lerzeparibum**

lerzeparib

8-fluoro-2-{4-[(2*R*)-2-methylpyrrolidin-2-yl]phenyl}-1,3-dihydro[1,2]oxazepino[6,5,4-*cd*]indol-6(5*H*)-one
poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor, antineoplastic

lerzéparib


8-fluoro-5-{4-[(2*R*)-2-méthylpyrrolidin-2-yl]phényl}-1,3-dihydro[1,2]oxazépino[6,5,4-*cd*]indol-6(5*H*)-one
inhibiteur de poly (ADP-ribose) polymérase (PARP), antinéoplasique

lerzeperib

8-fluoro-5-{4-[(2*R*)-2-metilpirrolidin-2-il]fenil}-1,3-dihidro[1,2]oxazepino[6,5,4-*cd*]indol-6(5*H*)-ona
inhibidor de poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP), antineoplásico

C₂₁H₂₀FN₃O₂

2459693-01-5

**limantrafinum**

limantrafin

6-(4-*tert*-butylphenoxy)pyridin-3-amine
antineoplastic

limantrafine


6-(4-*tert*-butylphénoxy)pyridin-3-amine
antineoplasique

limantrafina

6-(4-*terc*-butilfenoxi)piridin-3-amina
antineoplásico

C₁₅H₁₈N₂O

218457-67-1

**limaresiquimodum**

limaresiquimod

acetyl and 1-[[2-(ethoxymethyl)-1-(2-hydroxy-2-methylpropyl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]quinolin-4-yl]amino]-1,4,14-trioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaoctadecan-18-oyl groups linked to 11 and 8 percent of amino end groups, respectively, of the dendritic block polymer [(2,2-bis[[ω-(ω-octaamino-*dendro*^{G3}-(azanediyl[(2*S*)-1-oxohexane-1,2,6-triyl]])poly(oxyethylene)-α-yl)methyl]propane-1,3-diyl)bis(oxy))bis[ω-(ω-octaamino-*dendro*^{G3}-(azanediyl[(2*S*)-1-oxohexane-1,2,6-triyl]])poly(oxyethylene)-α-yl]] which itself is crosslinked through 81 percent of amino end groups with a bivalent linker produced by amidation with α-(5-carboxypentanoyl)-ω-[(5-carboxypentanoyl)oxy]poly(oxyethylene)
immunomodulator, antineoplastic

limarésiquimod

groupes acétyle et 1-[[2-(éthoxyméthyl)-1-(2-hydroxy-2-méthylpropyl)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]quinolin-4-yl]amino]-1,4,14-trioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaoctadécan-18-oyle liés à, respectivement, 11 et 8 % de groupes amine terminaux du polymère dendritique en bloc [(2,2-bis[[ω-(ω-octaamino-*dendro*^{G3}-{azanediyl}[(2*S*)-1-oxohexane-1,2,6-triyl]]poly(oxyéthylène)-α-yl)méthyl]propane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[ω-(ω-octaamino-*dendro*^{G3}-{azanediyl}[(2*S*)-1-oxohexane-1,2,6-triyl]]poly(oxyéthylène)-α-yle] qui est lui-même réticulé sur 81 % des groupes amine terminaux avec un espaceur bivalent produit par amidification avec α-(5-carboxypentanoyl)-ω-[(5-carboxypentanoyl)oxy]poly(oxyéthylène)


immunomodulateur, antinéoplasique

limaresiquimod

grupos acetilo y 1-[[2-(etoximetil)-1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1*H*-imidazo[4,5-*c*]quinolin-4-il]amino]-1,4,14-trioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaoctadecan-18-oilo unidos a, respectivamente, 11 y 8 % de grupos amina terminal del polímero dendrítico en bloque [(2,2-bis[[ω-(ω-octaamino-*dendro*^{G3}-{azanodiil}[(2*S*)-1-oxohexano-1,2,6-triil]]poli(oxietileno)-α-il]metil]propano-1,3-diil)bis(oxi)]bis[ω-(ω-octaamino-*dendro*^{G3}-{azanodiil}[(2*S*)-1-oxohexano-1,2,6-triil]]poli(oxietileno)-α-ilo] que él mismo está reticulado sobre el 81 % de los grupos amina terminal con un enlace bivalente producido por amidación con α-(5-carboxipentanoil)-ω-[(5-carboxipentanoil)oxil]poli(oxietileno)

immunomodulador, antineoplásico

2762923-39-5



lingdolinuradum

lingdolinurad

3-bromo-5-(2-ethylimidazo[1,2-*a*]pyridine-3-carbonyl)-2-hydroxybenzonitrile


urate transporter inhibitor

lingdolinurad 3-bromo-5-(2-éthylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbonyl)-2-hydroxybenzonitrile
inhibiteur du transporteur de l'urate

lingdolinurad 3-bromo-5-(2-etilimidazo[1,2-a]piridina-3-carbonil)-2-hidroixbenzonitrilo
inhibidor del transportador del urato

$C_{17}H_{12}BrN_3O_2$

2088176-96-7



lixumistatum


lixumistat *N*-[*N*-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamimidoyl]pyrrolidine-1-carboximidamide
mitochondrial complex 1 inhibitor

lixumistat *N*-{*N*-[4-(trifluorométoxy)phényl]carbamimidoyl}pyrrolidine-1-carboximidamide
inhibiteur du complexe mitochondrial 1

lixumistat *N*-{*N*-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbamimidoi]pirrolidina-1-carboximidamida
inhibidor del complejo mitocondrial 1

$C_{13}H_{16}F_3N_5O$

1422365-93-2



londamocitinibum

londamocitinib (2*R*)-*N*-(3-{5-fluoro-2-[2-fluoro-3-(methanesulfonyl)anilino]pyrimidin-4-yl}-1*H*-indol-7-yl)-3-methoxy-2-(4-methylpiperazin-1-yl)propanamide
Janus kinase inhibitor


londamocitinib (2*R*)-*N*-(3-{5-fluoro-2-[2-fluoro-3-(méthanesulfonyl)anilino]pyrimidin-4-yl}-1*H*-indol-7-yl)-3-méthoxy-2-(4-méthylpipérazin-1-yl)propanamide
inhibiteur de la kinase de Janus

londamocitinib

(2*R*)-*N*-(3-{5-fluoro-2-[2-fluoro-3-(metanosulfonyl)anilino]pirimidin-4-il}-1*H*-indol-7-il)-2-(4-metilpiperazin-1-il)-3-metoxipropanamida
inhibidor de la kinasa de Janus

C₂₈H₃₁F₂N₇O₄S

2241039-81-4



lotiglipronum

lotiglipron

(2²*S*,7²*S*)-1⁵-chloro-2²-methyl-5(2,1)-[1,3]benzimidazola-1(2)-pyridina-3(4,1)-piperidina-2(2,4)-[1,3]benzodioxola-7(2)-oxetanaheptaphane-5⁶-carboxylic acid
glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist

lotiglipron


acide (2²*S*,7²*S*)-1⁵-cloro-2²-méthyl-5(2,1)-[1,3]benzimidazola-1(2)-pyridina-3(4,1)-pipéridina-2(2,4)-[1,3]benzodioxola-7(2)-oxétanaheptaphane-5⁶-carboxylique
agoniste du récepteur au peptide-1 d'action type glucagon (GLP-1)

lotigliprón

ácido (2²*S*,7²*S*)-1⁵-cloro-2²-metil-5(2,1)-[1,3]bencimidazola-1(2)-piridina-3(4,1)-piperidina-2(2,4)-[1,3]benzodioxola-7(2)-oxetanaheptafano-5⁶-carboxílico
agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1)

C₃₁H₃₁ClN₄O₅

2401892-75-7



lucicebtdium

lucicebtide

D-valyl-D-alanyl-D-α-glutamyl-D-alanyl-D-arginyl-D-α-glutamyl-D-α-glutamyl-D-leucyl-D-α-glutamyl-D-arginyl-D-leucyl-D-α-glutamyl-D-alanyl-D-arginyl-D-leucylglycyl-D-glutamyl-D-alanyl-D-arginylglycyl-D-α-glutamyl-D-leucyl-D-lysyl-D-lysyl-D-tryptophyl-D-lysyl-D-methionyl-D-arginyl-D-arginyl-D-asparaginy-D-glutamyl-D-phenylalanyl-D-tryptophyl-D-leucyl-D-lysyl-D-leucyl-D-glutamyl-D-arginine
antineoplastic

lucicebtide	D-valyl-D-alanyl-D-α-glutamyl-D-alanyl-D-arginyl-D-α-glutamyl-D-α-glutamyl-D-leucyl-D-α-glutamyl-D-arginyl-D-leucyl-D-α-glutamyl-D-alanyl-D-arginyl-D-leucylglycyl-D-glutaminyl-D-alanyl-D-arginylglycyl-D-α-glutamyl-D-leucyl-D-lysyl-D-lysyl-D-tryptophyl-D-lysyl-D-méthionyl-D-arginyl-D-arginyl-D-asparaginy-D-glutaminyl-D-phénylalanil-D-tryptophyl-D-leucyl-D-lysyl-D-leucyl-D-glutaminyl-D-arginine <i>antineoplasique</i>
lucicebtida	D-valil-D-alanil-D-α-glutamil-D-alanil-D-arginil-D-α-glutamil-D-α-glutamil-D-leucil-D-α-glutamil-D-arginil-D-leucil-D-α-glutamil-D-alanil-D-arginil-D-leucilglycil-D-glutaminil-D-alanil-D-arginilglycil-D-α-glutamil-D-leucil-D-lisil-D-lisil-D-triptopfil-D-lisil-D-metionil-D-arginil-D-arginil-D-asparaginel-D-glutaminil-D-fenilalanil-D-triptofil-D-leucil-D-lisil-D-leucil-D-glutaminil-D-arginina <i>antineoplásico</i>
	$C_{208}H_{345}N_{69}O_{55}S$ 2407100-74-5
	<u>VAEAREEELER</u> <u>LEARLGQARG</u> <u>ELKKWKMRN</u> <u>QFWLKLQR</u> 38
	Configuration / Configuración / Configuración
	All-D / Tout-D / Todo-D Σ (1-38) D-Xaa
lumrotatugum # lumrotatug	immunoglobulin G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> CD38 (ADP-ribosyl cyclase 1, cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, cADPR1)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain humanized (1-449) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV4-4*08 (83.5%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-57.96-108)) (1-119) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14 (CH1 R120 (216) (120-217), hinge 1-15 (218-232), CH2 (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V- KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV3D-7*01 (77.1%) -IGKJ2*01 (91.7%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide, produced in a Chinese hamster ovary (CHO)-derived cell line lacking the glutamine synthetase (GS-KO) gene, glycoform alfa <i>antineoplastica</i>
lumrotatug	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> CD38 (ADP-ribosyl cyclase 1, ADP cyclique-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, cADPR1)], anticorps monoclonal humanisée; chaîne lourde gamma1 humanisée (1-449) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV4-4*08 (83.5%) -(IGHD) - IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-57.96-108)) (1-119) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14 (CH1 R120 (216) (120-217), charnière 1-15 (218-232), CH2 (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfure avec la chaîne légère

lumrotatug

kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3D-7*01 (77.1%) -IGKJ2*01 (91.7%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure, produite dans une lignée cellulaire dérivée des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) ne présentant pas le gène de la glutamine synthétase (GS-KO), glycoforme alfa
antineoplasique

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD38 (ADP-ribosil ciclaza 1, ADP cíclica-ribosa hidrolasa 1, cADPr hidrolasa 1, cADPR1)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 humanizada (1-449) [VH (*Homo sapiens* IGHV4-4*08 (83.5%) -(IGHD) - IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-57.96-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14 (CH1 R120 (216) (120-217), bisagra 1-15 (218-232), CH2 (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3D-7*01 (77.1%) -IGKJ2*01 (91.7%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro, producido en una línea celular derivada de las células ováricas de hámster chino (CHO) en ausencia del gen glutamina sintetasa (GS-KO), forma glicosilada alfa
antineoplásico

2760318-99-6

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGFSLT SYGIHWLRQP PGKGLEWIGV 50
IWRGGSTDYN PSLKSRVTIS KDTSKSQVSL KLSSTVTAADT AVYYCAKGV 100
TTGFYDFDWG QGTLTVTVSSA STKGPSVFPPL APSSKSTSGG TAALGCLVKD 150
YFPEPVTVSW NSGALTSGVH TFPAPVLQSSG LYSLSSTVTV PSSSLGTQTY 200
ICNVNHFPSN TKVDKRVPEK SCDKTHTCP CPAPPELLGGP SVFLFPKPK 250
DTLMISRTPE VTCVVVDVSH EDPEVKFNWY VDGVEVHNK TKPREEQYNS 300
TYRVVSVLTV LHQDWLNGKE YKCKVSNKAL PAPIEKTISK AKGQPREPQV 350
YTLPPSREEM TKNQVSLTCL VKGFPSPDIA VEWESNGQPE NNYKTTTPVL 400
DSDGSEFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCSVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK 449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
EIVMTQSPPT LSLSPGERVT LSCRASEDIY NRLVWYQQKPGQAPRLLLISG 50
VTSLETSIPA RFGSGSGGTD YTLTISSLQP EDFAVYYCQQ YWSTPYTFGQ 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWVK 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-95 146-202 263-323 369-427
22"-95" 146"-202" 263"-323" 369"-427"
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 222-214' 222"-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 228-228" 231-231"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxoprolyle) /
piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 299, 299"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupeure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 449, 449"

lunsekimigum #

lunsekimig

immunoglobulin single chain of 5 VH (sc-5-VH), anti-[*Homo sapiens* IL13 (interleukin 13, IL-13)], anti-[*Homo sapiens* TSLP (thymic stromal lymphopoietin)] and anti-[*Homo sapiens* ALB (albumin, human serum albumin, HAS)], monoclonal antibody sc-5-VH, humanized and chimeric, trispecific, pentavalent; single chain of 5 VH (sc-5-VH) humanized and chimeric (1-671) [VH anti-IL13 chimeric Vicpac/Homsap (*Vicugna pacos* IGHV3-3*01 (87.6%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (100%)/*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (81.4%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%), L50>R (45), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -35-mer hepta(tetraglycyl-seryl) linker (124-158) -VH anti-IL13 humanized (*Homo sapiens* IGHV3-43*02 (89.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%) W118>R (274), CDR-IMGT [8.8.19] (184-191.209-216.255-273)) (159-284) -9-mer glycyl-bis(triglycyl-seryl) linker (285-293) -VH anti-TSLP chimeric Vicpac /Homsap (*Vicugna pacos* IGHV3S53*01 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (100%)/*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (72.9%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), L50>R (338), CDR-IMGT [8.7.11] (319-326.344-350.389-399)) (294-410) -9-mer glycyl-bis(triglycyl-seryl) linker (411-419) -VH anti-ALB humanized (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (88.5%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (81.8%), L50>P (464), W118>S (524), CDR-IMGT [8.8.8] (445-452.470-477.516-523)) (420-534) -9-mer glycyl-bis(triglycyl-seryl) linker (535-543) -VH anti-TSLP chimeric Lamgla/Homsap (*Lama glama* IGHV3S1*01 (88.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (85.7%)/*Homo sapiens* IGHV3-43*02 (82.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%), L50>R (590), CDR-IMGT [10.8.18] (569-578.596-603.642-659)) (544-671)], produced in the yeast *Pichia pastoris* (*Komagataella phaffii*), non-glycosylated anti-inflammatory

lunsékimig

immunoglobuline chaîne unique de 5 VH (sc-5-VH), anti-*Homo sapiens* IL13 (interleukine 13, IL-13), anti-*Homo sapiens* TSLP (lymphopoïétine stromale thymique) et anti-*Homo sapiens* ALB (albumine, sérum albumine humaine, SAH); anticorps monoclonal sc-5-VH, humanisé et chimérique, trispécifique, pentavalent; chaîne unique de 5 VH (sc-5-VH) humanisée et chimérique (1-671) [VH anti-IL13 chimérique Vicpac/Homsap (*Vicugna pacos* IGHV3-3*01 (87.6%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (100%)/*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (81.4%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%), L50>R (45), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -35-mer hepta(tétraglycyl-séryl) linker (124-158) -VH anti-IL13 humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-43*02 (89.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%) W118>R (274), CDR-IMGT [8.8.19] (184-191.209-216.255-273)) (159-284) -9-mer glycyl-bis(triglycyl-séryl) linker (285-293) -VH anti-TSLP chimérique Vicpac /Homsap (*Vicugna pacos* IGHV3S53*01 (76.8%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (100%)/*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (72.9%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), L50>R (338), CDR-IMGT [8.7.11] (319-326.344-350.389-399)) (294-410) -9-mer glycyl-bis(triglycyl-séryl) linker (411-419) -VH anti-ALB humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (88.5%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (81.8%), L50>P (464), W118>S (524), CDR-IMGT [8.8.8] (445-452.470-477.516-523)) (420-534) -9-mer glycyl-bis(triglycyl-séryl) linker (535-543) -VH anti-TSLP chimérique Lamgla/Homsap (*Lama glama* IGHV3S1*01 (88.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (85.7%)/*Homo sapiens* IGHV3-43*02 (82.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%), L50>R (590), CDR-IMGT [10.8.18] (569-578.596-603.642-659)) (544-671)], produit dans la levure *Pichia pastoris* (*Komagataella phaffii*), non-glycosylé anti-inflammatoire

lunsekimig

inmunoglobulina cadena única de 5 VH (sc-5-VH), anti-*Homo sapiens* IL13 (interleukina 13, IL-13), anti-*Homo sapiens* TSLP (linfopoyetina estromal tímica) y anti-*Homo sapiens* ALB (albúmina, albúmina sérica humana, SAH); anticuerpo monoclonal sc-5-VH, humanizado y quimérico, triespecífico, pentavalente; cadena única de 5 VH (sc-5-VH) humanizada y quimérica (1-671) [VH anti-IL13 quimérico Vicpac/Homsap (*Vicugna pacos* IGHV3-3*01 (87.6%) - (IGHD) -IGHJ2*01 (100%)/*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (81.4%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%), L50>R (45), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -35-mer hepta(tetraglicil-seril) enlace (124-158) -VH anti-IL13 humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-43*02 (89.7%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%) W118>R (274), CDR-IMGT [8.8.19] (184-191.209-216.255-273)) (159-284) -9-mer glicil-bis(triglicil-seril) enlace (285-293) -VH anti-TSLP quimérico Vicpac/Homsap (*Vicugna pacos* IGHV3S53*01 (76.8%) - (IGHD) -IGHJ2*01 (100%)/*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (72.9%) - (IGHD) -IGHJ1*01 (100%), L50>R (338), CDR-IMGT [8.7.11] (319-326.344-350.389-399)) (294-410) -9-mer glicil-bis(triglicil-seril) enlace (411-419) -VH anti-ALB humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (88.5%) - (IGHD) -IGHJ1*01 (81.8%), L50>P (464), W118>S (524), CDR-IMGT [8.8.8] (445-452.470-477.516-523)) (420-534) -9-mer glicil-bis(triglicil-seril) enlace (535-543) -VH anti-TSLP quimérico Lamgla/Homsap (*Lama glama* IGHV3S1*01 (88.9%) - (IGHD) -IGHJ6*01 (85.7%)/*Homo sapiens* IGHV3-43*02 (82.8%) - (IGHD) -IGHJ5*02 (100%), L50>R (590), CDR-IMGT [10.8.18] (569-578.596-603.642-659)) (544-671)], producido en la levadura *Pichia pastoris* (*Komagataella phaffii*), no glicosilado
antiinflamatorio

2770858-49-4

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada:

```
DVQLVESGGG VVQPGGSLRL SCAASGRFTS SYRMGWFRQA PGKEREFVAA 50
LSGDSGYSTYT ANSVKGRFTI SRDNSKNTVY LQMNSLRPED TALYYCAAKL 100
QYVSGWSYDY PYWQGQTLVTI VSSGGGGSGG GSGGGGSGG GSGGGGSGG 150
GSGGGGSGGV QLVESGGGVV QPGGSLRLSC AASGFTFNYY AMKWVRQAPG 200
KGLEWVSSIT TGGGSTDYAD SVKGRFTISR DNSKNTLYLQ MNSLRPEDTA 250
LYYCANVFPF YSEHFSGLS FDYRQQTGLV TVSSGGGGSG GSEVQLVES 300
GGGVVQPGGS LRLSCAASGS GFGVNILYWY RQAAGIEREL IASITSGGIT 350
NYVDVSKGRF TISRDNSENT MYLQMNLSRA EDTGLYYCAS RNIFDGTTEW 400
CQQTTLVTSS GGGSGGGGSE VQLVESGGGV VQPGGSLRLS CAASGFTFRS 450
FGMSWVRQAP GKGPEWVSSI SSGSDTLTYA DSVKGRFTIS RDNSKNTLYL 500
QMNSLRPEDT ALYYCTIGGS LRSRSQGLTV TVSSGGGGSG GSEVQLVES 550
GGGVVQPGGS LRLSCAASGF TFADYDYDIG WFRQAPGKER EGVSCISNRD 600
GSTYYADSVK GFTISRDNSS KNTVYLQMNS LRPEDTALTY CAVEIHCDYD 650
GVNFDPDFW GQGTTLVTSS A 671
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra chain (C23-C104) 22-96 180-254 315-388 441-515 565-641

Additional intra-VH (C55-C110) 595-647

No N-glycosylation sites / pas de sites de N-glycosylation / ningún posición de N-glicosilación

luvagrobartum

luvagrobart

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* NGF (nerve growth factor, NGFB, nerve growth factor beta polypeptide)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain humanized (1-451) [VH (*Homo sapiens* IGHV4-38-2*02 (80.6%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.7.15] (26-33.51-57.96-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17.1, CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 K120 (218) (122-219), hinge 1-15 (220-234), CH2 L1.3>A (238), L1.2>A (239)(235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ2*02 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa
analgesic

luvagrobarat inmunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* NGF (facteur de croissance du nerf, NGFB, polypeptide bêta du facteur de croissance du nerf)], anticorps monoclonal humanisé;
chaîne lourde gamma1 humanisée (1-451) [VH (*Homo sapiens* IGHV4-38-2*02 (80.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.7.15] (26-33.51-57.96-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1, CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 K120 (218) (122-219), charnière 1-15 (220-234), CH2 L1.3>A (238), L1.2>A (239)(235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214'')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ2*02 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') - *Homo sapiens* IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214'')]; dimère (230-230'':233-233'')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa
analésique

luvagrobarat inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* NGF (factor de crecimiento nervioso, NGFB, polipéptido beta del factor de crecimiento nervioso)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma1 humanizada (1-451) [VH (*Homo sapiens* IGHV4-38-2*02 (80.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.7.15] (26-33.51-57.96-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1, CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 K120 (218) (122-219), bisagra 1-15 (220-234), CH2 L1.3>A (238), L1.2>A (239)(235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214'')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ2*02 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214'')]; dímero (230-230'':233-233'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), forma glicosilada alfa
analésico

2768355-18-4

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGFDLS GYDLNWIRQP PGKGLEWIGI 50
VMGDGSSDYN SAVKSRVTIS KDTSKNQFSL KLSSTVAADT AVYYCVRGGY 100
WYATSYFFDY WQGTGLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAAALGCLV 150
KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ 200
TYICNVNHKP SNTKVDKKEV PKSCDKHTC PPCAPEAAG GPSVFLFPKP 250
PKDTLMISRT PEVTKCVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP 350
QVYTLPPSRD ELTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP 400
VLDSGDSFEL YSKLTVDKSR WQGNVVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG 450
K 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQMTQSPSS LSASVGRDVT ITCRASESIS SNLNWYQKPK GKAPKLLIYY 50
TSRFHSGVPS RFSGSGSGTD FTFTISSLQP EDIATYICQQ EHTLPFTFGQ 100
GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWVK 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEEKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-95 148-204 265-325 371-429
22"-95" 148"-204" 265"-325" 371"-429"
Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194'
23'''-88''' 134'''-194'''
Inter-H-L (h 5-CL 126) 224-214' 224"-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 230-230" 233-233"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutamínilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) /
piroglutamilo (pE, 5-oxopropilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 301, 301"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupeure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 451, 451"

luxdegalutamidum

luxdegalutamide

(8³S)-N-[(1*r*,3*S*)-3-(4-cyano-3-methoxyphenoxy)-2,2,4,4-tetramethylcyclobutyl]-5³-fluoro-6,8²,8⁶-trioxo-7-aza-4(1,4)-piperazina-2(1,4),8(3)-dipiperidina-1(1),5(1,4)-dibenzenaocetaphane-1⁴-carboxamide
antiandrogen, antineoplastic

luxdégaltutamide


(8³S)-N-[(1*r*,3*S*)-3-(4-cyano-3-méthoxyphénoxy)-2,2,4,4-tétraméthylcyclobutyl]-5³-fluoro-6,8²,8⁶-trioxo-7-aza-4(1,4)-pipérazina-2(1,4),8(3)-dipipéridina-1(1),5(1,4)-dibenzènaocetaphane-1⁴-carboxamide
antiandrogène, antinéoplasique

luxdegalutamida

(8³S)-N-[(1*r*,3*S*)-3-(4-clano-3-metoxifenoxi)-2,2,4,4-tetrametilciclobutil]-5³-fluoro-6,8²,8⁶-trioxo-7-aza-4(1,4)-piperazina-2(1,4),8(3)-dipiperidina-1(1),5(1,4)-dibenzenaocetafano-1⁴-carboxamida
antineoplásico, antineoplásico

C₄₅H₅₄FN₇O₆

2750830-09-0

**migaldendranibum**

migaldendranib

2-[[1-(1-{5-[(Ξ)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3*H*-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1*H*-pyrrol-3-yl]-1,6-dioxo-9,12,15-trioxa-2,5-diazaheptadecan-17-yl)-1*H*-1,2,3-triazol-4-yl]methoxy]ethyl ether with about 11% of hydroxy groups of the regular dendrimer $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ -(ethylenedinitrilo)tetrakis(ω -hexadecakis{3-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-oxopropyl}-*dendro*^{G^d})-[(3-oxopropane-1,3-diyl)azanediylethylenenitrilo])
angiogenesis inhibitor


migaldendranib

éther 2-[[1-(1-{5-[(Ξ)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3*H*-indol-3-ylidène)méthyl]-2,4-diméthyl-1*H*-pyrrol-3-yl]-1,6-dioxo-9,12,15-trioxa-2,5-diazaheptadécan-17-yl)-1*H*-1,2,3-triazol-4-yl]méthoxy]éthylrique avec approximativement 11% de groupes terminaux hydroxy du dendrimère régulier $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ -(éthylènedinitrilo)tétrakis(ω -hexadécakis{3-[(2-hydroxyéthyl)amino]-3-oxopropyl}-*dendro*^{G^d})-[(3-oxopropane-1,3-diyl)azanediylethylenenitrilo])
inhibiteur de l'angiogénèse

migaldendranib

éter 2-[[1-(1-{5-[(Ξ)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidro-3*H*-indol-3-ilideno)metil]-2,4-dimetil-1*H*-pirrol-3-il]-1,6-dioxo-9,12,15-trioxa-2,5-diazaheptadecan-17-il)-1*H*-1,2,3-triazol-4-il]metoxi]etilíco con aproximadamente

11% de grupos terminales hidroxilo del dendrímero regular $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ - (etilenodinitrilo) tetrakis (ω -hexadecakis{3-[(2-hidroxietyl)amino]-3-oxopropil}-*dendro*⁶⁴ -[(3-oxopropano-1,3-diil)azanedii etilenonitrilo])
inhibidor de la angiogénesis



mivelsiranum

mivelsiran

*all-P-ambo-2'-O-methyl-P-thioguananylyl-(3'→5')-2'-O-methyl-P-thioguananylyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-methyluridylyl-(3'→5')-2'-O-methyladenylyl-(3'→5')-2'-O-hexadecylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-O-methyladenylyl-(3'→5')-2'-deoxyadenylyl-(3'→5')-2'-O-methyladenylyl-(3'→5')-2'-deoxyadenylyl-(3'→5')-2'-O-methyluridylyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-methyladenylyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-methyl-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O-methyladenosine duplex with *all-P-ambo-2'-O-methyl-P-thiouridylyl-(5'→3')-2'-O-methyl-P-thioguananylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxyguanylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-thymidylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→2')-1-de-β-D-ribofuranosyl-1-[(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-5-methyluridylyl-(3'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methyl-P-thioadenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-P-thiouridylyl(5'→4')-1-de-β-D-ribofuranosyl-1-[(2R,3R,4R,5R)-5-[(1E)-2-phosphonoethen-1-yl]-4-hydroxy-3-methoxyoxolan-2-yl]uridine*
*amyloid-beta precursor protein (APP) synthesis reducer**

mivelsiran


tot-*P-ambo*-2'-*O*-méthyl-*P*-thioguananylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyl-*P*-thioguananylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-*O*-hexadécylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-désoxyadénylyl-(3'→5')-2'-*O*-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-désoxyadénylyl-(3'→5')-2'-*O*

méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyl-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénosine duplex avec *tout-P-ambo-2'-O-méthyl-P-thiouridylyl*-(5'→3')-2'-O-méthyl-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-désoxyguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-thymidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→2')-1-dé-β-D-ribofuranosyl-1-[(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-5-méthyluridylyl-(3'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthyl-*P*-thioadénylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoro-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-1-dé-β-D-ribofuranosyl-1-[(2R,3R,4R,5R)-5-[(1E)-2-phosphonoéthén-1-yl]-4-hydroxy-3-méthoxyoxolan-2-yl]uridine
réducteur de la synthèse de la protéine précurseur de l'amyloïde (PPA)


mivelsirán

todo-P-ambo-2'-O-metil-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-metil-*P*-tioguanilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-hexadecilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-desoxiadenilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-desoxiadenilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metiladenylyl-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metil-*P*-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-metil-*P*-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-metiladenosina dúplex con *todo-P-ambo-2'-O-metil-P-tiouridilil*-(5'→3')-2'-O-metil-*P*-tioguanilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-desoxiguanilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-timidilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→2')-1-des-β-D-ribofuranosil-1-[(2S)-2,3-dihidroxipropil]-5-metiluridilil-(3'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metil-*P*-tioadenilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoro-*P*-tiouridilil-(5'→3')-1-des-β-D-ribofuranosil-1-[(2R,3R,4R,5R)-5-[(1E)-2-fosfonoeten-1-il]-4-hidroxi-3-metoxioxolan-2-il]uridina
reductor de la síntesis de la proteína precursora amiloidea (PPA)

2572991-83-2



N : A, C, G, T, U
N : 2'-O-methyl-N / 2'-O-méthyl-N / 2'-O-metil-N
N : 2'-deoxy-N / 2'-désoxy-N / 2'-desoxi-N
N : 2'-deoxy-2'-fluoro-N / 2'-désoxy-2'-fluoro-N / 2'-desoxi-2'-fluoro-N
- : -PO(OH)- = : -PO(SH)-



monlunabantum
monlunabant

N-(*N*-{[(Ξ)-[(4*S*)-3-(4-chlorophenyl)-4-phenyl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl][4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamido]methylidene}carbamimidoyl)acetamide
cannabinoid-1 (CB1) receptor inverse agonist

monlunabant


N-(*N*-{[(Ξ)-[(4*S*)-3-(4-chlorophényl)-4-phényl-4,5-dihydro-1*H*-pyrazol-1-yl][4-(trifluorométhyl)benzène-1-sulfonamido]méthylidène}carbamimidoyl)acétamide
agoniste inverse du récepteur des cannabinoïdes de type 1 (CB1)

monlunabant

N-(*N*-{[(Ξ)-[(4*S*)-3-(4-clorofenil)-4-fenil-4,5-dihidro-1*H*-pirazol-1-il][4-(trifluorometil)benceno-1-sulfonamido]metilideno}carbamimidoi)acetamida
agonista inverso del receptor de los cannabinoides de tipo 1 (CB1)

C₂₆H₂₂ClF₃N₆O₃S

2712480-46-9



mosnodenvirum

mosnodenvir

(2*S*)-2-(4-chloro-2-methoxyphenyl)-2-[3-(methanesulfonyl)-5-methoxyanilino]-1-[5-(trifluoromethoxy)-1*H*-indol-3-yl]ethan-1-one
antiviral

mosnodenvir


(2*S*)-2-(4-chloro-2-méthoxyphényl)-2-[3-(méthanesulfonyl)-5-méthoxyanilino]-1-[5-(trifluorométhoxy)-1*H*-indol-3-yl]éthan-1-one
antiviral

mosnodenvir

(2*S*)-2-(4-cloro-2-metoxifenil)-2-[3-(metanosulfonil)-5-metoxianilino]-1-[5-(trifluorometoxi)-1*H*-indol-3-il]etan-1-ona
antiviral

C₂₆H₂₂ClF₃N₂O₆S

2043343-94-6

**nedometinibum**

nedometinib

2-(2-fluoro-4-iodoanilino)-*N*-(2-hydroxyethoxy)-1-methyl-1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridine-3-carboxamide
tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic

nédométinib


2-(2-fluoro-4-iodoanilino)-*N*-(2-hydroxyéthoxy)-1-méthyl-1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridine-3-carboxamide
inhibiteur de tyrosine kinase, antinéoplasique

nedometinib

2-(2-fluoro-4-iodoanilino)-*N*-(2-hidroxiétoxi)-1-metil-1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridina-3-carboxamida
inhibidor de la tirosina kinasa, antineoplásico

C₁₇H₁₆FIN₄O₃

2252314-46-6



negalstobartum

negalstobart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (lymphocyte activating 3, lymphocyte-activation 3, CD223)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma4 heavy chain *Homo sapiens* (1-446) [VH (*Homo sapiens*IGHV4-39*01 (96.0%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [10.7.12] (26-35.53-59.98-109)) (1-120)-*Homo sapiens*IGHG4*01, *nG4m(a)* CH2 L92, G4v5 h P10, G4v4 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 (121-218), hinge 1-12 S10>P (228) (219-230), CH2 F1.3>A (234), L1.2>A (235), L92 (309) (231-340), CH3 (341-445), CHS K2>del (446)) (121-446)], (134-215')-disulfide with kappa light chain *Homo sapiens* (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-33*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO)-K1SV cell line lacking the glutamine synthetase gene (GS-KO), glycoform alfa
immunostimulant, antineoplastic

négalstobart

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activateur 3 des lymphocytes, lymphocyte-activation 3, CD223)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*; chaîne lourde gamma4 *Homo sapiens* (1-446) [VH (*Homo sapiens*IGHV4-39*01 (96.0%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [10.7.12] (26-35.53-59.98-109)) (1-120)-*Homo sapiens*IGHG4*01, *nG4m(a)* CH2 L92, G4v5 h P10, G4v4 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 (121-218), charnière 1-12 S10>P (228) (219-230), CH2 F1.3>A (234), L1.2>A (235), L92 (309) (231-340), CH3 (341-445), CHS K2>del (446)) (121-446)], (134-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa *Homo sapiens* (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-33*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimère (226-226":229-229")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) lignée cellulaire CHO-K1SV ne présentant pas le gène de la glutamine synthétase (GS-KO), glycoforme alfa
immunostimulant, antinéoplasique

negalstobart

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activador 3 de los linfocitos, linfocito-activación 3, CD223)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*; cadena pesada gamma4 *Homo sapiens* (1-446) [VH (*Homo sapiens*IGHV4-39*01 (96.0%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [10.7.12] (26-35.53-59.98-109)) (1-120)-*Homo sapiens*IGHG4*01, *nG4m(a)* CH2 L92, G4v5 h P10, G4v4 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 (121-218), bisagra 1-12 S10>P (228) (219-230), CH2 F1.3>A (234), L1.2>A (235), L92 (309) (231-340), CH3 (341-445), CHS K2>del (446)) (121-446)], (134-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa *Homo sapiens* (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-33*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dímero (226-226":229-229")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO) línea celular CHO-K1SV en ausencia del gen glutamina sintetasa (GS-KO), forma glicosilada alfa
inmunostimulante, antineoplásico

2360418-68-2

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QLQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGGSIY SESYYWGWIW QPPKGLEWI 50
GSIVYSGYTY YNPGLKSRVT ISVDTSKNQF SLKLSSVTAA DTAVYYCARV 100
RTWDAAFDIW GQGTMTVTSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTTK 200
YTCNVDPKPS NTKVDKRVS KYGPPCPPCP APEAAGGPSV FLFPKPKDT 250
LMISRTPEVT CVVVDVSQED PEVQFNWYVD GVEVHNKAK PREEQFNSTY 300
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT 350
LPPSQEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPPENN YKTTTPPVLD 400
DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVME ALHNYHTQKS LSLSLG 446

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCAQASQDIS NYLNNWYQKPK GKAPKLLIYD 50
ASNLETCVPS RFSGSGSGTD FTFTISLLQP EDIATYYCQQ VLELPPWTFG 100
GGTKVEIKRT VAAPSVEFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK 150
VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYSLSTSL TSLKADYEKH KVVYACEVTHQ 200
GLSSPVTKSF NRGEK 215

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22"-97" 147"-203" 261"-321" 367"-425"
22"-97" 147"-203" 261"-321" 367"-425"
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 135"-195"
23"-88" 135"-195"
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 134"-215" 134"-215"
Inter-H-H (h 8, h 11) 226"-226" 229"-229"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutamínilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxoprolyle) /
piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 297, 297"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados.

nelmastobartum #
nelmastobart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* BTN1A1 (butyrophilin subfamily 1 member A1)], humanized monoclonal antibody; gamma4 heavy chain humanized(1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (84.7%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) M123>T (120), CDR-IMGT [8.8.18] (26-33.51-58.97-114)) (1-125)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (126-223), hinge 1-12 S10>P (233) (224-235), CH2 L92 (314) (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (126-452)], (139-214')-disulfide with kappa light chain humanized(1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (90.9%) K123>E (103'), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (231-231":234-234")-bisdisulfide, produced in a Chinese hamster ovary (CHO)-derived cell line lacking the glutamine synthetase (GS-KO) gene, glycoform alfa
immunostimulant, antineoplastic

nelmastobart

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* BTN1A1 (membre A1 de la sous-famille 1 de la butyrophiline)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma4 humanisée (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (84.7%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) M123>T (120), CDR-IMGT [8.8.18] (26-33.51-58.97-114)) (1-125)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (126-223), charnière 1-12 S10>P (233) (224-235), CH2 L92 (314) (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (126-452)], (139-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (90.9%) K123>E (103'), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (231-231":234-234")-bisdisulfure, produite dans une lignée cellulaire dérivée des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) ne présentant pas le gène de la glutamine synthétase (GS-KO), glycoforme alfa
immunostimulant, antinéoplasique

nelmastobart

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* BTN1A1 (miembro A1 de la subfamilia 1 de la butirofilina)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma4 humanizada (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (84.7%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) M123>T (120), CDR-IMGT [8.8.18] (26-33.51-58.97-114)) (1-125)-*Homo sapiens* IGHG4*01, *nG4m(a)* CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (126-223), bisagra 1-12 S10>P (233) (224-235), CH2 L92 (314) (236-345), CH3 (346-450), CHS (451-452)) (126-452)], (139-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (90.9%) K123>E (103'), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (231-231":234-234")-bisdisulfuro, producido en una línea celular derivada de las células ováricas de hámster chino (CHO) en ausencia del gen glutamina sintetasa (GS-KO), forma glicosilada alfa *immunoestimulante, antineoplásico*

2669823-48-5

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QQLVQSGAE VKKPGASVKV SCKASGYTFT HYNMDWVRQA PGQGLEWIGY 50
IYPSNGGTGY NQKFKSRVTM TVDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARGA 100
YHYGSSYAYW YFDVWGQGT VTVSSASTKG PSVFPPLAPCS RSTSESTAAL 150
GCLVKDYFPE PVTVSWNSGA LTSGVHTFPA VLQSSGLYSL SSVVTVFPSS 200
LGTKTYTCNV DHKPSNTKVD KRVESKYGPP CPKCPAPEFL GGPSVFLFPP 250
KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSQEDPEVQF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ 300
FNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KGLPSSIEKT ISKAKGQPRE 350
PQVYTLPPSQ EEMTKNQVSL TCLVKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTTF 400
PVLDSGGSFF LYSRLTVDKS RWQEGNVFSC SVMHEALHNN YTQKSLSLSL 450
GK 452

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCSASQDIS NYLNWYQQKP GKAVKLLISY 50
TSSLSHSGVPS RFSGSGSGTD YFTTISLQP EDIATYYCQQ SSKLPFTFGQ 100
GTELEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 152-208 266-326 372-430
22"-96" 152"-208" 266"-326" 372"-430"
Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194"
23'''-88''' 134'''-194'''
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 139-214' 139"-214"
Inter-H-H (h 8, h 11) 231-231" 234-234"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /

Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxoprolyle) /

piroglutamilo (pE, 5-oxoprolylo)

H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 302, 302"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaire

complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados.

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal

H CHS K2: 452, 452"

nerandomilastum
nerandomilast

(5*R*)-2-[4-(5-chloropyrimidin-2-yl)piperidin-1-yl]-4-[[1-(hydroxymethyl)cyclobutyl]amino]-6,7-dihydro-5*H*-5*A*⁴-thieno[3,2-*d*]pyrimidin-5-one
phosphodiesterase 4 (PDE4) inhibitor, antifibrotic

Proposed INN: List 129

nérandomilast

WHO Drug Information, Vol. 37, No. 2, 2023


(5*R*)-2-[4-(5-chloropyrimidin-2-yl)piperidin-1-yl]-4-[[1-(hydroxyméthyl)cyclobutyl]amino]-6,7-dihydro-5*H*-5λ⁴-thiéno[3,2-*d'*]pyrimidin-5-one
*inhibiteur de la phosphodiesterase 4 (PDE4),
antifibrotique*

nerandomilast

(5*R*)-2-[4-(5-cloropirimidin-2-il)piperidin-1-il]-4-[[1-(hidroximetil)ciclobutil]amino]-6,7-dihidro-5*H*-5λ⁴-tieno[3,2-*d'*]pirimidin-5-ona
inhibidor de la fosfodiesterasa 4 (PDE4), antifibrótico

C₂₀H₂₅ClN₆O₂S

1423719-30-5



nerigliatinum

nerigliatin

N,N-dimethyl-5-({2-méthyl-6-[(5-méthylpyrazin-2-yl)carbamoyl]-1-benzofuran-4-yl}oxy)pyrimidine-2-carboxamide
antihyperglycaemic

nérigliatine


N,N-diméthyl-5-({2-méthyl-6-[(5-méthylpyrazin-2-yl)carbamoyl]-1-benzofuran-4-yl}oxy)pyrimidine-2-carboxamide
antihyperglycémiant

nerigliatina

N,N-dimetil-5-({2-metil-6-[(5-metilpirazin-2-il)carbamoi]-1-benzofuran-4-il}oxi)pirimidina-2-carboxamida
antihiperglucemiante

C₂₂H₂₀N₆O₄

1245603-92-2



nesvategrastum

nesvategrast

(3*S*)-3-[6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl]-3-[2-oxo-3-[3-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-2-yl)propyl]imidazolidin-1-yl]propanoic acid
integrin inhibitor

nesvatégrast


acide (3S)-3-[6-(difluorométhoxy)pyridin-3-yl]-3-{2-oxo-3-[3-(5,6,7,8-tétrahydro-1,8-naphtyridin-2-yl)propyl]imidazolidin-1-yl}propanoïque
inhibiteur de l'intégrine

nesvategrast

ácido (3S)-3-[6-(difluorometoxi)piridin-3-il]-3-{2-oxo-3-[3-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)propil]imidazolidin-1-il}propanoico
inhibidor de la integrina

C₂₃H₂₇F₂N₅O₄

1621332-91-9



nevadistinelum

nevadistinel

(4S)-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-1,6-dione
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor positive allosteric modulator

névadistinel


(4S)-2-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-1,6-dione
modulateur allostérique positif du récepteur du N-méthyl-D-aspartate (NMDA)

nevadistinel

(4S)-2-[(4-metoxifenil)metil]-2,7-diazaespiro[3.5]nonano-1,6-diona
modulador alostérico positivo del receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA)

C₁₅H₁₈N₂O₃

2181816-92-0



nezastomigum #

nezastomig

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* FOLH1 (folate hydrolase, prostate specific membrane antigen, PSMA)] and anti-[*Homo sapiens* CD28 (T cell specific surface glycoprotein CD28, TP44)], *Homo sapiens* monoclonal antibody, bispecific, bivalent;

gamma4 heavy chain anti-FOLH1 *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*03 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.17] (26-33.51-58.97-113)) (1-124)-*Homo sapiens* IGHG4*01, G4v5 h P10,nG4m(a) CH2 L92, G4v7 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1 (CH1 (125-222), hinge 1-12 S10>P (232) (223-234), CH2 E1.4>del, F1.3>P (237), L1.2>V (238), G1.1>A (239), L92 (312) (235-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (125-450)], (138-215')-disulfide with kappa light chain *Homo sapiens* (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [7.3.9] (27'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; gamma4 heavy chain anti-CD28 *Homo sapiens* (1"-448") [VH (*Homo sapiens* IGHV4-59*01 (96.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%), CDR-IMGT [8.7.16] (26"-33".51"-57".96"-111")) (1"-122")-*Homo sapiens* IGHG4*01, G4v5 h P10,nG4m(a) CH2 L92, G4v7 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1, G4v8 CH3 R115, F116, P125 (CH1 (123"-220"), hinge 1-12 S10>P (230") (221"-232"), CH2 E1.4>del, F1.3>P (235"), L1.2>V (236"), G1.1>A (237"), L92 (310") (233"-341"), CH3 H115>R (436"), Y116>F (437"), L125>P (446") (342"-446"), CHS (447"-448")) (123"-448"))], (136"-215'")-disulfide with kappa light chain *Homo sapiens* (1'"-215'") [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [7.3.9] (27'"-33'"'.51'"'-53'"'.90'"'-98'"')) (1'"-108'") -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'"), V101 (192'") (109'""-215'")]; dimer (230-228'":233-231'")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa
immunostimulant, antineoplastic

nézastomig

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* FOLH1 (folate hydrolase, antigène membranaire spécifique de la prostate, PSMA)] et anti-[*Homo sapiens* CD28 (glycoprotéine de surface CD28 spécifique des cellules T, TP44)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*, bispécifique, bivalent;
chaîne lourde gamma4 anti-FOLH1 *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*03 (90.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.17] (26-33.51-58.97-113)) (1-124)-*Homo sapiens* IGHG4*01, G4v5 h P10,nG4m(a) CH2 L92, G4v7 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1 (CH1 (125-222), charnière 1-12 S10>P (232) (223-234), CH2 E1.4>del, F1.3>P (237), L1.2>V (238), G1.1>A (239), L92 (312) (235-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (125-450)], (138-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa *Homo sapiens* (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [7.3.9] (27'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; chaîne lourde gamma4 anti-CD28 *Homo sapiens* (1"-448") [VH (*Homo sapiens* IGHV4-59*01 (96.9%) -(IGHD) -IGHJ6*01 (100%), CDR-IMGT [8.7.16] (26"-33".51"-57".96"-111")) (1"-122")-*Homo sapiens*

nezastomig

IGHG4*01, G4v5 h P10,nG4m(a) CH2 L92, G4v7 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1, G4v8 CH3 R115, F116, P125 (CH1 (123"-220"), charnière 1-12 S10>P (230") (221"-232"), CH2 E1.4>del, F1.3>P (235"), L1.2>V (236"), G1.1>A (237"), L92 (310") (233"-341"), CH3 H115>R (436"), Y116>F (437"), L125>P (446") (342"-446"), CHS (447"-448")) (123"-448")), (136"-215")-disulfure avec la chaîne légère kappa *Homo sapiens* (1"-215") [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [7.3.9] (27"-33".51"-53".90"-98")) (1"-108") -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154"), V101 (192") (109"-215")); dimère (230-228":233-231")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa
immunostimulant, antinéoplasique

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* FOLH1 (folato hidrolasa, antígeno membranario específica de la próstata, PSMA)] y anti-[*Homo sapiens* CD28 (glicoproteína de superficie CD28 específica de las células T, TP44)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*, biespecífico, bivalente; cadena pesada gamma4 anti-FOLH1 *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*03 (90.8%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.17] (26-33.51-58.97-113)) (1-124)-*Homo sapiens* IGHG4*01, G4v5 h P10,nG4m(a) CH2 L92, G4v7 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1 (CH1 (125-222), bisagra 1-12 S10>P (232) (223-234), CH2 E1.4>del, F1.3>P (237), L1.2>V (238), G1.1>A (239), L92 (312) (235-343), CH3 (344-448), CHS (449-450)) (125-450)], (138-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa *Homo sapiens* (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (100%) - IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [7.3.9] (27'-33'.51'-53'.90'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; cadena pesada gamma4 anti-CD28 *Homo sapiens* (1"-448") [VH (*Homo sapiens* IGHV4-59*01 (96.9%) - (IGHD) -IGHJ6*01 (100%), CDR-IMGT [8.7.16] (26"-33".51"-57".96"-111")) (1"-122")-*Homo sapiens* IGHG4*01, G4v5 h P10,nG4m(a) CH2 L92, G4v7 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1, G4v8 CH3 R115, F116, P125 (CH1 (123"-220"), bisagra 1-12 S10>P (230") (221"-232"), CH2 E1.4>del, F1.3>P (235"), L1.2>V (236"), G1.1>A (237"), L92 (310") (233"-341"), CH3 H115>R (436"), Y116>F (437"), L125>P (446") (342"-446"), CHS (447"-448")) (123"-448")), (136"-215")-disulfuro con la cadena ligera kappa *Homo sapiens* (1"-215") [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [7.3.9] (27"-33".51"-53".90"-98")) (1"-108") -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154"), V101 (192") (109"-215")); dímero (230-228":233-231")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), forma glicosilada alfa
inmunostimulante, antineoplásico

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-FOLH1 (H)
QVQLVESGGG VVQPGRSRLR SCAASGFTFS SYGMHWVRQA PGKGLEWVAF 50
MSYDGSNKFY SDSVKGRFTI SRDNSRKMLF LQMNNLRAED TAVYYCARDQ 100
YYDFLTDHGV FDYWGQGLTV TVSSASTKGP SVFPLAPCSR STSESTAALG 150
CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVTVPSSSL 200
GTKTYTCNVD HKPSNTKVDK RVEISKYGPPC PPCPAPFVAG PSVFLFPKP 250
KDTLMISRTP EVTCVVVDVS QEDPEVQFNN YVDGVEVHNA KTKPREEQFN 300
STYRVVSVLT VLGHDWLNKG EYKCKVSNKG LPSSIEKTIS KAKGPREPQ 350
VYTLPPSQEE MTKNQVSLTLC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTFPV 400
LDSGGSFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLKG 450

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-CD28 (H")
QVQLQESGPG LVKPSSETLSL TCTVSGGSIS SYWWSWIRQP PGKGLEWIGY 50
IYYSGITHYN PSLKSRVTIS VDTSKIQFSL KLSSVTAADT AVYYCARWGV 100
RRDYVYVYGM VVGQGTTVTV SSASTKGPSV FPLAPCSRST SESTAALGCL 150
VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYLSLSS VTVPSSSLGT 200
KTYTCNVDDK PSNTKVDKRV ESKYGPPCP PPAPFVAGPS VFLFPKPKD 250
TLMISRTPEV TCVVVDVSQE DPEVQFNNYV DGEVHNHAKT KPREEQFNST 300
YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKGLP SSIEKTISKA KGQPREPQVY 350
TLFPFSQEEM KNQVSLTCLV RGFYPSDIAV EWESNGQFEN NYKTTFPVLD 400
SDGSFFLYSR LTVDKSRWQE GNVFSCSVMH EALHNHFTQK SLSLSPGK 448

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera (L', L")
EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQSVS SSYLAWYQQK PGQAPRLLIY 50
GASSRATGIP DRFSGSGSGT DFTLTISRLE PEDFAVYYCQ QYGSPPWTFG 100
QGTRKVEIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNMF YPREAKVQWK 150
VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSLSTL TSLKADYEKH KVYACEVTHQ 200
GLSSPVTKSF NRGEK 215

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 151-207 264-324 370-428
22"-95" 149"-205" 262"-322" 368"-426"
Intra-L (C23-C104) 23'-89" 135'-195'
23"-89" 135"-195"
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 138-215' 136"-215"
Inter-H-H (h 8, h 11) 230-228" 233-231"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 300, 298"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados.

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 450, 448"

nimatpagenum pariparovecum #
nimatpagene pariparovec

recombinant, non-replicating adeno-associated virus serotype 3B (rAAV3B) vector, encoding a shortened version of the human copper-transporting ATPase 2 (ATP7B) (also known as ATPase copper-transporting beta, Wilson disease-associated protein) which is devoid of the first four of the six metal binding sites (MBS) (mini-ATP7B), under control of a liver specific human alpha-1 antitrypsin (AAT) promoter and a synthetic polyadenylation sequence derived from the polyadenylation signal of the rabbit β-globin gene, and flanked by adeno-associated virus 2 (AAV2) inverted terminal repeats (ITRs)
gene therapy (Wilson's disease)

nimatpagène pariparovec

vecteur recombinant non répliquant du virus adéno-associé de sérotype 3B (rAAV3B) codant une version raccourcie (mini-ATP7B) de l'ATPase 2 (ATP7B) humaine transportant le cuivre (également connue sous le nom d'ATPase bêta transportant le cuivre, protéine associée à la maladie de Wilson) dépourvue des quatre premiers des six sites de liaison aux métaux (MBS), sous le contrôle d'un promoteur de


	l'antitrypsine alpha-1 humaine (AAT) spécifique du foie et d'une séquence de polyadénylation (polyA) synthétique dérivée du signal polyA du gène de la β -globine de lapin, et flanquée de répétitions terminales inversées (ITR) du virus adéno-associé 2 (AAV2) <i>thérapie génique (maladie de Wilson)</i>
nimatpagén pariparvovec	vector de virus adenoasociado del serotipo 3B recombinante (rAAV3B), no replicativo, que codifica para una versión recortada de la ATPasa transportadora de cobre 2 (ATP7B) humana (también conocida como ATPasa transportadora de cobre beta, proteína asociada a la enfermedad de Wilson) a la cual le faltan los primeros cuatro de los seis sitios de unión al metal (MBS) (mini-ATP7B), bajo el control de un promotor específico de hígado de la alfa-1 antitripsina (AAT) humana y una secuencia de poliadenilación (poliA) sintética derivada de la señal poliA del gen de la β -globina de conejo, y flanqueado por repeticiones terminales invertidas (ITRs) del virus adenoasociado 2 (AAV2) <i>terapia génica (enfermedad de Wilson)</i>
	2773545-20-1
nisotirostidum nisotirostide	L-prolyl-L-lysyl-L-prolyl-L- α -glutamyl-N ⁶ -[N-(17-carboxyheptadecanoyl)-L- γ -glutamyl-L- α -glutamyl-6-aminohexanoyl]-L-lysyl-L-prolylglycyl-L- α -glutamyl-L- α -aspartyl-L-alanyl-L-seryl-L-prolyl-L- α -glutamyl-L- α -glutamyl-L-tryptophyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-tyrosyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L- α -glutamyl-L-leucyl-L-arginyl-L-histidyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-asparaginyll-L-tryptophyl-L-leucyl-L-threonyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-tyrosinamide <i>neuropeptide Y (NPY) receptor agonist</i>
nisotirostide	L-prolyl-L-lysyl-L-prolyl-L- α -glutamyl-N ⁶ -[N-(17-carboxyheptadecanoyl)-L- γ -glutamyl-L- α -glutamyl-6-aminohexanoyl]-L-lysyl-L-prolylglycyl-L- α -glutamyl-L- α -aspartyl-L-alanyl-L-seryl-L-prolyl-L- α -glutamyl-L- α -glutamyl-L-tryptophyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-tyrosyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L- α -glutamyl-L-leucyl-L-arginyl-L-histidyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-asparaginyll-L-tryptophyl-L-leucyl-L-thréonyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-tyrosinamide <i>agoniste du récepteur du neuropeptide Y (NPY)</i>
nisotirostida	L-prolil-L-lisil-L-prolil-L- α -glutamyl-N ⁶ -[N-(17-carboxiheptadecanoil)-L- γ -glutamyl-L- α -glutamyl-6-aminohexanoil]-L-lisil-L-prolilglycil-L- α -glutamyl-L- α -aspartil-L-alanil-L-seril-L-prolyl-L- α -glutamyl-L- α -glutamyl-L-triptofil-L-glutaminil-L-arginil-L-tirosil-L-tirosil-L-alanil-L- α -glutamyl-L-leucil-L-arginil-L-histidil-L-tyrosil-L-leucil-L-asparaginil-L-triptofil-L-leucil-L-treonil-L-arginil-L-glutaminil-L-arginil-L-tirosinamida <i>agonista del receptor del neuropéptido Y (NPY)</i>

C₂₃₀H₃₄₃N₅₉O₆₅

2663844-45-7

PKPEKPGEDA SPEEWQRYYA ELRHYLNWLT RQRY 34

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados



omoprubartum #

omoprubart

immunoglobulin G2/G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* C5 (complement 5)], monoclonal antibody; gamma2/gamma4 heavy chain (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*06 (85.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.15] (26-33.51-58.97-111)) (1-122) -*Homo sapiens* IGHG2*01 CH1-hinge (CH1 (123-220), hinge 1-15 (221-232)) -*Homo sapiens* IGHG4*01 CH2-CH3, nG4m(a) CH2 L92, G4v7 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1, G4v21 CH2 Y15.1, T16, E18 (CH2 L92 (310)E1.4>del, F1.3>P (235), L1.2>V (236), G1.1>A (237), M>Y15.1 (253), S>T16 (255), T>E18 (257)(233-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (123-448)], (136-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (77.9%) -IGKJ3*01 (81.8%) P120>G (100'), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'') (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214'')]; dimer (224-224'':225-225'':228-228'':231-231'')-tetrakisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, glycoform alfa *immunosuppressant*

omoprubart

immunoglobuline G2/G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* C5 (complément 5)], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma2/gamma4 (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*06 (85.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.15] (26-33.51-58.97-111)) (1-122) -*Homo sapiens* IGHG2*01 CH1-charnière (CH1 (123-220), charnière 1-15 (221-232)) -*Homo sapiens* IGHG4*01 CH2-CH3, nG4m(a) CH2 L92, G4v7 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1, G4v21 CH2 Y15.1, T16, E18 (CH2 L92 (310)E1.4>del, F1.3>P (235), L1.2>V (236), G1.1>A (237), M>Y15.1 (253), S>T16 (255), T>E18 (257), (233-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (123-448)], (136-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (77.9%) -IGKJ3*01 (81.8%) P120>G (100'), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'') (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214'')]; dimère (224-224'':225-225'':228-228'':231-231'')-tétrakisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa *immunosuppresseur*

omoprubart

inmunoglobulina G2/G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* C5 (complemento 5)], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma2/gamma4 (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*06 (85.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.15] (26-33.51-58.97-111)) (1-122) -*Homo sapiens* IGHG2*01 CH1-bisagra (CH1 (123-220), bisagra 1-15 (221-232)) -*Homo sapiens* IGHG4*01 CH2-CH3, nG4m(a) CH2 L92,G4v7 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1, G4v21 CH2 Y15.1, T16, E18 (CH2 L92 (310)E1.4>del, F1.3>P (235), L1.2>V (236), G1.1>A (237), M>Y15.1 (253), S>T16 (255), T>E18 (257),(233-341), CH3 (342-446), CHS (447-448)) (123-448)], (136-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (77.9%) -IGKJ3*01 (81.8%) P120>G (100'), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (224-224"-225-225"-228-228"-231-231")-tetrakisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, forma glicosilada alfa *inmunosupresor*

2763342-87-4

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SKASGSHFT	DFYMQWVRQA
ILPGTGHTVE	AQKFQGRVTM	TRDTSISTVY	MEVRRLRSD
FGSTPNWYFD	VWGQGTLLTV	SSASTKGPSV	FPLAPCSRST
VKDYFPEPVT	VSWNSGALTS	GVHTFPAVLQ	SSGLYSLSV
QTYTCNVNDR	PSNTKVDKTV	ERKCCVECP	CPAPPVAGPS
TLYITREPEV	TCVVVDVSQ	DPEVFNWYV	DGVEVHNAKT
YRVVSVLTVL	HQDWLNGKEY	KCKVSNKGLP	SSIEKTSKA
TLPPSQEEMT	KNQVSLTCLV	KGFPYSDIAV	EWESNGQFEN
SDGSFFLYSR	LTVDKSRWQE	GNVFSCSVMH	EALHNYHTQK
			SLSLSLGK
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
EIVMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCGATENIY	GALNWYQHEP
ASNRYTGVT	RFSGSGSGTD	FTLTISTLQP	EDFATYYCQ
GTKVDIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNNFY
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSLSTLT	LSKADYEKHK
LSSPVTKSFN	RGEC		

Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	149-205	262-322
	22"-96"	149"-205"	262"-322"
Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'	
	23"-88"	134"-194"	
Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	136-214'	136"-214"	
Inter-H-H (h 4, h 5, h 8, h11)	224-224"	225-225"	228-228"
			231-231"
N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal			
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxoprolyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)			
H VQ1: 1, 1"			
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación			
H CH2 N84.4: 298, 298"			
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados.			
C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal			
H CHS K2: 448, 448"			

omramotidum
omramotide

L-phenylalanyl-L-leucyl-L-prolyl-L-phenylalanylglycyl-L-phenylalanyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-prolyl-L-valine
immunological agent for active immunization (antineoplastic)

omramotide L-phénylalanil-L-leucyl-L-prolyl-L-phénylalanilglycyl-L-phénylalanil-L-isoleucyl-L-leucyl-L-prolyl-L-valine
agent immunologique d'immunisation active (antineoplasique)

omramotida L-fenilalanil-L-leucil-L-prolil-L-fenilalanilglicil-L-fenilalanil-L-isoleucil-L-leucil-L-prolil-L-valina
agente inmunológico para inmunización activa (antineoplásico)

C₆₂H₈₈N₁₀O₁₁ 2306406-71-1

Phe — Leu — Pro — Phe — Gly — Phe — Ile — Leu — Pro — Val

onacrisantaspasum #
onacrisantaspase

Dickeya dadantii (formerly known as *Erwinia chrysanthemi*) L-asparaginase (L-ASNase, L-asparagine amidohydrolase, EC: 3.5.1) (202-528), fused at its N-terminus to a hydrophobic random coil proline-alanine-rich peptide (PAS sequence, (AAPAAPAPAA PAAPAPAAPAA)₁₀A) (1-201), tetramer, produced in *Pseudomonas fluorescens antineoplastic*

onacrisantaspase L-asparaginase (L-ASNase, L-asparagine amidohydrolase, EC: 3.5.1) (202-528) de *Dickeya dadantii* (anciennement *Erwinia chrysanthemi*), fusionnée à son extrémité N-terminale à un peptide hydrophobe à hélice aléatoire riche en proline-alanine (séquence PAS, (AAPAAPAPAA PAAPAPAAPAA)₁₀A) (1-201), tétramère, produite chez *Pseudomonas fluorescens antineoplasique*

onacrisantaspasa *Dickeya dadantii* (antiguamente conocida como *Erwinia chrysanthemi*) L-asparaginasa (L-ASNase, L-asparagina amidohidrolasa, EC: 3.5.1) (202-528), fusionada en su N-terminal a una espiral hidrofóbica aleatoria de péptido enriquecido con prolina y alanina (secuencia PAS, (AAPAAPAPAA PAAPAPAAPAA)₁₀A) (1-201), tetrámero, producido en *Pseudomonas fluorescens antineoplásico*

2256099-52-0

Monomer sequence / Séquence du monomère / Secuencia del monómero					
AAPAAPAPAA	PAAPAPAAPAA	AAPAAPAPAA	PAAPAPAAPAA	AAPAAPAPAA	50
PAAPAPAAPAA	AAPAAPAPAA	PAAPAPAAPAA	AAPAAPAPAA	PAAPAPAAPAA	100
AAPAAPAPAA	PAAPAPAAPAA	AAPAAPAPAA	PAAPAPAAPAA	AAPAAPAPAA	150
PAAPAPAAPAA	AAPAAPAPAA	PAAPAPAAPAA	AAPAAPAPAA	PAAPAPAAPAA	200
AADKLPNIVI	LATGGTIAGS	AATGTQTTGY	KAGALGVDTL	INAVPEVKKL	250
ANVKGEQFSN	MASENMTGDV	VLKLSQRVNE	LLARDDVDGV	VITHGTDTVE	300
ESAYFLHLTV	KSDKPVVFVA	AMRPATAISA	DGPMNLLEAV	RVAGDKQSRG	350
RGVMVVLNDR	IGSARYITKT	NASTLDTFKA	NEEGYLGVII	GNRIYYQNRI	400
DKLHTTRS VF	DVRGLTSLPK	VDILYGYQDD	PEYLYDAAIQ	HGVRGIVYAG	450
MGAGSVSVRG	IAGMRKAMEK	GVVVIRSTRT	NGIVPPDEE	LPGLVSDSLN	500
PAHARILLML	ALTRTSDPKV	IQEYFHTY			528

Post-translational modifications
none / aucun / ninguna

onvapegleukinum alfa #
onvapegleukin alfa

human interleukin-2, variant (R³⁸>C, C¹²⁵>S), substituted at N⁶ of one lysine residue mainly at K³² and K⁷⁶ with 40kDa mPEG and at the sulfur atom of C³⁸ with 5 kDa mPEG, produced in Chinese hamster ovary (CHO) K1 cells, glycoform alfa
interleukin-2 analogue, antineoplastic

	<i>sapiens</i>IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v14 CH2 A1.3, A1.2, G1v76 CH2 C27, G1v77 CH3 A115(CH1 K120 (220) (124-221), hinge 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), D27>C (271) (237-346), CH3 D12 (362), L14 (364) H115>A (441) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfide with kappa light chain <i>Homo sapiens</i> (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-12*01 (89.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (232-232":235-235")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DG44, glycoform alfa <i>immunomodulator, antineoplastic</i>
opelkibart	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> KIT (KIT proto-oncogène récepteur tyrosine kinase, c-Kit, SCFR, CD117)], anticorps monoclonal <i>Homo sapiens</i>; chaîne lourde gamma1 <i>Homo sapiens</i> (1-453) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV5-51*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (93.3%) M123>L (118), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v14 CH2 A1.3, A1.2, G1v76 CH2 C27, G1v77 CH3 A115 (CH1 K120 (220) (124-221), charnière 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), D27>C (271) (237-346), CH3 D12 (362), L14 (364) H115>A (441) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa <i>Homo sapiens</i> (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-12*01 (89.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (232-232":235-235")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DG44, glycoforme alfa <i>immunomodulateur, antinéoplasique</i>
opelkibart	immunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> KIT (KIT proto-oncogén receptor tirosina kinasa, c-Kit, SCFR, CD117)], anticuerpo monoclonal <i>Homo sapiens</i>; cadena pesada gamma1 <i>Homo sapiens</i> (1-453) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV5-51*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (93.3%) M123>L (118), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v14 CH2 A1.3, A1.2, G1v76 CH2 C27, G1v77 CH3 A115 (CH1 K120 (220) (124-221), bisagra 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), D27>C (271) (237-346), CH3 D12 (362), L14 (364) H115>A (441) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa <i>Homo sapiens</i> (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-12*01 (89.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (232-232":235-235")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-DG44, forma glicosilada alfa <i>immunomodulador, antineoplásico</i>

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada	
EVQLVQSGAE VKKPGESLKI SCKSGYSFT NYWIGWVRQM PGKGLEWMAI	50
INPRDS TRY RPSFGQQTIT SADKSI STAY LQWSSLKASD TAMYYCARHG	100
RGYEGYEGAF DIWGQGTIVT VSSASTKGPS VFPLAPSSKS TSGGTAALGC	150
LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSL VVTVPSSSLG	200
TQTYICNVNH KPSNTKVDKK VEPKSCDKTH TCPPCPAPEA AGGPSVFLFP	250
PKPKDTLMIS RTPETVCVVV CVSHEDPEVK FNWYVDGVEV HNAKTKPREE	300
QYNSTYRVVS VLTVLHQDWL NGKEYCKVVS NKALPAPIEK TISKAKGQPR	350
EPQVYTLPPS RDELTKNQVS LTCLVKGFYP SDIAVEWESN GQPENNYKTT	400
PPVLDSDGSF FLYSKLTVDK SRWQQGNVFS CSVMEALHN AYTQKSLSLS	450
PGK	453
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera	
DIQMTQSPSS LSASVGRDRTV ITCRSSQGIT SDLGWYQKPK GKAPKLLIYD	50
ASNLETGVPS RFGSGSGSDT FTLTISSLQP EDFATYYCQQ ANGFP LTFGG	100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQMKV	150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSFN RGECC	214
Post-translational modifications	
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro	
Intra-H (C23-C104) 22-96 150-206 267-327 373-431	
22"-96" 150"-206" 267"-327" 373"-431"	
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"	
23"-88" 134"-194"	
Inter-H-L (h 5-CL 126) 226-214" 226-214"	
Inter-H-H (h 11, h 14) 232-232" 235-235"	
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación	
H CH2 N84.4: 303, 303"	
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenararios complejos fucosilados	
C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal	
H CHS K2: 453, 453"	

opelkibartum elmanitinum #
opelkibart elmanitin

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* KIT (KIT proto-oncogene receptor tyrosine kinase, c-kit, SCFR, CD117)], *Homo sapiens* monoclonal antibody, conjugated, via a noncleavable linker, at the sulfur atoms of cysteine residues 271 and 271" to a synthetic α -amanitin derivative;
gamma1 heavy chain *Homo sapiens* (1-453) [VH (*Homo sapiens*IGHV5-51*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (93.3%) M123>L (118), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v14 CH2 A1.3, A1.2, G1v76 CH2 C27, G1v77 CH3 A115 (CH1 K120 (220) (124-221), hinge 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), D27>C (271) (237-346), CH3 D12 (362), L14 (364) H115>A (441) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfide with kappa light chain *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (89.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (232-232":235-235')-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DG44, glycoform alfa; substituted at the sulfur atoms of cysteine residues 271 and 271" with 1-[6-({1,8-anhydro:C^{2,4}, S^{3,8}-cyclo[L-asparaginyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolyl-(4R)-4,5-dihydroxy-L-isoleucyl-L-tryptophylglycyl-L-isoleucylglycyl-L-cystein]-C^{6,4}-yl}oxy)hexyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl (*elmanitin*) group
immunomodulator, antineoplastic

opelkibart elmanitine

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* KIT (KIT proto-oncogène récepteur tyrosine kinase, c-Kit, SCFR, CD117)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*, conjugué, via un linker non-clivable, sur les atomes de soufre des résidus cystéine 271 et 271" à un dérivé de l' α -amanitine synthétique;

chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens* (1-453) [VH (*Homo sapiens* IGHV5-51*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (93.3%) M123>L (118), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v14 CH2 A1.3, A1.2, G1v76 CH2 C27, G1v77 CH3 A115 (CH1 K120 (220) (124-221), charnière 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), D27>C (271) (237-346), CH3 D12 (362), L14 (364) H115>A (441) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (89.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (232-232":235-235")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DG44, glycoforme alfa; substituée sur les atomes de soufre des résidus cystéine 271 et 271" avec le groupe 1-[6-({1,8-anhydro:C^{2,4},S^{3,8}-cyclo[L-asparaginy]-(4*R*)-4-hydroxy-L-prolyl-(4*R*)-4,5-dihydroxy-L-isoleucyl-L-tryptophylglycyl-L-isoleucylglycyl-L-cystéin]-C^{6,4}-yl}oxy)hexyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yle (*elmanitine*)

immunomodulateur, antinéoplasique

opelkibart elmanitina

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* KIT (KIT proto-oncogén receptor tirosina kinasa, c-Kit, SCFR, CD117)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*, conjugado, a través de un enlace no escindible, sobre los átomos de azufre de los residuos de cisteína 271 y 271" a un derivado de la α -amanitina sintética;

cadena pesada gamma1 *Homo sapiens* (1-453) [VH (*Homo sapiens* IGHV5-51*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (93.3%) M123>L (118), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v14 CH2 A1.3, A1.2, G1v76 CH2 C27, G1v77 CH3 A115 (CH1 K120 (220) (124-221), bisagra 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), D27>C (271) (237-346), CH3 D12 (362), L14 (364) H115>A (441) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (89.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (232-232":235-235")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-DG44, forma glicosilada alfa; substituida sobre los átomos de azufre de los residuos de cisteína 271 y 271" con el grupo 1-[6-({1,8-anhidro:C^{2,4},S^{3,8}-ciclo[L-asparaginy]-(4*R*)-4-hidroxi-L-prolyl-(4*R*)-4,5-dihidroxi-L-isoleucil-L-triptofilglicil-L-isoleucilglicil-L-cistein]-C^{6,4}-il}oxi)hexil]-2,5-dioxopirrolidin-3-ilo (*elmanitina*)

immunomodulador, antineoplásico

2771389-45-6

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

VQVYQSGAE	WPKGQSGKI	SCKGSGYSF	NYWYHGMQRM	PGKWEYMAH	50
INFRSDIRTD	RPSQGGQVTI	SADKSISTAY	LQWSSKLAC	THYVACRHG	100
RGYGEYEGAF	DIWQGGTLTV	VSSASTKPGV	VFLAPLASKS	TSGGTAAALC	150
LKVDYFPFEP	TVWNSNGALT	SGVHTFPAFL	QSSGLYSLSL	VTVFSSSLSG	200
TOYTCIMNVH	KPSNTKCDKK	VYSECDKTHC	TCPCCPAAEA	AGAGSVFLPF	250
PKPKDITLNV	RLTEPVTCKV	CYPSEHDEPVK	FNWYVDPGEV	HNNAKTPREE	300
QYNSTYRVVY	VDLTHQDWL	NGKCYEYKVS	NKALPAPIEK	TTSKAKQKPR	350
EQVYVTLFVS	RELDTKNQVS	RLTCLVKGYP	SDIAVEHMSN	QPGENNYKTF	400
PVPLVDSGFS	FLYSKLTVDK	SRWQGNVFS	CSVMHEALHN	AYTQKSLSL	450
PCK					453

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

High chain	Chain AGV	Chain AGG		
DIQMOTSGPSS	LSAGVSDGRVT	ITCRSSQGQIR	SDLGWYQQKP	GKAPKLLIYD 50
ASNLETGVPS	RFSGSGSGTD	FTLTISSLQP	EDFATYYCQQ	ANGFPLTFGG 100
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNIFY	PREAKVQWVK 150
DLSQSGNSGQ	ESVTEQDSKD	STYLSSTLT	LSKADYEKKH	YVACEVTHQG 200
NNAPVTKSFN	RGEC			214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-96	150-206	267-327	373-431
	22"-96"	150"-206"	267"-327"	373"-431"

	22'-90'	150'-200'
Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'
	23'''-88'''	134'''-194'''

	25	-68	-154	-194
Inter-H-L (h 5-CL 126)	226-214'	226"-214'''		
Inter-H-H (h 11 h 14)	232-232"	235-235"		


N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 303, 303"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 453_453"

Modified residues / résidus modifiés / restos modificados
C (271, 271")



opemalirsenum
opemalirsen

all-P-ambo-2'-O,4'-C-[(1S)-ethane-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethane-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethane-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thiothymidylyl-(3'→5')-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenylyl-(3'→5')-P-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-P-thioguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethane-1,1-diyl]-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethane-1,1-diyl]-P-thioadenylyl-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-ethane-1,1-diyl]-5-methyl-P-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methylcytidine
apolipoprotein L1 (APOL1) synthesis reducer

opémalirsén

*tout-P-ambo-2'-O,4'-C-[(1S)-éthane-1,1-diyl]-5-méthyl-
P-thiouridyl- (3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-éthane-1,1-diyl]-
5-méthyl-P-thiouridyl- (3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-éthane-
1,1-diyl]-5-méthyl-P-thiouridyl- (3'→5')-P-
thiothymidyl- (3'→5')-2'-désoxy-P-thioquanylyl-*

(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-*P*-thioguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1*S*)-éthane-1,1-diyl]-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1*S*)-éthane-1,1-diyl]-*P*-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1*S*)-éthane-1,1-diyl]-5-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthylcytidine
réducteur de la synthèse de l'apolipoprotéine L1 (APOL1)

opemalirsén

*todo-P-ambo-2'-O,4'-C-[(1S)-etano-1,1-diil]-5-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-etano-1,1-diil]-5-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-etano-1,1-diil]-5-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-P-tiotimidilil-(3'→5')-2'-desoxi-P-tioguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-etano-1,1-diil]-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-etano-1,1-diil]-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O,4'-C-[(1S)-etano-1,1-diil]-5-metil-P-tiocitidilil-(3'→5')-5-metil-2'-O-(2-metoxietil)citidina
reductor de la síntesis de la apolipoproteína L1 (APOL1)*

2639853-99-7

m⁵U=m⁵U=m⁵U=dT=dG=dT=dA=dA=dG=dT=dG=m⁵C_d=A=A=m⁵C=m⁵Cmoe


N : nucleoside / nucléoside / nucleósido

m⁵N : 5-methyl-N / 5-méthyl-N / 5-metil-N

dN & N_d : 2'-deoxy-N / 2'-désoxy-N / 2'-desoxi-N

Nmoe : 2'-O-(2-methoxyethyl)-N / 2'-O-(2-méthoxyéthyl)-N / 2'-O-(2-metoxietil)-N

= : -PS(OH)-



opevesostatium

opevesostat

2-[(1,3-dihydro-2*H*-isoindol-2-yl)methyl]-5-[[1-(methanesulfonyl)piperidin-4-yl]methoxy]-4*H*-pyran-4-one
cholesterol side-chain cleavage enzyme (CYP11A1) inhibitor

opévésostat


2-[(1,3-dihydro-2*H*-isoindol-2-yl)méthyl]-5-[[1-(méthanesulfonyl)pipéridin-4-yl]méthoxy]-4*H*-pyran-4-one
inhibiteur de l'enzyme de clivage de la chaîne latérale du cholestérol (CYP11A1)

opevesostat

2-[(1,3-dihidro-2*H*-isoindol-2-il)metil]-5-[[1-(metanosulfonyl)piperidin-4-il]metoxi]-4*H*-piran-4-ona
inhibidor de la enzima de escisión de la cadena lateral del colesterol (CYP11A1)

$C_{21}H_{26}N_2O_5S$

2231294-96-3

**orzilobenum**

orziloben

2-methyl-3-(pentyloxy)benzoic acid
medium chain fatty acid (MCFA) analogue

orzilobène


acide 2-méthyl-3-(pentyloxy)benzoïque
analogue d'acide gras à chaîne moyenne (AGCM)

orzilobén

ácido 2-metil-3-(pentiloxi)benzoico
análogo de ácido graso de cadena media (AGCM)

 $C_{13}H_{18}O_3$

1555822-28-0

**osavampatorum**

osavampator

9-[4-(cyclohexyloxy)phenyl]-7-methyl-3,4-dihydro-2H-
 2λ⁶-pyrazino[2,1-c][1,2,4]thiadiazine-2,2-dione
antipsychotic

osavampator


9-[4-(cyclohexyloxy)phényl]-7-méthyl-3,4-dihydro-2H-
 2λ⁶-pyrazino[2,1-c][1,2,4]thiadiazine-2,2-dione
antipsychotique

osavampator

9-[4-(ciclohexiloxi)fenil]-7-metil-3,4-dihidro-2H-2λ⁶-
 pirazino[2,1-c][1,2,4]tiadiazina-2,2-diona
antipsicótico

 $C_{19}H_{23}N_3O_3S$

1358751-06-0



osunprotafibum

osunprotafib

5-((7*R*)-1-fluoro-3-hydroxy-7-[(3-methylbutyl)amino]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1λ⁶,2,5-thiadiazolidine-1,1,3-trione

protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitor, antineoplastic

osunprotafib

5-((7*R*)-1-fluoro-3-hydroxy-7-[(3-méthylbutyl)amino]-5,6,7,8-tétrahydronaphtalén-2-yl)-1λ⁶,2,5-thiadiazolidine-1,1,3-trione

inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase (PTP), antinéoplasique


osunprotafib

5-((7*R*)-1-fluoro-3-hidroxi-7-[(3-metilbutil)amino]-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)-1λ⁶,2,5-tiadiazolidina-1,1,3-triona

inhibidor de la proteína tirosina fosfatasa (PTP), antineoplásico

C₁₇H₂₄FN₃O₄S

2489404-97-7

**oximbomotidum**

oximbomotide

L-leucyl-L-methionyl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-seryl-L-threonyl-L-threonyl-L-α-glutamyl-L-valine

immunological agent for active immunization (antineoplastic)

oximbomotide

L-leucyl-L-méthionyl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-séryl-L-thréonyl-L-thréonyl-L-α-glutamyl-L-valine

agent immunologique d'immunisation active (antineoplasique)

oximbomotida

L-leucil-L-metionil-L-α-aspartil-L-leucil-L-seril-L-treonil-L-treonil-L-α-glutamil-L-valina

agente inmunológico para inmunización activa (antineoplásico)

C₄₂H₇₃N₉O₁₇S

2306406-51-7

Leu — Met — Asp — Leu — Ser — Thr — Thr — Glu — Val

pamvatamigum #

pamvatamig

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* MET (met proto-oncogene, hepatocyte growth factor (HGF) receptor, HGFR, scatter factor (SF) receptor, HGF/SF receptor, receptor tyrosine-protein kinase c-met, papillary renal cell carcinoma 2, RCCP2)] and anti-[*Homo sapiens* EGFR (epidermal growth factor receptor, receptor tyrosine-protein kinase erbB-1, ERBB1, HER1, HER-1, ERBB)], *Homo sapiens* monoclonal antibody, bispecific;

gamma1 heavy chain anti-MET *Homo sapiens* (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV7-4-1*02 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123)-*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14, G1v72 CH3 D7, E24 (CH1 R120 (220) (124-221), hinge 1-15 (222-236), CH2 (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), L7>D (357), L24>E (374) (347-451), CHS K2>del (452)) (124-452)], (226-214')-disulfide with common kappa light chain *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; gamma1 heavy chain anti-EGFR *Homo sapiens* (1'-451") [VH (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (98.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.15] (26"-33".51"-58".97"-111")) (1"-122")-*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14, G1v73 CH3 K7, K22 (CH1 R120 (219") (123"-220"), hinge 1-15 (221"-235"), CH2 (236"-345"), CH3 E12 (361"), M14 (363"), L7>K (356"), T22>K (371") (346"-450"), CHS K2>del (451")) (124"-452")], (226"-214'")-disulfide with common kappa light chain *Homo sapiens* (1'"-214'") [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'"-32'" .50'" -52'" .89'" -97'")) (1'"-107'") -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'"), V101 (191'") (108'"-214'")]; dimer (232-231":235-234")-bisdisulfide, produced in a Chinese hamster ovary (CHO) cell line, co-expressing the RMD enzyme (GDP-6-deoxy-D-lyxo-4-hexulose reductase), glycoform alfa *antineoplastic*

pamvatamig

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* MET (proto-oncogène met, récepteur du facteur de croissance hépatocytaire, HGFR, récepteur du facteur de dispersion (SF), récepteur de l'HGF/SF, récepteur protéine-tyrosine kinase c-met, carcinome papillaire à cellules rénales 2, RCCP2)] et anti-[*Homo sapiens* EGFR (récepteur du facteur de croissance épidermique, récepteur tyrosine-protéine kinase erb-1, ERBB1, HER1, HER-1, ERBB)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*, bispécifique; chaîne lourde gamma1 anti-MET *Homo sapiens* (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV7-4-1*02 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123)-*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14, G1v72 CH3 D7, E24 (CH1 R120 (220) (124-221), charnière 1-15 (222-236), CH2 (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), L7>D (357), L24>E (374) (347-451), CHS K2>del (452)) (124-452)], (226-214')-disulfure avec la chaîne commune légère kappa *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')];

chaîne lourde gamma1 anti-EGFR *Homo sapiens* (1"-451") [VH (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (98.0%) -(IGHD) - IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.15] (26"-33".51"-58".97"-111")) (1"-122")-*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14, G1v73 CH3 K7, K22 (CH1 R120 (219") (123"-220"), charnière 1-15 (221"-235"), CH2 (236"-345"), CH3 E12 (361"), M14 (363"), L7>K (356"), T22>K (371") (346"-450"), CHS K2>del (451")) (124"-452")], (226"-214")- disulfure avec la chaîne commune légère kappa *Homo sapiens* (1"-214") [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27"-32".50"-52".89"-97")) (1"-107")]-*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153"), V101 (191") (108"-214")]; dimère (232-231":235-234")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), co-exprimant l'enzyme RMD (GDP-6-désoxy-D-lyxo-4-hexulose réductase), glycoforme alfa antinéoplasique

pamvatamig

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* MET (proto-oncogén met, receptor del factor de crecimiento hepatocitario, HGFR, receptor del factor de dispersión (SF), receptor del HGF/SF, receptor proteína-tirosina quinasa c-met, carcinoma papilar de células renales 2, RCCP2)] y anti-[*Homo sapiens* EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico, receptor tirosina-proteína quinasa erb-1, ERBB1, HER1, HER-1, ERBB)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*, biespecífico; cadena pesada gamma1 anti-MET *Homo sapiens* (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV7-4-1*02 (95.9%) -(IGHD) - IGHJ5*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123)-*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14, G1v72 CH3 D7, E24 (CH1 R120 (220) (124-221), bisagra 1-15 (222-236), CH2 (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), L7>D (357), L24>E (374) (347-451), CHS K2>del (452)) (124-452)], (226-214')-disulfuro con la cadena común ligera kappa *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107')]-*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; cadena pesada gamma1 anti-EGFR *Homo sapiens* (1"-451") [VH (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (98.0%) -(IGHD) - IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.15] (26"-33".51"-58".97"-111")) (1"-122")-*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14, G1v73 CH3 K7, K22 (CH1 R120 (219") (123"-220"), bisagra 1-15 (221"-235"), CH2 (236"-345"), CH3 E12 (361"), M14 (363"), L7>K (356"), T22>K (371") (346"-450"), CHS K2>del (451")) (124"-452")], (226"-214")-disulfuro con la cadena común ligera kappa *Homo sapiens* (1"-214") [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27"-32".50"-52".89"-97")) (1"-107")]-*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153"), V101 (191") (108"-214")]; dímero (232-231":235-234")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), coexpresar la enzima RMD (GDP-6-desoxi-D-lixo-4-hexulosa reductasa), forma glicosilada alfa antineoplásico

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-MET (H)			
QVQLVQSGSE	LKKPGASVKV	SCKASGYTFT	TYSMNWVRQA PGQGLEWMGW 50
INTYTGDPPT	AQGFTGRFVF	SLDTSVSTAY	LQISSLKAED TAVYYCARET 100
YFYDRGGYFP	DPWGQGLTIV	VSSASTKGPS	VFLAPSSKS TSGGTAALGC 150
LVKDYFPEPV	TVSWNSGALT	SGVHTFPAVL	QSSGLYSLSV VVTVPSSSLG 200
TQTYICNVNH	KPSNTKVDKR	VEPKSCDKTH	TCPPCPAPEL LGGPSVFLFP 250
PKPKDTLMIS	RTPEVTCVVV	DVSHEDPEVK	FNWYVDGVEV HNAKTKFREE 300
QYNSTYRVVS	VLTVLHQDWL	NGKEYKCKVS	NKALPAPIEK TISKAKGQPR 350
EPQVYTPDPS	REEMTKNQVS	LTCEVKGFPF	SDIAVEWESN GQFENNYKTT 400
FPVLDSGSGF	FLYSKLTVDK	SRWQQGNVFS	CSVMHEALHN HYTQKSLSL 450
PG			452
Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-EGFR (H')			
QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGYTFT	SYGISWVRQA PGQGLEWMGW 50
ISAYNANTNY	AQKLQGRVTM	TTDTSTSTAY	MELRSLRSDD TAVYYCAKDR 100
HHHWLDAFDD	YWGQGLTIVT	SSASTKGPSV	FPLAPSSKST SGGTAALGCL 150
VKDYPFPEPVT	VSWNSGALTS	GVHTFPAVLQ	SSGLYSLSV VVTVPSSSLG 200
QTYICNVNHK	PSNTKVDKRV	EPKSCDKTHT	CPPCPAPELL GGPSVFLFP 250
KPKDTLMISR	TPEVTCVVVD	VSHEDPEVKF	NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ 300
YNSYTYRVVS	LTVLHQDWLN	GKEYKCKVSN	KALPAPIEKT ISKAKGQPRE 350
PQVYTKPPSR	EEMTKNQVSL	KCLVKGFYPS	DIAVEWESNG QPENNYKTT 400
PVLDSGSGFF	LYSKLTVDKS	RWQQGNVFSC	SVMHEALHNH YTQKSLSLSP 450
G			451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera: (L', L'')			
DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCRASQSIIS	SYLNWYQQKP GKAPKLLIYA 50
ASSLQSGVPS	RFSGSGSGTD	FTLTISSLQP	EDFATYYCQQ SYSTPPFFGQ 100
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNIFY PREAKVQWVK 150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYSLSLTIL	LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN	RGEC		214

Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	150-206	267-327 373-431
	22"-96"	149"-205"	266"-326"
Intra-L (C23-C104)	23"-88"	134"-194"	372"-430"
	23""-88""	134""-194""	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	226-214'	225"-214"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	232-231"	235-234"	

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutaminyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) /
piroglutamilo (pE, 5-oxopropilo)
VH Q1: 1, "

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 303, 302"

Low-fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO
bi-antennaires complexes faiblement fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios
complejos débilmente fucosilados

pegmispotidium
pegmispotide


1,11-anhydro[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(2S,3R,4R)-3-hydroxy-10-({3-[ω-methoxypoly(oxyethylene)-α-yl]propyl}amino)-4-methyl-2-(methylamino)-10-oxodecanoyl-(2S)-2-aminobutanoyl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-methyl-L-leucine] *anti-inflammatory*

pegmispotide


1,11-anhydro[L-alanyl-D-alanyl-N-méthyl-L-leucyl-N-méthyl-L-leucyl-N-méthyl-L-valyl-(2S,3R,4R)-3-hydroxy-10-({3-[ω-méthoxypoly(oxyéthylène)-α-yl]propyl}amino)-4-méthyl-2-(méthylamino)-10-oxodécanoyl-(2S)-2-aminobutanoyl-N-méthylglycyl-N-méthyl-L-leucyl-L-valyl-N-méthyl-L-leucine] *anti-inflammatoire*

pegmispotida

1,11-anhidro[L-alanil-D-alanil-N-metil-L-leucil-N-metil-L-leucil-N-metil-L-valil-(2S,3R,4R)-3-hidroxi-4-metil-2-(metilamino)-10-({3-[ω-metoxipoli(oxietileno)-α-il]propil}amino)-10-oxodecanoil-(2S)-2-aminobutanoyl-N-metilglicil-N-metil-L-leucil-L-valil-N-metil-L-leucina] *antiinflamatorio*



2412193-70-3

**perfluorohexyloctanum**

perfluorohexyloctane

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorotetradecane
ophthalmic lubricant


perfluorohexyloctane

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridécafluorotétradécane
lubrifiant ophtalmique

perfluorohexiloctano

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorotetradecano
lubricante oftálmico

133331-77-8

**petrelintidum**

petrelintide

3,8-anhydro[N-(19-carboxynonadecanoyl)-L-γ-glutamyl-L-arginyl-L-α-aspartylglycyl-L-threonyl-L-alanyl-L-threonyl-L-lysyl-L-alanyl-L-threonyl-L-α-glutamyl-L-arginyl-L-leucyl-L-alanyl-(2S)-α-2-aminoadipyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-arginyl-L-seryl-L-seryl-L-phenylalanyl-N-methylglycyl-L-alanyl-N-methyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-seryl-L-seryl-L-threonyl-L-α-glutamyl-L-valylglycyl-L-seryl-L-asparagyl-L-threonyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolinamide]
amylin analogue

pétrélintide

3,8-anhydro[N-(19-carboxynonadécanoil)-L-γ-glutamyl-L-arginyl-L-α-aspartylglycyl-L-thréonyl-L-alanyl-L-thréonyl-L-lysyl-L-alanyl-L-thréonyl-L-α-glutamyl-L-arginyl-L-leucyl-L-alanyl-(2S)-α-2-aminoadipyl-L-phénylalanyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-arginyl-L-séryl-L-séryl-L-phénylalanyl-N-méthylglycyl-L-alanyl-N-méthyl-L-isoleucyl-L-leucyl-L-séryl-L-séryl-L-thréonyl-L-α-glutamyl-L-valylglycyl-L-séryl-L-asparagyl-L-thréonyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolinamide]
analogue de l'amyline

petrelintida

3,8-anhidro[N-(19-carboxinonadecanoil)-L-γ-glutamyl-L-arginil-L-α-aspartilglicil-L-treonil-L-alanil-L-treonil-L-lisil-L-alanil-L-treonil-L-α-glutamyl-L-arginil-L-leucil-L-alanil-(2S)-α-2-aminoadipil-L-fenilalanil-


L-leucil-L-glutaminil-L-arginil-L-seril-L-seril-L-fenilalanil-
N-metilglilcil-L-alanil-*N*-metil-L-isoleucil-L-leucil-L-seril-L-
 seril-L-treonil-L- α -glutamil-L-valilglilcil-L-seril-L-
 asparaginil-L-treonil-(4*R*)-4-hidroxi-L-prolinamida]
análogo de amilina

C₁₈₅H₃₀₅N₄₉O₆₁


2766385-23-1

ERDGTATKAT ERLA~~X~~FLQRS SFG~~A~~ILSSTE VGSNT~~P~~ 36

Amide bridge location / Position du pont amide / Posición del puente amido



Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados

**pimicotinibum**

pimicotinib

3,3-dimethyl-*N*-(6-methyl-5-[[2-(1-methyl-1*H*-pyrazol-4-yl)pyridin-4-yl]oxy]pyridin-2-yl)-2-oxopyrrolidine-1-carboxamide

tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic

pimicotinib

3,3-diméthyl-*N*-(6-méthyl-5-[[2-(1-méthyl-1*H*-pyrazol-4-yl)pyridin-4-yl]oxy]pyridin-2-yl)-2-oxopyrrolidine-1-carboxamide


inhibiteur de tyrosine kinase, antinéoplasique

pimicotinib

3,3-dimetil-*N*-(6-metil-5-[[2-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)piridin-4-il]oxi]piridin-2-il)-2-oxopirrolidina-1-carboxamida

*inhibidor de la tirosina kinasa, antineoplásico*C₂₂H₂₄N₆O₃

2253123-16-7



pobrolitidum

pobrolitide

N-acetyl-D-tyrosylglycyl-D-arginyl-D-lysyl-D-lysyl-D-arginyl-D-arginyl-D-glutamyl-D-arginyl-D-arginyl-D-arginylglycyl-D-lysyl-D-threonyl-D-leucyl-D-arginyl-D-valyl-D-alanyl-D-lysyl-D-alanyl-D-isoleucyl-D-tyrosyl-D-lysyl-D-arginyl-D-tyrosyl-D-isoleucyl-D-isoglutamine
antineoplastic

pobrolitide

N-acétyl-D-tyrosylglycyl-D-arginyl-D-lysyl-D-lysyl-D-arginyl-D-arginyl-D-glutamyl-D-arginyl-D-arginyl-D-arginylglycyl-D-lysyl-D-thréonyl-D-leucyl-D-arginyl-D-valyl-D-alanyl-D-lysyl-D-alanyl-D-isoleucyl-D-tyrosyl-D-lysyl-D-arginyl-D-tyrosyl-D-isoleucyl-D-isoglutamine
antinéoplasique

pobrolitida

N-acetil-D-tirosilglicil-D-arginil-D-lisil-D-lisil-D-arginil-D-arginil-D-glutamini-D-arginil-D-arginil-D-arginilglicil-D-lisil-D-treonil-D-leucil-D-arginil-D-valil-D-alanil-D-lisil-D-alanil-D-isoleucil-D-tirosil-D-lisil-D-arginil-D-tirosil-D-isoleucil-D-isoglutamina
antineoplásico

C₁₅₄H₂₆₈N₅₈O₃₅

2775373-65-2


YGRKKRRQRR RGKTLRVAKA IYKRYIE 27

Configuration / Configuration / Configuración

X (1-27)*All-D* / *Tout-D* / *Todo-D*

D-Xaa

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados

**pozdeutinuradum**

pozdeutinurad

rac-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl){2-[(1*R*)-1-hydroxyethyl](4,5,6,7-²H₄)-1-benzofuran-3-yl}methanone
urate transporter inhibitor

pozdeutinurad


rac-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl){2-[(1*R*)-1-hydroxyéthyl](4,5,6,7-²H₄)-1-benzofuran-3-yl}méthanone
inhibiteur du transporteur de l'urate

pozdeutinurad

rac-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil){2-[(1*R*)-1-hidroxietil](4,5,6,7-²H₄)-1-benzofuran-3-il}metanona
inhibidor del transportador del urato

C₁₇H₈²H₄Br₂O₄

2173408-41-6



pozetaldogenum ormesparvovecum #

pozetaldogene ormesparvovec recombinant, non-replicating adeno-associated virus serotype 9 (rAAV9) vector encoding human adenosine triphosphate (ATP)-binding cassette sub-family D member 1 (ABCD1, also known as adrenoleukodystrophy (ALD) protein) under control of a human cytomegalovirus (CMV) enhancer/chicken β -actin (CBA) promoter plus a β -actin exon, a chimeric chicken β -actin/rabbit β -globin intron, and a rabbit β -globin exon 3, terminated with simian virus 40 (SV40) and bovine growth hormone (bGH) polyadenylation signals, and flanked by adeno-associated virus 2 (AAV2) inverted terminal repeats (ITRs)
gene therapy (adrenoleukodystrophy)

pozétaldogène ormesparvovec

vecteur recombinant, non répliquant, du virus adéno-associé de sérotype 9 (rAAV9) codant le membre 1 de la sous-famille D de la cassette de liaison à l'adénosine triphosphate (ATP) humaine (ABCD1, également connue sous le nom de protéine de l'adrénoleucodystrophie (ALD)) sous le contrôle d'un promoteur du cytomégalo virus humain (CMV)/de la β -actine de poulet (CBA) et d'un exon de la β -actine, un intron chimérique de la β -actine de poulet/de la β -globine de lapin et un exon 3 de la β -globine de lapin, terminés par des signaux de polyadénylation du virus simien 40 (SV40) et de l'hormone de croissance bovine (bGH), et encadrés par des répétitions terminales inversées (ITR) du virus adéno-associé 2 (AAV2)
thérapie génique (adrénoleucodystrophie)

pozetaldogén ormesparvovec

vector de virus adenoasociado del serotipo 9 recombinante (rAAV9), no replicativo, que codifica para el miembro 1 de la subfamilia D del casete de unión a la adenosina trifosfato (ATP) (ABCD1, también conocida como proteína de la adrenoleucodistofia (ALD)) bajo el control de un potenciador de citomegalovirus (CMV) humano /promotor de la β -actina de pollo (CBA) más un exón de la β -actina, un intrón quimérico de β -actina de pollo/ β -globina de conejo y un exón 3 de la β -globina de conejo terminado con señales de poliadenilación del virus de simio 40 (SV40) y de la hormona de crecimiento bovina (bGH), y flanqueado por repeticiones terminales invertidas (ITRs) del virus adenoasociado 2 (AAV2)
terapia génica (adrenoleucodistofia)

2764626-03-9

ragistomigum #

ragistomig

immunoglobulin G1-scFv_L-kappa dimer, anti-[*Homo sapiens* CD274 (programmed cell death 1 ligand 1, PDL1, PD-L1, B7 homolog 1, B7H1, B7-H1, PDCD1LG1)] and anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (TNF receptor superfamily member 9, 4-1BB, T cell antigen ILA, CD137)], humanized monoclonal antibody, bispecific;
fused G1-scFv lambda-heavy heavy chain humanized (1-715) [gamma1 anti-CD274 humanized (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-48*02 (87.8%) -(IGHD)-(IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [8.8.12] (26-33.51-58.97-108)) (1-119)-*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1,

	CH1 K120, CH3 E12, M14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120>K (216) (120-217), hinge 1-15 (218-232), CH2 N84.4>A (299) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)] -15-mer tris(tetraglycyl-seryl) linker (450-464) -scFv lambda-heavy anti-TNFRSF9 humanized scFv-v2 C120 (VL)-C49 (VH) (465-715) [V-LAMBDA (<i>Homo sapiens</i> IGLV1-47*02 (91.8%) -IGLJ2*01 (91.8%) C120 (567), CDR-IMGT [8.3.11] (490-497.515-517.554-564)) (465-574) -20-mer tetrakis(tetraglycyl-seryl) linker (575-594) -VH (<i>Homo sapiens</i>IGHV3-23*01 (93.9%) -IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.14] (620-627.645-652.691-704)) (595-715)]; (222-214')-disulfide with kappa light chain anti-CD274 humanized (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-33*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, non-glycosylated immunostimulant, antineoplastic
ragistomig	immunoglobuline G1-scFv_L-kappa dimère, anti-[<i>Homo sapiens</i> CD274 (ligand 1 de mort cellulaire programmée 1,PDL1, PD-L1, B7 homologue 1, B7H1, B7-H1, PDCD1LG1)] et anti-[<i>Homo sapiens</i> TNFRSF9 (membre 9 de la superfamille des récepteurs du TNF, 4-1BB, antigène ILA des cellules T, CD137)], anticorps monoclonal humanisé, bispécifique; chaîne lourde fusionnée G1-scFv lambda-lourd humanisée (1-715) [gamma1 anti- CD274 humanisée (1-449) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-48*02 (87.8%) -IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [8.8.12] (26-33.51-58.97-108)) (1-119)-<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120>K (216) (120-217), charnière 1-15 (218-232), CH2 N84.4>A (299) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)] -15-mer tris(tetraglycyl-séryl) linker (450-464) -scFv lambda-lourd anti-TNFRSF9 humanisé scFv-v2 C120 (VL)-C49 (VH) (465-715) [V-LAMBDA (<i>Homo sapiens</i> IGLV1-47*02 (91.8%) -IGLJ2*01 (91.8%) C120 (567), CDR-IMGT [8.3.11] (490-497.515-517.554-564)) (465-574) -20-mer tétrakis(tétraglycyl-séryl) linker (575-594) -VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-23*01 (93.9%) -IGHD) -IGHJ4*01 (100%), C49 (638) CDR-IMGT [8.8.14] (620-627.645-652.691-704)) (595-715)]; (222-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa anti-CD274 humanisée 1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-33*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, non-glycosylé immunostimulant, antinéoplasique
ragistomig	inmunoglobulina G1-scFv_L-kappa dímero, anti-[<i>Homo sapiens</i> CD274 (ligando 1 de muerte celular programada 1,PDL1, PD-L1, B7 homólogo 1, B7H1, B7-H1, PDCD1LG1)] y anti-[<i>Homo sapiens</i> TNFRSF9 (miembro 9 de la superfamilia de los receptores del TNF, 4-1BB, antígeno ILA de las células T, CD137)], anticuerpo monoclonal humanizado, biespecífico; cadena pesada fusionada G1-scFv lambda-pesada humanizada (1-715) [gamma1 anti- CD274 humanizada (1-449) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-48*02 (87.8%) -IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [8.8.12] (26-33.51-58.97-108)) (1-119)-<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120>K (216) (120-217), bisagra 1-15 (218-232), CH2 N84.4>A (299) (233-342), CH3 E12 (358), M14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)] -15-mer tris(tetraglicil-seril) enlace (450-464) -scFv lambda-pesado anti-TNFRSF9 humanizado scFv-v2 C120 (VL)-C49 (VH) (465-715) [V-LAMBDA (<i>Homo sapiens</i> IGLV1-47*02 (91.8%) -IGLJ2*01 (91.8%) C120 (567), CDR-IMGT [8.3.11] (490-497.515-517.554-564)) (465-574) -20-mer tetrakis(tetraglicil-seril) enlace (575-594) -VH (<i>Homo</i>

duplex with *all-P-ambo-2'-O-methyl-P-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-O-methyl-P-thiouridylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→2')-1-de-β-D-ribofuranosyl-1-[(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-5-methyluridylyl-(3'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyl-P-thioadenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-P-thioguanilyl-(5'→3')-2'-O-methyladenosine 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 13 synthesis reducer*


rapirosiran

tout-P-ambo-2'-O-méthyl-P-thioadénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluoroguanilyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-hydrogéno-2'-O-méthyluridylyl de [(2S,4R)-1-(1-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropyl)méthyl)-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)méthyle
 duplex avec *tout-P-ambo-2'-O-méthyl-P-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyl-P-thiouridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladenylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→2')-1-dé-β-D-ribofuranosyl-1-[(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-5-méthyluridylyl-(3'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyl-P-thioadénylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoro-P-thioguanilyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénosine réducteur de la synthèse de la 17-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase de type 13*

rapirosirán

todo-P-ambo-2'-O-metil-P-tioadenilil-(3'→5')-2'-O-metil-P-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-hidrógeno-2'-O-metiluridilato de [(2S,4R)-1-(1-[(2-acetamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]-16,16-bis({3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]pentanamido}propil)amino]-3-oxopropil)metil)-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl)-4-hidroxi-pirrolidin-2-il)métio
 dúplex con *todo-P-ambo-2'-O-metil-P-tiocitidilil-(5'→3')-2'-O-metil-P-tiouridilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→2')-1-des-β-D-ribofuranosil-1-[(2S)-2,3-dihidroxi-propil]-5-metiluridilil-(3'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metil-P-tioadenilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoro-P-tioguanilil-(5'→3')-2'-O-metiladenosina reductor de la síntesis de la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 13*

2755196-97-3




N : A, C, G, U

N : 2'-O-methyl-N / 2'-O-méthyl-N / 2'-O-metil-N

N : 2'-deoxy-2'-fluoro-N / 2'-désoxy-2'-fluoro-N / 2'-desoxi-2'-fluoro-N

- : -PO(OH)- = : -PO(SH)-

**redafamdastatum**

redafamdastat

N-(pyridazin-3-yl)-4-[(3-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methylidene]piperidine-1-carboxamide
fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor

rédafamdastat


N-(pyridazin-3-yl)-4-[(3-{[5-(trifluorométhyl)pyridin-2-yl]oxy}phényl)méthylidène]pipéridine-1-carboxamide
inhibiteur de l'hydrolase des amides d'acides gras (FAAH)

redafamdastat

N-(piridazin-3-il)-4-[(3-{[5-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}fenil)metilideno]piperidina-1-carboxamida
inhibidor de la amida hidrolasa de ácidos grasos (FAAH)

C₂₃H₂₀F₃N₅O₂

1020315-31-4

**reflocibartum #**

reflocibart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFB (vascular endothelial growth factor B)], humanized monoclonal antibody; gamma4 heavy chain humanized(1-447) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-2*06 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120)-*Homo sapiens*IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (121-218), hinge 1-12 S10>P (228) (219-230), CH2 L92 (309) (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (88.4%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (226-226":229-229")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1SV, glycoform alpha
angiogenesis inhibitor

réflocibart immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFB (facteur de croissance B de l'endothélium vasculaire)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma4 humanisée (1-447) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*06 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (121-218), charnière 1-12 S10>P (228) (219-230), CH2 L92 (309) (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (88.4%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (226-226'':229-229'')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1SV, glycoforme alfa
inhibiteur de l'angiogénèse

reflocibart inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFB (factor de crecimiento B del endotelio vascular)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma4 humanizada (1-447) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*06 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (121-218), bisagra 1-12 S10>P (228) (219-230), CH2 L92 (309) (231-340), CH3 (341-445), CHS (446-447)) (121-447)], (134-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (88.4%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (226-226'':229-229'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1SV, forma glicosilada alfa
inhibidor de la angiogénesis

2642578-92-3

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVQSGAE VKKPGASVKV SKASGYTFT GFWIHWRQA PQGLEWMGH 50
INFGNGCTNY NEKFKRRVTM TRDKSISTAY MELSLRLSDD TAVVYCARSY 100
SNVVRAMDYV QGQTLVTVSS ASTKGPSVFP LAPCSRSTSE STAALGCLVK 150
DYFPPFVTVS WNSGALTSGV HTFFPAVLQSS GLISLSSVVT VPSSSLGTRT 200
YTCNVDRHKS NTKVDKRVES KYGPPCPPCP APEFLGGPSV FLFPKPKFDT 250
LMSRTPFVTV CVVVDVSDQED PEVQFNWYVD GVEVHNNAKT PREEQFNSTY 300
RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SEIKTISKAK GQPREPQVYT 351
LPFSGEEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTTTPVLD 400
DGSFFLYSRL TVDKSRWQEG NVFSCSVME ALNHHTQKS LSLSLGK 447

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS LSASVGRVIT ITCRASQDIS NFLNWKYQKP GKAPKLLIYY 50
TSTLHSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ GKTLPPTFGG 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWVK 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSLTTL LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 261-321 367-425
22"-96" 147"-203" 261"-321" 367"-425"

Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'
23'''-88''' 134'''-194'''

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 134-214' 134"-214"

Inter-H-H (h 8, h 11) 226-226" 229-229"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutamínilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolinyl) / pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolinyl) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 297, 297"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados.

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal

H CHS K2: 447, 447"

renizgamglogenum autogedtemcelum #

renizgamglogene autogedtemcel

autologous human CD34+ hematopoietic stem/precursor cells (HSPCs), obtained from peripheral blood by leukapheresis from *plerixafor*-mobilized sickle cell disease (SCD) patients or granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) and *plerixafor*-mobilized transfusion dependent beta-thalassemia (TDT) patients, genetically modified *ex vivo* by CRISPR/Cas12a (clustered regularly interspaced palindromic repeats/modified *Acidaminococcus* sp. Cas12a) endonuclease complexed with a guide RNA (gRNA) that targets the CCAAT-box region of both gamma globin gene (HBG1 and HGB2) promoters on chromosome 11, creating indels that disrupt repressor binding and increase gamma globin expression. The editing components are introduced into the target cell population as a ribonucleoprotein complex by electroporation. The cell suspension is enriched for CD34+ cells using magnetic bead separation. Following electroporation, the cells are cultured in media containing thrombopoietin, Fms-related tyrosine kinase 3 ligand (Flt3L), and stem cell factor (SCF). The substance consists of cells with $\geq 70\%$ CD34/CD45+ purity and $\geq 70\%$ on-target editing.

cell-based gene therapy (hemoglobinopathy)

rénizgamglogène autogedtemcel

cellules souches/précurseurs hématopoïétiques humaines autologues (HSPC) CD34+, obtenues par leucaphérèse à partir de sang périphérique de patients atteints de drépanocytose, mobilisées par le *plerixafor* ou de patients atteints de bêta-thalassémie dépendante à la transfusion, mobilisées par le facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF) et le *plerixafor*, génétiquement modifiés *ex vivo* par l'endonuclease CRISPR/Cas12a (courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées/modifiée chez *Acidaminococcus* sp. Cas12a) complexée avec un ARN guide (ARNg) qui cible la région de la boîte CCAAT des deux promoteurs des gènes de la gamma-globine (HBG1 et HGB2) sur le chromosome 11, créant des indels qui perturbent la liaison du répresseur et augmentent l'expression de la gamma-globine. Les composants d'édition sont introduits dans la population cellulaire cible sous la forme d'un complexe ribonucléoprotéique par électroporation.

La suspension cellulaire est enrichie en cellules CD34+ à l'aide d'une séparation par billes magnétiques. Après l'électroporation, les cellules sont cultivées dans un milieu contenant de la thrombopoïétine, le ligand de la tyrosine kinase 3 apparentée au Fms (Flt3L) et le facteur de cellules souches (SCF). La substance est constituée de cellules avec une pureté $\geq 70\%$ CD34/CD45+ et $\geq 70\%$ d'édition sur cible.

thérapie génique à base de cellules (hémoglobinopathie)

renizgamglogén autogedtemcel

células madre/precursoras hematopoyéticas (HSPC) CD34+ humanas, autólogas, obtenidas de sangre periférica mediante leucoaféresis de pacientes con enfermedad de células falciformes previa movilización con *plerixafor* o de pacientes con beta-talasemia dependientes de transfusión previa movilización con factor estimulador de colonias de granulocitos (G-CSF) y con *plerixafor*. Las células se modifican genéticamente *ex vivo* mediante CRISPR/endonucleasa Cas12a (repeticiones palindrómicas agrupadas y espaciadas regularmente/Cas12a de *Acidaminococcus sp.* modificada) en complejo con un ARN guía (ARNg) dirigido a la región CCAAT-box de los promotores de los dos genes de la gamma globina (HBG1 y HBG2) en el cromosoma 11, creando indeles que interrumpen la unión del represor e incrementan la expresión de gamma globina. Los componentes editores se introducen en la población celular diana como complejos de ribonucleoproteína mediante electroporación. La suspensión celular se enriquece en células CD34+ usando separación por bolas magnéticas. Tras la electroporación, las células se cultivan en medio que contiene trombopoyetina, ligando de tirosina quinasa 3 similar a FMS (Flt3L) y factor de células madre (SCF). La sustancia consiste en células con una pureza de $\geq 70\%$ CD34/CD45+ y $\geq 70\%$ con edición en el sitio deseado (*on-target*).
terapia génica basada en células (hemoglobinopatía)

repicericelum
repicericel

autologous red blood cells (RBC) isolated from whole blood, with platelets removed through cell washing and white blood cells (WBCs) removed by leukoreduction filtration. The RBCs are reconstituted in media containing dimethylsulfoxide (DMSO) and loaded with antigens (synthetic long peptides (SLPs) containing HLA-A*02-restricted E6 and E7 epitopes of human papillomavirus 16 (HPV16)) and the adjuvant polyinosinic-polycytidylic acid (poly I:C), which are delivered to the RBCs by flow through microfluidic chip containing constrictions narrower than the cell that temporarily disrupts the cell membrane to allow the material to enter the cell. The final cells are at least 70% positive for glycophorin A (CD235a) and annexin V, and contain poly I:C. In co-culture with monocyte-derived dendritic cells the RBCs induce interferon gamma (IFN γ) secretion by E7 antigen-specific CD8+ T lymphocytes.
E6 SLP: QLCTELQ**TTIHDI**ECVYCKQQLL; E7 SLP: QLCTELQ**TYMLDLQ**PETTYCKQQLL
The antigenic epitopes for HPV16 are in bold.
cell therapy (antineoplastic)


répéricérel

globules rouges (GR) autologues, isolés à partir de sang total, avec les plaquettes éliminées par lavage cellulaire et les globules blancs (GB) par filtration avec déleucocytation. Les GR sont reconstitués dans un milieu contenant du diméthylsulfoxyde (DMSO) et chargés avec des antigènes (longs peptides synthétiques (SLP))

	contenant les épitopes E6 et E7 du virus humain du papillome types 16 (HPV16) restreints par HLA-A*02) et de l'adjuvant acide polyinosinique-polycytidylique (poly I:C), qui sont administrés aux GR par un flux traversant une puce microfluidique présentant des constrictions plus étroites que la cellule perturbant temporairement la membrane cellulaire pour permettre au matériel de pénétrer dans la cellule. Les cellules finales sont positives à au moins 70 % à la glycophorine A (CD235a) et l'annexine V, et contiennent du poly I:C. En co-culture avec des cellules dendritiques dérivées de monocytes, les GR induisent la sécrétion d'interféron gamma (IFNγ) par les lymphocytes T CD8+ spécifiques de l'antigène E7. E6 SLP: QLCTELQTTIIHDILECVYCKQQLL; E7 SLP: QLCTELQTYMLDLQPETTYCKQQLL Les épitopes antigéniques du HPV16 sont en caractères gras. <i>thérapie cellulaire (antineoplasique)</i>
repicericel	eritrocitos autólogos aislados de sangre total, donde se han eliminado las plaquetas mediante lavados celulares y los leucocitos mediante filtración leucorreductora. Los eritrocitos se reconstituyen en medio que contiene dimetil sulfóxido (DMSO) y se cargan con antígenos (péptidos sintéticos largos (SLP) que contienen épitopos de E6 y E7 del papillomavirus humano de tipo 16 (HPV16) restringidos por HLA-A*02) y el adyuvante ácido poliinosínico-policitidílico (poli I:C), los cuales se administran a los eritrocitos mediante flujo a través de constricciones con chips microfluidicos más estrechas que las células, lo que desorganiza temporalmente la membrana celular para permitir que el material entre en la célula. Las células finales son al menos 70% positivas para glicoforina A (CD235a) y anexina V y contienen poli I:C. En co-cultivo con células dendríticas derivadas de monocitos, los eritrocitos inducen la secreción de interferón gamma (IFNγ) en linfocitos T CD8+ específicos del antígeno E7. E6 SLP: QLCTELQTTIIHDILECVYCKQQLL; E7 SLP: QLCTELQTYMLDLQPETTYCKQQLL Los epitopos antigénicos para HPV16 están en letras en negrita. <i>terapia celular (antineoplásico)</i>
resigratinibum	
resigratinib	3-[(1-cyclopropyl-4,6-difluoro-1<i>H</i>-1,3-benzimidazol-5-yl)ethynyl]-1-[(3<i>S</i>,5<i>R</i>)-5-(methoxymethyl)-1-(prop-2-enoyl)pyrrolidin-3-yl]-5-(methyamino)-1<i>H</i>-pyrazole-4-carboxamide <i>fibroblast growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic</i>
résigratinib	3-[(1-cyclopropyl-4,6-difluoro-1<i>H</i>-1,3-benzimidazol-5-yl)éthynyl]-1-[(3<i>S</i>,5<i>R</i>)-5-(méthoxyméthyl)-1-(prop-2-énoyl)pyrrolidin-3-yl]-5-(méthylamino)-1<i>H</i>-pyrazole-4-carboxamide <i>inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes, antinéoplasique</i>
resigratinib	3-[(1-ciclopropil-4,6-difluoro-1<i>H</i>-1,3-benzimidazol-5-il)etinil]- 5-(metilamino)-1-[(3<i>S</i>,5<i>R</i>)- 5-(metoximetil)-1-(prop-2-enoil)pirrolidin-3-il]-1<i>H</i>-pirazol-4-carboxamida <i>inhibidor de la tirosina kinasa del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, antineoplásico</i>

$C_{26}H_{27}F_2N_7O_3$

2750709-91-0

**rezatapoptum**

rezatapopt

4-({3-[4-{{(3*S*,4*R*)-3-fluoro-1-methylpiperidin-4-yl}amino}-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1*H*-indol-2-yl]prop-2-yn-1-yl}amino)-3-methoxy-*N*-methylbenzamide
antineoplastic

rézatapopt


4-({3-[4-{{(3*S*,4*R*)-3-fluoro-1-méthylpipéridin-4-yl}amino)-1-(2,2,2-trifluoroéthyl)-1*H*-indol-2-yl]prop-2-yn-1-yl}amino)-3-méthoxy-*N*-méthylbenzamide
antineoplasique

rezatapopt

4-({3-[4-{{(3*S*,4*R*)-3-fluoro-1-metilpiperidin-4-il}amino)-1-(2,2,2-trifluoroetil)-1*H*-indol-2-il]prop-2-in-1-il}amino)-3-metoksi-*N*-metilbenzamida
antineoplásico

 $C_{28}H_{31}F_4N_5O_2$

2636846-41-6

**rezetamigum #**

rezetamig

immunoglobulin half G4-kappa_G4(VH-h-CH2-CH3), anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3 epsilon)] and anti-[*Homo sapiens* CD22 (sialic acid binding Ig-like lectin 2, SIGLEC2, SIGLEC-2, B-lymphocyte cell adhesion molecule, BL-CAM, Leu-14)], *Homo sapiens* monoclonal antibody, bispecific, bivalent;

gamma4 heavy chain anti-CD3E *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-9*01 (98.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10, G4v4 CH2 A1.3, A1.2, G4v32 CH3 W22 (knob) (CH1 (124-221), hinge 1-12 S10>P (231) (222-233), CH2 F1.3>A (237), L1.2>A (238), L92 (312) (234-343), CH3 T22>W (369) (344-448), CHS (449-450)) (124-450)], (137-214')-disulfide with kappa light chain anti-CD3E *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-15*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'') (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')];

- gamma4 heavy chain anti-CD22 *Homo sapiens* VH-h-CH2-CH3 (1"-347") [VH (*Homo sapiens* IGHV4-39*01 (91.9%) -(IGHD) -IGHJ1*01 W118>R (108") (85.7%), CDR-IMGT [10.7.10] (26"-35".53"-59".98"-107")) (1"-118")-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10,G4v4 CH2 A1.3, A1.2, G4v33 CH3 S22, A24, V86 (hole) (hinge 1-12 S10>P (128")) (119"-130"), CH2 F1.3>A (134"), L1.2>A (135"), L92 (209") (131"-240"), CH3 T22>S (266"), L24>A (268"), Y86>V (307") (241"-345"), CHS (346"-347")) (119"-347"); dimer (229-126":232-129")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa
antineoplastic
- rézétamig immunoglobuline demi G4-kappa)_G4(VH-h-CH2-CH3), anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3 epsilon)] et anti-[*Homo sapiens* CD22 (Ig-like lectine 2 liant l'acide sialique, SIGLEC2, SIGLEC-2, molécule d'adhésion cellulaire du lymphocyte B, BL-CAM, Leu-14)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*, bispécifique, bivalent; chaîne lourde gamma4 anti-CD3E *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-9*01 (98.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10,G4v4 CH2 A1.3, A1.2,G4v32 CH3 W22 (knob) (CH1 (124-221), charnière 1-12 S10>P (231) (222-233), CH2 F1.3>A (237), L1.2>A (238), L92 (312) (234-343), CH3 T22>W (369) (344-448), CHS (449-450)) (124-450)], (137-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa anti-CD3E *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-15*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; chaîne lourde gamma4 anti-CD22 *Homo sapiens* VH-h-CH2-CH3 (1"-347") [VH (*Homo sapiens* IGHV4-39*01 (91.9%) -(IGHD) -IGHJ1*01 W118>R (108") (85.7%), CDR-IMGT [10.7.10] (26"-35".53"-59".98"-107")) (1"-118")-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10,G4v4 CH2 A1.3, A1.2, G4v33 CH3 S22, A24, V86 (hole) (charnière 1-12 S10>P (128")) (119"-130"), CH2 F1.3>A (134"), L1.2>A (135"), L92 (209") (131"-240"), CH3 T22>S (266"), L24>A (268"), Y86>V (307") (241"-345"), CHS (346"-347")) (119"-347"); dimère (229-126":232-129")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa
antineoplasique
- rezetamig inmunoglobulina demi G4-kappa)_G4(VH-h-CH2-CH3), anti-[*Homo sapiens* CD3E (CD3 épsilon)] y anti-[*Homo sapiens* CD22 (lectina 2 similar a la Ig que se une al ácido siálico, SIGLEC2, SIGLEC-2, molécula de adhesión celular del linfocito B, BL-CAM, Leu-14)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*, biespecífico, bivalente; cadena pesada gamma4 anti-CD3E *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-9*01 (98.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10,G4v4 CH2 A1.3, A1.2,G4v32 CH3 W22 (knob) (CH1 (124-221), bisagra 1-12 S10>P (231) (222-233), CH2 F1.3>A (237), L1.2>A (238), L92 (312) (234-343), CH3 T22>W (369) (344-448), CHS (449-450)) (124-450)], (137-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa anti-CD3E *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-15*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; cadena pesada gamma4 anti-CD22 *Homo sapiens* VH-h-CH2-CH3 (1"-347") [VH (*Homo sapiens* IGHV4-39*01 (91.9%) -(IGHD) -IGHJ1*01 W118>R (108") (85.7%), CDR-IMGT [10.7.10] (26"-35".53"-59".98"-107")) (1"-118")-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10,G4v4 CH2 A1.3, A1.2, G4v33 CH3 S22, A24, V86 (hole) (bisagra 1-12 S10>P (128")) (119"-130"), CH2 F1.3>A (134"), L1.2>A (135"), L92 (209") (131"-240"), CH3 T22>S (266"), L24>A (268"), Y86>V (307") (241"-345"), CHS (346"-347")) (119"-347"); dímero (229-126":232-129")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), forma glicosilada alfa
antineoplásico

2795115-07-8

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-CD3 G4 (H)
 EVQLVESGGG LVQPGRSLRL SCAASGFTFH NYAMHWVRQA PGKGLEWVSG 50
 ISWNSGSIY ADSVKGRFTI SRDNAKNSLY LQMNSLRAED TALYYCAKDS 100
 RGYGDYSLGG AYWGGQGLVT VSSASTKGPS VFPLAPCSRS TSESTAALGC 150
 LVKDYFPEPV TVSWNSGALT SGVHTFPAVL QSSGLYSLSL VVTVPSSSLG 200
 TKTYTCNVDH KPSNTKVDKR VESKYGPPCP PCPAPEAAGG PSVFLFPPKP 250
 KDTLMISRTF EVTCVVVDVS QEDPEVQFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQFN 300
 STYRVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKG LPSSIETIS KAKGQPREPQ 350
 VYTLPPSQEE MTKNQVSLWC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTPPV 400
 LDSDSGFFLY SRLTVDKSRW QEGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSLGK 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera: anti-CD3 L-kappa (L)
 EIVMTQSPAT LSVSPGERAT LSCRASQSVS SNLAWYQQKQ GPAPRLLIYG 50
 ASTRATGIPA RFSGSGSGTE FTLTISLQES EDFAVYYCQ YNNWPWFQ 100
 GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEC 214

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-CD22 G4(VH-h-CH2-CH3) (H")
 QLQLQESGPG LVKPSETLSL TCTVSGDSIS SGDYYWGWR QPPGKLEWI 50
 GHIIYSGATY YNPSLENRVT ISVDTSKNQF SLKLSSVTA DTAVYYCTRD 100
 DSSNWRSRGQ GTLTVSSES KYGPPCPPCP APEAAGGPSV FLFPPKPKDT 150
 LMTSRTPEVT CVVVDVSDQED PEVQFNWYVD GVEVHNAKT PREEQFNSTY 200
 RVVSVLTVLH QDWLNGKEYK CKVSNKGLPS SIEKTISKAK GQPREPQVYT 250
 LPPSQEEMTK NQVSLSCAVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLDL 300
 DGSFFLVSR LTVDKSRWQEG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSLGK 347

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 150-206 264-324 370-428
 22"-97" no CH1 161"-221" 267"-325"

Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 137-214'

Inter-H-H (h 8, h 11) 229-126" 232-129"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprolyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxoprolyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
 VH Q1: I"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
 H CH2 N84.4: 300, 197"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
 H CHS K2: 450, 347"

rezorstobartum #
 rezorstobart

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* KLRB1 (killer cell lectin like receptor B1, NKR-P1A, natural killer cell surface protein P1A, CLEC5B, CD161)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (96.9%) -IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%), Q120>R (113), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 K120 (218) (122-219), hinge 1-15 (220-234), CH2 G1v29 CH2 N84.4>A (301) (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS K2>del (450)) (122-450)], (224-214')-disulfide with kappa light chain *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-12*01 (94.7%) -IGKJ4*01 (91.7%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1 lacking the glutamine synthetase (GS-KO) gene, non-glycosylated *immunostimulant, antineoplastic*

rézorstobart immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* KLRB1 (récepteur B1 lectine like des cellules tueuses, NKR-P1A, protéine de surface P1A des cellules tueuses naturelles, CD161)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*; chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (96.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%), Q120>R (113), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 K120 (218) (122-219), charnière 1-15 (220-234), CH2 G1v29 CH2 N84.4>A (301) (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS K2>del (450)) (122-450)], (224-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (94.7%) -IGKJ4*01 (91.7%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1 ne présentant pas le gène de la glutamine synthétase (GS-KO), non-glycosylé
immunostimulant, antinéoplasique

rezorstobart inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* KLRB1 (receptor B1 de tipo lectina de las células asesinas, NKR-P1A, proteína de superficie P1A de las células asesinas naturales, CD161)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*; cadena pesada gamma1 *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-23*01 (96.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%), Q120>R (113), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 K120 (218) (122-219), bisagra 1-15 (220-234), CH2 G1v29 CH2 N84.4>A (301) (235-344), CH3 D12 (360), L14 (362) (345-449), CHS K2>del (450)) (122-450)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-12*01 (94.7%) -IGKJ4*01 (91.7%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1 en ausencia del gen glutamina sintetasa (GS-KO), no glicosilado
inmunostimulante, antineoplásico

2762201-86-3

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
EVQLLESGGG LVQPGGSLRL SCAASGFTFS PYAMSWVRQA PGKLEWVSA 50
ISASGGTTY ADSVKGRFTI SRDNSKNTLY LQMNSLRAED TAVYYCAKPL 100
DSFVWADFDL WGRGTLTVTS SASTKGPSVF PLAPSKKSTS GGTAALGCLV 150
KYFFPEPFTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSVV TVPSSSLGTPK 200
TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PFCPAPELLG GPSVFLFPPK 250
PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
ASTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP 350
QVYTLPPSRD ELTRNQLSLT CLVKGFIYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP 400
VLDSGGSFPL YSKLTVDKSR WQGGNVFSCS VMHEALHNHY TQKLSLSLSPG 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQLTQSPSS VSASVGDRTV ITCRASQGIS SWLAWYQQPK GKAPKLLIYA 50
ASSLQSGVPS RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFATYYCQQ HSVLPITFGG 100
GTKVEIKRVT AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22°-96' 148"-204' 265"-325' 371"-429"
22°-96" 148"-204' 265"-325" 371"-429"
Intra-L (C23-C104) 23°-88' 134"-194'
23°-88" 134"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 224°-214' 224°-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 230°-230" 233°-233"

No N-glycosylation sites / pas de sites de N-glycosylation / ninguna posición de N-glycosilación
H CH2 N84.4>A (G1v29): 301, 301"

ribrecabtagenium autoleucelum #

ribrecabtagene autoleucel autologous T lymphocytes obtained from peripheral blood by leukapheresis, transduced with a self-inactivating, non-replicating lentiviral vector encoding a chimeric antigen receptor (CAR) targeting the B-cell maturation antigen (BCMA). The expressed transgene comprises a CD8 α leader sequence, an anti-BCMA humanized camelid single domain antibody (V_{HH}), a CD8 α hinge and transmembrane domain, and a 4-1BB co-stimulatory domain and CD3 ζ signalling domain, under control of the human elongation factor 1 (EF-1) promoter. The construct is flanked by 5' and 3' long terminal repeats (LTRs) and also contains a ψ packaging signal, a Rev response element (RRE), a central polypurine tract (cPPT) sequence and a Woodchuck hepatitis virus posttranscriptional regulatory element (WPRE). The vector is pseudotyped with vesicular stomatitis virus (VSV) G glycoprotein. The leukapheresis material is enriched for CD3+ T lymphocytes by positive immunoselection. The lymphocytes are then activated by culture in bags coated with anti-CD3 antibody and recombinant human fibronectin fragment, followed by transduction with the lentiviral vector. The cells are further culture-expanded in growth media containing interleukin 2 (IL-2) and inactivated autologous plasma. The cell suspension consists of T lymphocytes (>95%), with greater than 10% of the T lymphocytes expressing the CAR-BCMA transgene. The transduced T lymphocytes demonstrate cytotoxicity against BCMA-expressing cells (>20%)
cell-based gene therapy (antineoplastic)

ribrecabtagène autoleucel lymphocytes T autologues obtenus par leucaphérèse à partir de sang périphérique, transduits avec un vecteur lentiviral auto-inactivant et non répliquant codant un récepteur antigénique chimérique (CAR) ciblant l'antigène de maturation des cellules B (BCMA). Le transgène exprimé comprend une séquence de tête CD8 α , un anticorps de camélidés humanisé à domaine unique anti-BCMA (V_{HH}), une charnière CD8 α et un domaine transmembranaire, ainsi qu'un domaine de co-stimulation 4-1BB et un domaine de signalisation CD3 ζ , sous le contrôle du promoteur du facteur d'élongation 1 (EF-1) humain. La construction est flanquée de répétitions terminales longues (LTR) en 5' et 3' et contient également un signal d'encapsulation ψ , un élément de réponse Rev (RRE), une séquence du tractus polypurine central (cPPT) et un élément de régulation post-transcriptionnelle du virus de l'hépatite de la marmotte (WPRE). Le vecteur est pseudotypé avec la glycoprotéine G du virus de la stomatite vésiculaire (VSV). Le matériel de leucaphérèse est enrichi en lymphocytes T CD3+ par immunosélection positive. Les lymphocytes sont ensuite activés par culture dans des sacs enduits d'anticorps anti-CD3 et d'un fragment de fibronectine humaine recombinante, puis transduits avec le vecteur lentiviral. Les cellules sont ensuite multipliées dans un milieu de croissance contenant de l'interleukine 2 (IL-2) et du plasma autologue inactivé. La suspension cellulaire est constituée de lymphocytes T (>95%), dont plus de 10% expriment le transgène CAR-BCMA. Les lymphocytes T transduits présentent une cytotoxicité contre les cellules exprimant le BCMA (>20%)
thérapie génique à base de cellules (antinéoplasique)

ribrecabtagén autoleucel

linfocitos T autólogos obtenidos de sangre periférica mediante leucoaféresis, transducidos con un vector lentiviral auto inactivante, no replicativo, que codifica para un receptor de antígenos quimérico (CAR) dirigido al antígeno de maduración de linfocitos B (BCMA). El transgén expresado contiene una secuencia líder de CD8 α , un anticuerpo de dominio único (V_{HH}) humanizado de camélido anti-BCMA, un dominio bisagra y transmembrana de CD8 α , y un dominio co-estimulador de 4-1BB y un dominio de señalización de CD3 ζ , bajo el control del promotor del factor de elongación 1 (EF-1) humano. El constructo está flanqueado por repeticiones terminales largas (LTRs) en 5' y 3' y también contiene una señal de empaquetamiento ψ , un elemento de respuesta Rev (RRE), una secuencia de tracto de polipurina central (cPPT), y un elemento regulador post-transcripcional del virus de la hepatitis de la marmota (WPRE). El vector está pseudotipado con la glicoproteína G del virus de la estomatitis vesicular (VSV).

El material de leucoaféresis se enriquece para linfocitos T CD3+ mediante inmunoselección positiva. Los linfocitos se activan después mediante cultivo en bolsas forradas con anticuerpo anti-CD3 y fragmento de fibronectina humana recombinante, seguido de transducción con el vector lentiviral. Las células se expanden más en medio de crecimiento que contiene interleuquina 2 (IL-2) y plasma autólogo inactivado. La suspensión celular consiste en linfocitos T ($\geq 95\%$), con más del 10% de los linfocitos T que expresan el transgén de CAR-BCMA. Los linfocitos T transducidos demuestran citotoxicidad contra células que expresan BCMA ($>20\%$).
terapia génica basada en células (antineoplásico)

risevistinelum

risevistinel

(2S,3R)-3-hydroxy-2-[(4S)-5-(2-methylpropanoyl)-1-oxo-2,5-diazaspiro[3.4]octan-2-yl]butanamide
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor positive allosteric modulator

risévistinel


(2S,3R)-3-hydroxy-2-[(4S)-5-(2-méthylpropanoyl)-1-oxo-2,5-diazaspiro[3.4]octan-2-yl]butanamide
modulateur allostérique positif du récepteur du N-méthyl-D-aspartate (NMDA)

risevistinel

(2S,3R)-3-hidroxi-2-[(4S)-5-(2-metilpropanoil)-1-oxo-2,5-diazaespiro[3.4]octan-2-il]butanamida
modulador alostérico positivo del receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA)

C₁₄H₂₃N₃O₄

2591344-26-0



rocbrutinibum

rocbrutinib

N-[[6²*S*]-2³-(hydroxymethyl)-1⁷,1⁷,3⁴,6²-tetraméthyl-1¹,3⁵-dioxo-1¹,1³,1⁴,1⁶,1⁷,1⁸,3⁴,3⁵-octahydro-4-aza-1(2)-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-*a*]pyrazina-3(2,6)-pyrazina-6(1,4)-piperazina-2(2,4)-pyridina-7(4)-oxana-5(1,4)-benzenaheptaphan-5³-yl]prop-2-enamide
Bruton's tyrosine kinase inhibitor, antineoplastic

rocbrutinib


N-[[6²*S*]-2³-(hydroxyméthyl)-1⁷,1⁷,3⁴,6²-tétraméthyl-1¹,3⁵-dioxo-1¹,1³,1⁴,1⁶,1⁷,1⁸,3⁴,3⁵-octahydro-4-aza-1(2)-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-*a*]pyrazina-3(2,6)-pyrazina-6(1,4)-pipérazina-2(2,4)-pyridina-7(4)-oxana-5(1,4)-benzénaheptaphan-5³-yl]prop-2-énamide
inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton, antinéoplasique

rocbrutinib

N-[[6²*S*]-2³-(hidroximetil)-1⁷,1⁷,3⁴,6²-tetrametil-1¹,3⁵-dioxo-1¹,1³,1⁴,1⁶,1⁷,1⁸,3⁴,3⁵-octahidro-4-aza-1(2)-ciclopenta[4,5]pirolo[1,2-*a*]pirazina-3(2,6)-pirazina-6(1,4)-piperazina-2(2,4)-piridina-7(4)-oxana-5(1,4)-bencenaheptafan-5³-il]prop-2-enamida
inhibidor de la tirosina kinasa de Bruton, antineoplásico

C₄₂H₅₁N₉O₅

2485861-07-0

**roconkibartum #**

roconkibart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL17A (interleukin 17A, IL-17A)], monoclonal antibody;
 gamma4 heavy chain (1-444) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*02 (85.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.10] (26-33.51-58.97-106)) (1-117)-*Homo sapiens* IGHG4*01, *nG4m(a)* CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (118-215), hinge 1-12 S10>P (225) (216-227), CH2 L92 (306) (228-337), CH3 (338-442), CHS (443-444)) (118-444)], (131-219')-disulfide with kappa light chain (1'-219') [V-KAPPA Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGKV1-110*01 (92.0%) -IGKJ2*03 (91.7%) S120>Q (105)/*Homo sapiens* IGKV2-30*02 (88.0%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [11.3.9] (27-37.55-57.94-102)) (1'-112') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimer (223-223":226-226")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, glycoform alfa
immunomodulator, anti-inflammatory

roconkibart

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* IL17A (interleukine 17A, IL-17A)], anticorps monoclonal;
 chaîne lourde gamma4 (1-444) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-2*02 (85.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.10] (26-33.51-58.97-106)) (1-117)-*Homo sapiens* IGHG4*01, *nG4m(a)* CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (118-215), charnière 1-12 S10>P (225) (216-227), CH2 L92 (306) (228-337), CH3 (338-442), CHS (443-444)) (118-444)], (131-219')-disulfure avec la chaîne légère kappa

	(1'-219') [V-KAPPA Musmus/Homsap (<i>Mus musculus</i> IGKV1-110*01 (92.0%) -IGKJ2*03 (91.7%) S120>Q (105)/ <i>Homo sapiens</i> IGKV2-30*02 (88.0%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [11.3.9] (27-37.55-57.94-102)) (1'-112') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dimère (223-223":226-226")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa																																																																																																																		
	<i>immunomodulateur, anti-inflammatoire</i>																																																																																																																		
roconkibart	immunoglobulina G4-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> IL17A (interleukina 17A, IL-17A)], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma4 (1-444) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV1-2*02 (85.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.10] (26-33.51-58.97-106)) (1-117)- <i>Homo sapiens</i> IGHG4*01, <i>nG4m(a)</i> CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (118-215), bisagra 1-12 S10>P (225) (216-227), CH2 L92 (306) (228-337), CH3 (338-442), CHS (443-444)) (118-444)], (131-219')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-219') [V-KAPPA Musmus/Homsap (<i>Mus musculus</i> IGKV1-110*01 (92.0%) -IGKJ2*03 (91.7%) S120>Q (105)/ <i>Homo sapiens</i> IGKV2-30*02 (88.0%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [11.3.9] (27-37.55-57.94-102)) (1'-112') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (158), V101 (196) (113'-219')]; dímero (223-223":226-226")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, forma glicosilada alfa																																																																																																																		
	<i>immunomodulador, antiinflamatorio</i>																																																																																																																		
	2638480-59-6																																																																																																																		
	Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada <table><tr><td>QVQLVQSGAE</td><td>VKKPGASVKV</td><td>SCRASGYIFT</td><td>NYGMNMRQA</td><td>PGQGLEWMGW</td><td>50</td></tr><tr><td>INDHTGEPTY</td><td>ADKFQGRVTF</td><td>TLDTISISTAY</td><td>MELSLRLSDD</td><td>TAVYYCANYG</td><td>100</td></tr><tr><td>FGYFDYWGQG</td><td>TLTVSSAST</td><td>KGPSVFPLAP</td><td>CSRSTSESTA</td><td>ALGCLVKDYF</td><td>150</td></tr><tr><td>PEPVTVSWNS</td><td>GALTSGVHTF</td><td>PAVLQSSGLY</td><td>SLSSVTVTPS</td><td>SSLGKTKYTC</td><td>200</td></tr><tr><td>NVDHKPSNTK</td><td>VDKRVESKYG</td><td>PPCPPCPAPE</td><td>FLGGPSVFLF</td><td>PPKPKDTLMI</td><td>250</td></tr><tr><td>SRTPEVTCVV</td><td>VDVSQEDPEV</td><td>QFNWYVDGVE</td><td>VHNAKTKPRE</td><td>EQFNSTYRVV</td><td>300</td></tr><tr><td>SVLTIVLHQDW</td><td>LNGKEYCKKV</td><td>SNKGLPSSIE</td><td>KTISKAKGQP</td><td>REPQVYTLPP</td><td>350</td></tr><tr><td>SQEEMTKNQV</td><td>SLTCLVKGEY</td><td>PSDIAVEWES</td><td>NGQPENNYKT</td><td>TPPVLDSDGS</td><td>400</td></tr><tr><td>FFLYSRLTVD</td><td>KSRWQEGNVF</td><td>SCSVMHEALH</td><td>NHYTQKLSLS</td><td>SLGK</td><td>444</td></tr></table> Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera <table><tr><td>DVVTQSPLS</td><td>LPVTLGQPAS</td><td>ISCRSSQSLV</td><td>HSNGNSYLHW</td><td>YLQKPGQSPQ</td><td>50</td></tr><tr><td>LLIYKVSNRF</td><td>SGVPDRFSGS</td><td>GSSTDFTLKI</td><td>SRVEAEVGV</td><td>YYCSQSTHPV</td><td>100</td></tr><tr><td>YTFGGQTKLE</td><td>IKRTVAAPSV</td><td>FIFPPSDEQL</td><td>KSGTASVCL</td><td>LNNFYPREAK</td><td>150</td></tr><tr><td>VQWKVDNALQ</td><td>SGNSQESVTE</td><td>QDSKDSITYSL</td><td>SSTLTLSKAD</td><td>YEKHKVYACE</td><td>200</td></tr><tr><td>VTHQGLSSPV</td><td>TKSFNRGEC</td><td></td><td></td><td></td><td>219</td></tr></table> Post-translational modifications Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro <table><tr><td>Intra-H (C23-C104)</td><td>22-96</td><td>144-200</td><td>258-318</td><td>364-422</td></tr><tr><td></td><td>22"-96"</td><td>144"-200"</td><td>258"-318"</td><td>364"-422"</td></tr><tr><td>Intra-L (C23-C104)</td><td>23'-93'</td><td>139"-199'</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>23"-93"</td><td>139"-199"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inter-H-L (CH1 10-CL 126)</td><td>131-219'</td><td>131"-219"</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Inter-H-H (h 8, h 11)</td><td>223-223"</td><td>226-226"</td><td></td><td></td></tr></table> N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxoprollyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxoprollyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo) H VH Q1: 1, 1" N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación H CH2 N84.4: 294, 294" Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycans de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaríos complejos fucosilados. C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal H CHS K2: 444, 444"	QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCRASGYIFT	NYGMNMRQA	PGQGLEWMGW	50	INDHTGEPTY	ADKFQGRVTF	TLDTISISTAY	MELSLRLSDD	TAVYYCANYG	100	FGYFDYWGQG	TLTVSSAST	KGPSVFPLAP	CSRSTSESTA	ALGCLVKDYF	150	PEPVTVSWNS	GALTSGVHTF	PAVLQSSGLY	SLSSVTVTPS	SSLGKTKYTC	200	NVDHKPSNTK	VDKRVESKYG	PPCPPCPAPE	FLGGPSVFLF	PPKPKDTLMI	250	SRTPEVTCVV	VDVSQEDPEV	QFNWYVDGVE	VHNAKTKPRE	EQFNSTYRVV	300	SVLTIVLHQDW	LNGKEYCKKV	SNKGLPSSIE	KTISKAKGQP	REPQVYTLPP	350	SQEEMTKNQV	SLTCLVKGEY	PSDIAVEWES	NGQPENNYKT	TPPVLDSDGS	400	FFLYSRLTVD	KSRWQEGNVF	SCSVMHEALH	NHYTQKLSLS	SLGK	444	DVVTQSPLS	LPVTLGQPAS	ISCRSSQSLV	HSNGNSYLHW	YLQKPGQSPQ	50	LLIYKVSNRF	SGVPDRFSGS	GSSTDFTLKI	SRVEAEVGV	YYCSQSTHPV	100	YTFGGQTKLE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVCL	LNNFYPREAK	150	VQWKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDSITYSL	SSTLTLSKAD	YEKHKVYACE	200	VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC				219	Intra-H (C23-C104)	22-96	144-200	258-318	364-422		22"-96"	144"-200"	258"-318"	364"-422"	Intra-L (C23-C104)	23'-93'	139"-199'				23"-93"	139"-199"			Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	131-219'	131"-219"			Inter-H-H (h 8, h 11)	223-223"	226-226"		
QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCRASGYIFT	NYGMNMRQA	PGQGLEWMGW	50																																																																																																														
INDHTGEPTY	ADKFQGRVTF	TLDTISISTAY	MELSLRLSDD	TAVYYCANYG	100																																																																																																														
FGYFDYWGQG	TLTVSSAST	KGPSVFPLAP	CSRSTSESTA	ALGCLVKDYF	150																																																																																																														
PEPVTVSWNS	GALTSGVHTF	PAVLQSSGLY	SLSSVTVTPS	SSLGKTKYTC	200																																																																																																														
NVDHKPSNTK	VDKRVESKYG	PPCPPCPAPE	FLGGPSVFLF	PPKPKDTLMI	250																																																																																																														
SRTPEVTCVV	VDVSQEDPEV	QFNWYVDGVE	VHNAKTKPRE	EQFNSTYRVV	300																																																																																																														
SVLTIVLHQDW	LNGKEYCKKV	SNKGLPSSIE	KTISKAKGQP	REPQVYTLPP	350																																																																																																														
SQEEMTKNQV	SLTCLVKGEY	PSDIAVEWES	NGQPENNYKT	TPPVLDSDGS	400																																																																																																														
FFLYSRLTVD	KSRWQEGNVF	SCSVMHEALH	NHYTQKLSLS	SLGK	444																																																																																																														
DVVTQSPLS	LPVTLGQPAS	ISCRSSQSLV	HSNGNSYLHW	YLQKPGQSPQ	50																																																																																																														
LLIYKVSNRF	SGVPDRFSGS	GSSTDFTLKI	SRVEAEVGV	YYCSQSTHPV	100																																																																																																														
YTFGGQTKLE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVCL	LNNFYPREAK	150																																																																																																														
VQWKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDSITYSL	SSTLTLSKAD	YEKHKVYACE	200																																																																																																														
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC				219																																																																																																														
Intra-H (C23-C104)	22-96	144-200	258-318	364-422																																																																																																															
	22"-96"	144"-200"	258"-318"	364"-422"																																																																																																															
Intra-L (C23-C104)	23'-93'	139"-199'																																																																																																																	
	23"-93"	139"-199"																																																																																																																	
Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	131-219'	131"-219"																																																																																																																	
Inter-H-H (h 8, h 11)	223-223"	226-226"																																																																																																																	
roginolisibum																																																																																																																			
roginolisib	6-fluoro-3-(morpholine-4-carbonyl)-1-{4-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}-1,4-dihydro-5H-5λ ⁶ -[1]benzothiopyrano[4,3-c]pyrazole-5,5-dione <i>phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitor, antineoplastic</i>																																																																																																																		

roginolisib


6-fluoro-3-(morpholine-4-carbonyl)-1-{4-[(morpholin-4-yl)méthyl]phényl}-1,4-dihydro-5*H*-5λ⁶-[1]benzothiopyrano[4,3-*c*]pyrazole-5,5-dione
inhibiteur de phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K), antinéoplasique

roginolisib

6-fluoro-3-(morfolina-4-carbonil)-1-{4-[(morfolin-4-il)metil]fenil}-1,4-dihidro-5*H*-5λ⁶-[1]benzotiopirano[4,3-*c*]pirazol-5,5-diona
inhibidor de fosfatidilinositol 3-kinasa (PI3K), antineoplásico

C₂₆H₂₇FN₄O₅S

1305267-37-1

**sacituzumab tirumotecanum #**

sacituzumab tirumotecan

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TACSTD2 (tumor-associated calcium signal transducer 2, membrane component chromosome 1 surface marker 1, M1S1, gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331, pancreatic carcinoma marker protein GA733-1, epithelial glycoprotein-1, EGP-1, trophoblast antigen-2, cell surface glycoprotein Trop-2, TROP2)], humanized monoclonal antibody; conjugated to the topoisomerase I inhibitor *tirumotecan*;
 gamma1 heavy chain humanized (1-451) [VH (*Homo sapiens*IGHV7-4-1*02 (85.70%) -(IGHD)-IGHJ4*01 (86.7%) T122>S (115), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121) - *Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1CH1 R120, CH3 E12, M14 (CH1 R120 (218) (122-219), hinge (220-234), CH2 (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')- disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*01 (82.2%) -IGKJ4*01 (91.7%) G120>A (100), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-S, glycoform alfa; substituted at the sulfur atoms of eight L-cysteiny residues with 5-(6-[[1-((34S)-38-amino-34-[[4-[[(((4S)-4-ethyl-11-{2-[*N*-(propan-2-yl)methanesulfonamido]ethyl)-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolin-4-yl]oxy}carbonyl]oxy)methyl]phenyl]carbamoyl]-28,32-dioxo-3,6,9,12,15,18,21,24,30-nonaaoxa-27,33-diazaoctatriacontan-1-yl)-1*H*-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amino]-6-oxohex-1-yn-1-yl]pyrimidin-2-yl (*tirumotecan*) groups
antineoplastic

sacituzumab tirumotécán	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> TACSTD2 (transducteur 2 de signaux calciques associé aux tumeurs, composant membranaire du chromosome 1 marqueur de surface 1, M1S1, antigène GA7331 associé aux tumeurs gastrointestinales, protéine GA733-1 marqueur de carcinomes pancréatiques, glycoprotéine épithéliale 1, EGP-1, antigène 2 du trophoblaste, glycoprotéine Trop-2 à la surface des cellules, TROP2)], anticorps monoclonal humanisé; conjugué à l'inhibiteur de la topoisomérase I <i>tirumotécán</i>; chaîne lourde gamma1 humanisée (1-451) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV7-4-1*02 (85.70%) -(IGHD)- IGHJ4*01 (86.7) T122>S (115), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3, nG1m1CH1 R120, CH3 E12, M14 (CH1 R120 (218) (122-219), charnière (220-234), CH2 (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-9*01 (82.2%) - IGKJ4*01 (91.7%) G120>A (100), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-S, glycoforme alfa; substitué sur les atomes de soufre de huit résidus L-cystéinyl avec un groupe 5-(6-[[1-((34S)-38-amino-34-[[4-[[[[[(4S)-4-éthyl-11-{2-[N-(propan-2-yl)méthanesulfonamido]éthyl]-3,14-dioxo-3,4,12,14-tétrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoléin-4-yl]oxy}carbonyl]oxy]méthyl]phényl]carbamoil]-28,32-dioxo-3,6,9,12,15,18,21,24,30-nonaoxa-27,33-diazaoctatriacontan-1-yl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl)méthyl]amino]-6-oxohex-1-yn-1-yl)pyrimidin-2-yle (<i>tirumotécán</i>) antinéoplasique
sacituzumab tirumotecán	immunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> TACSTD2 (transductor 2 de señales cálcicas asociadas a los tumores, componente de la membrana del cromosoma 1 marcador de superficie 1, M1S1, antígeno GA7331 asociado a los tumores gastrointestinales, proteína GA733-1 marcador de carcinomas pancreáticos, glicoproteína epitelial 1, EGP-1, antígeno 2 del trofoblasto, glicoproteína Trop-2 en la superficie de las células, TROP2)], anticuerpo monoclonal humanizado; conjugado al inhibidor de la topoisomerasa I <i>tirumotecán</i>; cadena pesada gamma1 humanizada (1-451) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV7-4-1*02 (85.70%) -(IGHD)- IGHJ4*01 (86.7) T122>S (115), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03, G1m3, nG1m1CH1 R120, CH3 E12, M14 (CH1 R120 (218) (122-219), bisagra (220-234), CH2 (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-9*01 (82.2%) - IGKJ4*01 (91.7%) G120>A (100), CDR-IMGT[6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01, Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-S, forma glicosilada alfa; substituido sobre los átomos de azufre de ocho residuos L-cisteinil con grupo 5-(6-[[1-((34S)-38-amino-34-[[4-[[[[[(4S)-4-etil-11-{2-[N-(propan-2-il)metanosulfonamido]etil]-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolein-4-il]oxi]carbonil]oxi]metil]fenil]carbamoil]-28,32-dioxo-3,6,9,12,15,18,21,24,30-nonaoxa-27,33-diazaoctatriacontan-1-il]-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil]amino]-6-oxohex-1-in-1-il]pirimidin-2-ilo (<i>tirumotecán</i>) antineoplásico

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLQQSGSE LKKPGASVKV SCKASGYTFT NYGMNWKQA PGQGLKWMGW 50
 INTYTGPTY TDDFKGRFAF SLDTSVSTAY LQISSLKADD TAVYFCARGG 100
 FGSSYWYFDV WQGQSLVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV 150
 KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TVPSSSLGTQ 200
 TYICNVNHKP SNTKVDKRVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK 250
 PKDTLMISRT PEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
 NSTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQPREP 350
 QVYTLPPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTTTP 400
 VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG 450
 K 451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQLTQSPSS LSASVGDVRV ITCKASQDVS IAWAWYQQKP GKAPKLLIYS 50
 ASYRYTGVPD RFSGSGSGTD FTLTISSLQP EDFAVIYCQQ HYITPLTFGA 100
 GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQKWV 150
 DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSLSLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG 200
 LSSPVTKSFN RGEC 214

Post-translational modifications

Intra-H (C23-C104) 22-96 148-204 265-325 371-429
 22"-96" 148"-204" 265"-325" 371'-429"
 Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'
 23'''-88''' 134'''-194'''

Inter-H-L* (h 5-CL 126) 224-214' 224"-214"

Inter-H-H* (h 11, h 14) 230-230' 233-233"

*The four inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 8 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker.

*Les quatre ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 8 cystéinyl en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif.

*Faltan los cuatro puentes disulfuro inter-catenarios, una media de 8 cisteinil está conjugada a conectores de principio activo.

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamide (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)

H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación


H CH2 N84.4: 301, 301"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal

H CHS K2: 451, 451"

Potential modified residues / Résidus modifiés potentiels / Restos modificados potenciales*
 C (224,230,233,214',224",230',233",214")



seniprutugum #

seniprutug

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TRBV9 (T cell receptor beta locus variable 9 gene)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain humanized (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV7-4-1*02 (87.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.15] (26-33.51-58.97-111)) (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (219) (123-220), hinge 1-15 (221-235), CH2 (236-345), CH3 E12 (361), M14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (84.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (231-231":234-234")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-S, glycoform alfa
immunosuppressant

séniprutug

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TRBV9 (gène variable 9 du locus bêta du récepteur des cellules T)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 humanisée (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV7-4-1*02 (87.8%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.15] (26-33.51-58.97-111)) (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (219) (123-220), charnière 1-15 (221-235), CH2 (236-345), CH3 E12 (361), M14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (84.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (231-231":234-234")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-S, glycoforme alfa
immunosuppresseur

seniprutug

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* TRBV9 (gen variable 9 del lugar beta del receptor de las células T)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 humanizada (1-452) [VH (*Homo sapiens* IGHV7-4-1*02 (87.8%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.15] (26-33.51-58.97-111)) (1-122) -*Homo sapiens* IGHG1*03 (100%), G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (219) (123-220), bisagra 1-15 (221-235), CH2 (236-345), CH3 E12 (361), M14 (363) (346-450), CHS (451-452)) (123-452)], (225-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada(1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (84.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (231-231":234-234")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-S, forma glicosilada alfa
immunosupresor

2484772-72-5

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVQSGSE LKPGESVKV SCKASGYTFT DYLVHWVRQA PGQGLEWMGW 50
INTYTGTPTY ADFFEGRFVF SLDTSVSTAN LQISSLKAED TAVYFCARSW 100
RRGLRGIGFD YWQGTLTVTV SSASTKGFSV FFLAPSSKST SGGTAALGCL 150
VKDYFPEPVT VSWNSGALTS GVHTFPAVLQ SSGLYSLSSV VTFPSSSLGT 200
QTYICNVNHK PSNTKVDKRV EPKSCDKTHT CPPCPAPELL GGPSVFLFPP 250
KPKDTLMISR TPEVTCVVVD VSHEDPEVKF NWYVDGVEVH NAKTKPREEQ 300
YNSTYRVVSV LTVLHQDWLN GKEYKCKVSN KALPAPIEK ISKAKGQPRE 350
PQVYTLPPSR EEMTKNQVSL TCVLKGFYPS DIAVEWESNG QPENNYKTP 400
PVLDSGDSFF LYSKLTVDKS RWQQGNVFC SVMHEALHNH YTKSLSLSP 450
GK 452

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQMTQSPYS LSASVGDRVT ITCKASKSIN KYLAWFQQKP GKPKNLLIYD 50
GSTLQSGVPS RFGSGSGSDT FTLTSSLEP EDFATYYCQQ HNEYPTTFGQ 100
GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNFEY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22'-96" 149'-205" 266'-326" 372'-430"
22''-96'' 149'-205" 266'-326" 372'-430"
Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194"
23'''-88''' 134'''-194'''
Inter-H-L (h 5-CL 126) 225'-214" 225''-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 231-231" 234-234"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) /
piroglutamilo (pE, 5-oxopropilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 302, 302"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 452, 452"

sifaroboceptum #
sifarobocept

human Roundabout guidance receptor 2 (ROBO2, Roundabout homolog 2) fragment (1-203), fused via peptide linker ²⁰⁴GGSGGS²⁰⁹ to human immunoglobulin G1 Fc fragment (h-CH2-CH3-CHS domains [*Homo sapiens* IGHG1*03 (hinge (210-224), CH2 L²²⁸>A, L²²⁹>A, G²³¹>A (225-334), CH3 (335-439), CHS K⁴⁴¹>del (440-440))]) (210-440), disulfide-bridged dimer, produced in Chinese hamster ovary (CHO) K1SV cells, glycoform alfa
roundabout homolog 2 (ROBO2) ligand trap

sifarobocept

récepteur humain de guidage Roundabout 2 (ROBO2, homologue Roundabout 2), fragment (1-203), fusionné via la liaison peptidique ²⁰⁴GGSGGS²⁰⁹ au fragment Fc de l'immunoglobuline G1 humaine (domaines h-CH2-CH3-CHS [*Homo sapiens* IGHG1*03 (charnière (210-224), CH2 L²²⁸>A, L²²⁹>A, G²³¹>A (225-334), CH3 (335-439), CHS K⁴⁴¹>del (440-440))]) (210-440), dimère à ponts disulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) K1SV, glycoforme alfa
piège à ligand de l'homologue Roundabout 2 (ROBO2)

sifarobocept

receptor humano de guía Roundabout 2 (ROBO2, homólogo Roundabout 2), fragmento (1-203), fusionado a través de un enlace peptídico ²⁰⁴GGSGGS²⁰⁹ al fragmento Fc de la inmunoglobulina humana G1 (dominios h-CH2-CH3-CHS [*Homo sapiens* IGHG1*03 (bisagra (210-224), CH2 L²²⁸>A, L²²⁹>A, G²³¹>A (225-334), CH3 (335-439), CHS K⁴⁴¹>del (440-440))]) (210-440), dímero unido a través de puentes disulfuro, producido en células ováricas de hámster Chino (CHO) K1SV, forma glicosilada alfa
trampa de ligando homólogo rotonda 2 (ROBO2)

Sequence / Séquence / Secuencia				2760175-31-1
SRLRQEDFFP	RIVEHPSDVI	VSKGEPTTLN	CKAEGRPPTPT	IEWYKDGERV 50
ETDKDDPRSH	RMLLPSGSLF	FLRIVHGRRS	KPDEGSYVCV	ARNYLGEAVS 100
RNASLEVALL	RDDFRQNPTD	VVVAAGEPAI	LECQPPRGHP	EPTIYWKKDK 150
VRIDDKEERI	SIRGGKLMIS	NTRKSDAGMY	TCVGTNMVGE	RDSDPAELTV 200
FERGGSGGSE	PKSSDKTHTC	PPCPAPEAAG	APSVFLFPFK	PKDTLMISRT 250
PEVTCVVVDV	SHEDPEVKFN	WYVDGVEVHN	AKTKPREEQY	NSTYRVVSVL 300
TVLHQDWLNG	KEYKCKVSNK	ALPAPIEKTI	SKAKGQPREP	QVYTLPPSRE 350
EMTKNQVSLT	CLVKGFYPSD	IAVEWESNGQ	PENNYKTTPP	VLDSDGSSFFL 400
YSKLTVDKSR	WQQGNVFSCS	VMHEALHNHY	TQKSLSLSPG	440

Mutation / Mutation / Mutación
L²²⁸>A, L²²⁹>A, G²³¹>A, K⁴⁴¹>del

Peptide linker / Peptide liant / Péptido de unión
²⁰⁴GGSGGS²⁰⁹

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-chain: 31-89, 133-182, 255-315, 361-419, 31'-89', 133'-182', 255'-315', 361'-419'
Inter-chain: 220-220', 223-223'

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
N102, N291, N102', N291'

sigvotatugum #
sigvotatug

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ITGB6 (integrin subunit beta 6)], humanized monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain humanized (1-446) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.9] (26-33.51-58.97-105)) (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (213) (117-214), hinge 1-15 (215-229), CH2 (230-339), CH3 D12 (355), L14 (357) (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (225-225":228-228")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DG44, glycoform alfa
antineoplastic

sigvotatug

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ITGB6 (sous-unité bêta 6 de l'intégrine)], anticorps monoclonal humanisé;
chaîne lourde gamma1 humanisée (1-446) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.9] (26-33.51-58.97-105)) (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (213) (117-214), charnière 1-15 (215-229), CH2 (230-339), CH3 D12 (355), L14 (357) (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (225-225":228-228")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DG44, glycoforme alfa
antineoplasique

sigvotatug

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ITGB6 (subunidad beta 6 de la integrina)], anticuerpo monoclonal humanizado;

cadena pesada gamma1 humanizada (1-446) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.9] (26-33.51-58.97-105)) (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (213) (117-214), bisagra 1-15 (215-229), CH2 (230-339), CH3 D12 (355), L14 (357) (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-33*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (225-225'':228-228'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-DG44, forma glicosilada alfa antineoplásico

2764774-90-3

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QFQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGYSFT	DYNNWVRQA	PGQGLEWIGV	50
INPKYGTTRY	NQKFKGRATL	TVDKSTSTAY	MELSSLRSED	TAVYYCTRGL	100
NAWDYWGQT	LVTVSSASTK	GPSVFPLAPS	SKSTSGGTAA	LGCLVKDYFP	150
EPVTVSWNSG	ALTSGVHTFP	AVLQSSGLYS	LSSVVTVPSS	SLGTQTYICN	200
VNHKPSNTKV	DKKVEPKSCD	KTHTCPPCPA	PELLGGPSVF	LFPPKPKDTL	250
MISRTPEVTC	VVVDVSHEDP	EVKFNWYVDG	VEVHNAKTKP	REEQYNSTYR	300
VVSVLTVLHQ	DWLNKEYKC	KVSNKALPAP	IEKTISKAKG	QPREPQVYTL	350
PPSRDELTKN	QVSLTCLVKG	FYPSDIAVEW	ESNGQPENNY	KTTTPPVLDSD	400
GSFFLYSKLT	VDKSRWQQGN	VFSCSVMHEA	LHNHYTQKSL	SLSPGK	446

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS	LSASVGDRVT	ITCGASENIY	GALNWYQQKP	GKAPKLLIYG	50
ATNLEDGVPS	RFGSGSGGRD	YFTTISLLQP	EDIATYYCQN	VLTPPYTFQG	100
GTKLEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNNFY	PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYSLSSLT	LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200
LSPPTKSFN	RGEC				214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-96	143-199	260-320	366-424
	22"-96"	143"-199"	260"-320"	366"-424"

Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'
	23'''-88'''	134'''-194'''

Inter-H-L (h 5-CL 126)	219-214'	219"-214'"
Inter-H-H (h 11, h 14)	225-225"	228-228'"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 296, 296"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenaricos complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 446, 446"

sigvotatugum vedotinum #

sigvotatug vedotin

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ITGB6 (integrin subunit beta 6)], humanized monoclonal antibody, conjugated on an average of 4 cysteinyl residues via a cleavable linker to monomethylauristatin E (MMAE);
gamma1 heavy chain humanized (1-446) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (79.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.9] (26-33.51-58.97-105)) (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (213) (117-214), hinge 1-15 (215-229), CH2 (230-339), CH3 D12 (355), L14 (357) (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-disulfide with kappa light chain

	humanized (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-33*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (225-225":228-228")-bisdisulfide; produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DG44, glycoform alfa; substituted at the sulfur atoms of four L-cysteinyl residues on average among 219, 225, 228, 214', 219", 225", 228" and 214"" with (3RS)-1-(6-(((2S)-1-(((2S)-5-(carbamoylamino)-1-{4-(((2S)-1-(((2S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((2S)-2-[(1R,2R)-3-(((1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)amino)-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl)-3-methoxy-5-methyl-1-oxoheptan-4-yl)(methyl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)(methyl)carbamoyl)oxy)methyl)anilino)-1-oxopentan-2-yl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-6-oxohexyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl (<i>vedotin</i>) groups <i>antineoplastic</i>
sigvotatug védotine	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> ITGB6 (sous-unité bêta 6 de l'intégrine)], anticorps monoclonal humanisé, conjugué, par 4 résidus cystéinyle en moyenne, au monométhylauristatine E (MMAE), via un linker clivable; chaîne lourde gamma1 humanisée (1-446) [VH (<i>Homo sapiens</i>IGHV1-46*01 (79.6%) -IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.9] (26-33.51-58.97-105)) (1-116) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (213) (117-214), charnière 1-15 (215-229), CH2 (230-339), CH3 D12 (355), L14 (357) (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-33*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (225-225":228-228")-bisdisulfure; produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DG44, glycoforme alfa; substitué sur les atomes de soufre de 4 résidus L-cystéinyle en moyenne parmi 219, 225, 228, 214', 219", 225", 228" et 214"" avec des groupes (3RS)-1-(6-(((2S)-1-(((2S)-5-(carbamoylamino)-1-{4-(((2S)-1-(((2S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((2S)-2-[(1R,2R)-3-(((1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)amino)-1-méthoxy-2-méthyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl)-3-méthoxy-5-méthyl-1-oxoheptan-4-yl)(methyl)amino)-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl)(methyl)carbamoyl)oxy)méthyl)anilino)-1-oxopentan-2-yl)amino)-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-6-oxohexyl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yle (<i>védotine</i>) <i>antineoplasique</i>
sigvotatug vedotina	inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> ITGB6 (subunidad beta 6 de la integrina)], anticuerpo monoclonal humanizado, conjugado, por término medio con 4 residuos cisteinilo, con monometilauristatina E (MMAE), a través de un enlace escindible; cadena pesada gamma1 humanizada (1-446) [VH (<i>Homo sapiens</i>IGHV1-46*01 (79.6%) -IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.9] (26-33.51-58.97-105)) (1-116) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (213) (117-214), bisagra 1-15 (215-229), CH2 (230-339), CH3 D12 (355), L14 (357) (340-444), CHS (445-446)) (117-446)], (219-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-33*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (225-225":228-228")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino

(CHO), línea celular CHO-DG44, forma glicosilada alfa; substituido en los átomo de azufre de 4 residuos L-cisteinilo por término medio entre 219, 225, 228, 214', 219", 225", 228" y 214"" con grupos (3*R,S*)-1-(6-(((2*S*)-1-(((2*S*)-5-(carbamoilamino)-1-{4-(((2*S*)-1-(((2*S*)-1-(((3*R,4S,5S*)-1-((2*S*)-2-((1*R,2R*)-3-(((1*S,2R*)-1-fenil-1-hidroxiopropan-2-il]amino)-2-metil-1-metoxi-3-oxopropil]pirrolidin-1-il)-5-metil-3-metoxi-1-oxoheptan-4-il](metil)amino)-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino)-3-metil-1-oxobutan-2-il](metil)carbamoil}oxi)metil]anilino)-1-oxopentan-2-il]amino)-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino)-6-oxohexil)-2,5-dioxopirrolidin-3-ilo (*vedotina*)
antineoplásico

2764774-91-4

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```

QFQLVQSGAE VKKPGASVKV SKKASGYSFT DYNVNWVRQA PGQGLEWIGV 50
INPKYGTTRY NQKFKGRATL TVDKSTSTAY MELSSLRSDE TAVYYCTRGL 100
NAWDYWGQGT LVTVSSASTK GPSVFLAPS SKTSGGTAA LGCLVKDYFP 150
EPVTVSWNSG ALTSGVHTFF AVLQSSGLYS LSSVTVPSSE SLGTQTYICN 200
VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCA PELLGGPSVF LFPKPKDRL 250
MISRTPEVTC VVVDVSHEDP EKFVNWYVDG VEVHNAKTP REEQYNSTYR 300
VVSULTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNAKLPAP IEKTISKAGQ QPREPOVYTL 350
PPSRDELTKN QVSLTCLVKG FYPDSIAVEW ESNQGPENNY KTTTPVLDSD 400
GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN VFSCSVMEHA LHNHYTQKSL SLSPGK 446

```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```

DIQMTQSPSS LSASVGDRTV ITCGASENIY GALNWYQQKP GKAPKLLIYG 50
ATNLEDGVPS RFGSGSGGRD YTFITSSLPQ EDIATYICQN VLTTPYTFGQ 100
GTLKLEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSLTIL LSKADYERKH VYACEVTHQG 200
LSSPVTXKSN RGECC 214

```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 143-199 260-320 366-424

22"-96" 143"-199" 260"-320" 366"-424"

Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"

23"-88" 134"-194"

Inter-H-L (h 5-CL 126) 219-214' 219"-214"

Inter-H-H (h 11, h 14) 225-225" 228-228"

*At least two of the four inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 4 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker.

*Au moins deux des quatre ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 4 cystéinyl en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif.

*Al menos dos de los cuatro puentes disulfuro inter-catenarios no están presentes, una media de 4 cisteinil está conjugada a conectores de principio activo.

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)

H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 296, 296"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados


C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal

H CHS K2: 446, 446"

Potential modified residues / résidus modifiés potentiels / restos modificados potenciales*

C (219,225,228,214',219",225",228",214")

*(vedotin:mAb ~ 4:1)



silevimigum #**silevimig**

immunoglobulin (G1_L-kappa)_scFv-G1(h-CH2-CH3), anti-[rabies lyssavirus (rabies virus, RABV) glycoprotein G epitope III] and anti-[rabies lyssavirus (rabies virus, RABV) glycoprotein G epitope I] *Homo sapiens* monoclonal antibody, bispecific;
 gamma1 heavy chain *Homo sapiens*, anti-RABV glycoprotein G epitope III (1-448) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-30*18 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.11] (26-33.51-58.97-107)) (1-118)-*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, G1v32 CH3 W22 (knob), G1v74 CH3 C10 (CH1 (119-216), hinge 1-15 (217-231), CH2 (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359), T22>W (367), S10>C (355), D84.4>G (402), G85.4>D (403) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfide with kappa light chain *Homo sapiens*, anti-RABV glycoprotein G epitope III (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (88.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')];
 scFv-G1(h-CH2-CH3) heavy chain *Homo sapiens*, anti-RABV glycoprotein G epitope I (1"-488") [VH (*Homo sapiens*IGHV1-69*01 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.20] (26"-33".51"-58".97"-116")) (1"-127")-15-mer tris(tetraglycyl-seryl) linker (128"-142") - VL (*Homo sapiens*IGLV2-11*01 (93.9%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [9.3.12] (168"-176".194"-196".233"-244")) (143"-256")-*Homo sapiens*IGHG1*03 h-CH2-CH3, nG1m1 CH3 E12, M14, G1v37 hinge S5, G1v33 CH3 S22, A24, V86 (hole), G1v75 CH3 C5 (hinge 1-15 C5>S (261")) (257"-271"), CH2 (272"-381"), CH3 T22>S (407"), L24>A (409"), Y86>V (448"), Y5>C (390") (382"-486"), CHS (487"-488")) (257"-488)]; dimer (227-267":230-270")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-S, glycoform alfa
antiviral

silévímig

immunoglobuline (G1_L-kappa)_scFv-G1(h-CH2-CH3), anti-[épitope III de la glycoprotéine G du lyssavirus de la rage (virus de la rage, RABV)] et anti-[épitope I de la glycoprotéine G du lyssavirus de la rage (virus de la rage, RABV)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*, bispécifique;
 chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens*, anti-épitope III de la glycoprotéine G du RABV (1-448) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-30*18 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.11] (26-33.51-58.97-107)) (1-118)-*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, G1v32 CH3 W22 (knob) G1v74 CH3 C10 (CH1 (119-216), charnière 1-15 (217-231), CH2 (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359), T22>W (367), S10>C (355), D84.4>G (402), G85.4>D (403) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa *Homo sapiens*, anti-épitope III de la glycoprotéine G du RABV (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV3-15*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')];
 chaîne lourde scFv-G1(h-CH2-CH3) *Homo sapiens*, anti-épitope I de la glycoprotéine G du RABV (1"-488") [VH (*Homo sapiens*IGHV1-69*01 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.20] (26"-33".51"-58".97"-116")) (1"-127")-15-mer tris(tétraglycyl-séryl) linker (128"-142") - VL (*Homo sapiens*IGLV2-11*01 (93.9%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [9.3.12] (168"-176".194"-196".233"-244")) (143"-256")-*Homo sapiens*IGHG1*03 h-CH2-CH3, nG1m1 CH3 E12, M14, G1v37 charnière S5, G1v33 CH3 S22, A24, V86 (hole) G1v75 CH3 C5 (charnière 1-15 C5>S (261")) (257"-271"), CH2 (272"-381"), CH3 T22>S (407"), L24>A (409"), Y86>V (448"), Y5>C (390") (382"-486"), CHS (487"-488")) (257"-488)]; dimère (227-267":230-270")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-S, glycoforme alfa
antiviral

silevimig

inmunoglobulina (G1_L-kappa)_scFv-G1(h-CH2-CH3), anti-[epítipo III de la glicoproteína G del lyssavirus de la rabia (virus de la rabia, RABV)] y anti-[epítipo I de la glicoproteína G del lyssavirus de la rabia (virus de la rabia, RABV)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*, biespecífico;

cadena pesada gamma1 *Homo sapiens*, anti-epítipo III de la glicoproteína G del RABV (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*18 (95.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.11] (26-33.51-58.97-107)) (1-118)-*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, G1v32 CH3 W22 (knob) G1v74 CH3 C10 (CH1 (119-216), bisagra 1-15 (217-231), CH2 (232-341), CH3 E12 (357), M14 (359), T22>W (367), S10>C (355), D84.4>G (402), G85.4>D (403) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa *Homo sapiens*, anti-epítipo III de la glicoproteína G del RABV (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-15*01 (100%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')];

cadena pesada scFv-G1(h-CH2-CH3) *Homo sapiens*, anti-epítipo I de la glicoproteína G del RABV (1"-488") [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*01 (91.8%) -(IGHD) -IGHJ5*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.20] (26"-33".51"-58".97"-116")) (1"-127")-15-mer tris(tetraglicil-seril) enlace (128"-142") -VL (*Homo sapiens* IGLV2-11*01 (93.9%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [9.3.12] (168"-176".194"-196".233"-244")) (143"-256")-*Homo sapiens* IGHG1*03 h-CH2-CH3, nG1m1 CH3 E12, M14, G1v37 bisagra S5, G1v33 CH3 S22, A24, V86 (hole) G1v75 CH3 C5 (bisagra 1-15 C5>S (261") (257"-271"), CH2 (272"-381"), CH3 T22>S (407"), L24>A (409"), Y86>V (448"), Y5>C (390") (382"-486"), CHS (487"-488")) (257"-488")]; dímero ((227"-267":230-270")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-S, forma glicosilada alfa *antiviral*

2618667-99-3

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-RABV glycoprotein G epitope III (H')
QVQLVESGGG VQPGRSRL SCAASGFTFG SYGMHWVRQA PGKLEWVAT 50
ISYDGSIKDY ADSVGRGRTI SRDNRNTLY LQMNSLRAED TAVYICAKGD 100
RTGNLDYRWQ GTLVTVSSAS TKGPSVPEPLA PSKSPSGGT AALGCLVKDY 150
FPEPVTVSWN SGALTSGVHT PPAVLQSSGL YSLSSVTVTP SSSLGTQTVI 200
CNVNHKPSNT KVDKRVPEKS CDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD 250
TLMISRTPEV TCVVVDVSHE DPEVFNWYV DGEVHNAKT KPREEQYNST 300
YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVY 350
TLPPCREEMT KNQVSLWCLV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTPPVLVD 400
SGDSFFLYSK LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK 448

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera: anti-RABV glycoprotein G epitope III (L')
DIQMTQSPFSS LSASVGDRVT ITCRASGNIR NALNWQKRP GRAPKLLIYD 50
ASTRQSGVPS RFGSGSGSDT FTLTISLSLP EDPFYTYCQK NSEFPFPFQQ 100
GTKVEIKRTV AAPSVFIIPP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH YVACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEK 214

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-RABV glycoprotein G epitope I (H'')
QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGGTYS GYTINWVRQA PGQGLEWMGG 50
IIPFPGTANY AQRFGRLTI TADESTSTAY MELSSLRSD TAVYFCAREN 100
LDNSGTYYF SGWEDPWGQG TLTVSSSGGG GSGGGGGSGGG GSQSALTQPR 150
SVSGSPGQSV TISCCTGSDD LGQDYFWSY QGHPKRAEKL MIDATKRP 200
GVDPDRFSGK SGNATSLTIS GLQAEDEADY YCCSYAGDYT PGVFFGGGKT 250
LTVLASEPKS SDKTHTCPPC PAPELLGGPS VFLFPPKPKD TLMISRTPEV 300
TCVVVDVSHE DPEVFNWYV DGEVHNAKT KPREEQYNST YRVVSVLTVL 350
HQDWLNGKEY KCKVSNKALP APIEKTISKA KGQPREPQVC TLPPSREEMT 400
KNQVSLSCAV KGFYPSDIAV EWESNGQPEN NYKTPPVLVD SDGSFFLVSK 450
LTVDKSRWQQ GNVFSCSVMH EALHNHYTQK SLSLSPGK 488

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22"-96" 145-201 262-322 368-426
22"-96" 164"-232" 302"-362" 408"-466"
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134'-194'
Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 221-214'
Inter-H-H (h 8, h 11) 227-267" 230-270"
Inter-H-H (CH3 C10-C5)* 355-390"
*variants G1v74 (CH3 C10) and G1v75 (CH3 C5) creating an additional inter-H-H disulfide bond.

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 298, 338"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados.

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 448, 488"

sipavibartum #

sipavibart

immunoglobulin G1-lambda, anti-[*Homo sapiens* severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) spike (S) protein, receptor binding domain (RBD)], *Homo sapiens* monoclonal antibody; gamma1 heavy chain *Homo sapiens* (1-455) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-9*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (90.9%) L123>T (120), CDR-IMGT [8.8.18] (26-33.51-58.97-114)) (1-125) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, IGHG1v39 CH2 F1.3, E1.2, S116, IGHG1v21 CH2 Y15.1, T16, E18 (CH1 R120 (222) (126-223), hinge 1-15 (224-238), CH2 L1.3>F (242), L1.2>E (243), M15.1>Y (260), S16>T (262), T18>E (264), P116>S (339) (239-348), CH3 E12 (364), M14 (366) (349-453), CHS (454-455)) (126-455)], (228-214')-disulfide with lambda light chain *Homo sapiens* (1'-215') [V- LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV2-8*04 (94.8%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [9.3.9] (26-34.52-54.91-99)) (1'-109') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (110'-215')]; dimer (234-234":237-237")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, derived from the cell line CHO-K1, glycoform alfa

antiviral

sipavibart

immunoglobuline G1-lambda, anti-[domaine de liaison au récepteur (RBD) de la glycoprotéine spike (S) du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*; chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens* (1-455) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-9*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (90.9%) L123 >T (120), CDR-IMGT [8.8.18] (26-33.51-58.97-114)) (1-125) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, IGHG1v39 CH2 F1.3, E1.2, S116, IGHG1v21 CH2 Y15.1, T16, E18 (CH1 R120 (222) (126-223), charnière 1-15 (224-238), CH2L1.3>F (242), L1.2>E (243), M15.1>Y (260), S16>T (262), T18>E (264), P116>S (339) (239-348), CH3 E12 (364), M14 (366) (349-453), CHS (454-455)) (126-455)], (228-214')-disulfure avec la chaîne légère lambda *Homo sapiens* (1'-215') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV2-8*04 (94.8%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [9.3.9] (26-34.52-54.91-99)) (1'-109') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (110'-215')]; dimère (234-234":237-237")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), dérivant de la lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa

antiviral

sipavibart

immunoglobulina G1-lambda, anti-[dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína spike (S) del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*; cadena pesada gamma1 *Homo sapiens* (1-455) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-9*01 (94.9%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (90.9%) L123>T (120), CDR-IMGT [8.8.18] (26-33.51-58.97-114)) (1-125) -*Homo sapiens*IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, IGHG1v39 CH2 F1.3, E1.2, S116, IGHG1v21 CH2 Y15.1, T16, E18 (CH1 R120 (222) (126-223), bisagra 1-15 (224-238), CH2 L1.3>F (242), L1.2>E (243), M15.1>Y (260), S16>T (262), T18>E (264), P116>S (339) (239-348), CH3 E12 (364), M14 (366) (349-453), CHS (454-455)) (126-455)], (228-214')-disulfuro con la cadena ligera lambda *Homo sapiens* (1'-215') [V- LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV2-8*04 (94.8%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [9.3.9] (26-34.52-54.91-99)) (1'-109') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (110'-215')]; dímero (234-234":237-237")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular derivada de CHO-K1, forma glicosilada alfa

antiviral

2768288-97-5

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLVESGGG	LVQPGRSLRL	SCAASGFPPD	DYAIHWVRLA
ISWDSGSIGY	ADSVKGRFTI	SRDNAKNSLY	LQMNSLRAED
FPGYSSGWYY	GLEVWGQGT	VTVSSASTKG	PSVFFLAPSS
GCLVLDYFPE	PVTVSWNSGA	LTSGVHTFPA	VLQSSGLYSL
LGTQTYICNV	NHKPSNTRVD	KRVEPKSCDK	THTCPPCPAP
FPFKPKDTLY	ITREPEVTCV	VVDVSHEDPE	VKFNWYVDGV
EEQYNSTYRV	VSFLTVLHQD	WLNKEYKCK	VSNAKLPASI
PREPQVYITLP	PSREEMTKNQ	VSLTCLVKGF	YPSDIAVEWE
TPPVLDSGD	SFFLYSKLTV	DKSRWQQGNV	FSCSVMHEAL
LSPGK			

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
QSVVTQPPSA	SGSLGQSVTI	SCTGTSSDVG	GYNVSWYQQ
FEVSKRPSGV	PDRFSGSKSG	NTASLTVSGL	QAEDEADYYC
GGGTKLTVLG	QPKAAPSVTL	FPPSSEELQA	NKATLVCLIS
WKADSSPVKA	GVETTTPSKQ	SNNKYAASSY	LSLTPEQWKS
EGSTVEKTV	PTCCS		

Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	152-208	269-329
	22"-96"	152"-208"	269"-329"
Intra-L (C23-C104)	22'-90'	137'-196'	
	22'''-90'''	137'''-196'''	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	228-214'	228"-214"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	234-234"	237'-237"	

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /
Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) /
piroglutamilo (pE, 5-oxopropilo)
L VL Q1: I, I"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N844: 305, 305"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 455, 455"

solbinsiranum
solbinsiran

all-P-ambo-2'-O-methyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidilyl-(3'→5')-2'-O-methyladenilyl-(3'→5')-2'-O-methyladenilyl-(3'→5')-2'-O-methyladenilyl-(3'→5')-2'-O-methyladenilyl-(3'→5')-2'-O-methyluridylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluoroguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluoroguanilyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluoroadenilyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluoroadenilyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-O-methyluridylyl-(3'→5')-2'-O-methyluridylyl-(3'→5')-2'-O-methyladenilyl-(3'→5')-2'-O-methyluridylyl-(3'→5')-2'-O-methyladenilyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidilyl-(3'→5')-2'-O-methyladenilyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidilyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidilyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-O-[[2-(2-{5-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}ethoxy)ethoxy]methyl}adenilyl-(3'→5')-2'-O-[[2-(2-{5-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}ethoxy)ethoxy]methyl}adenilyl-(3'→5')-2'-O-[[2-(2-{5-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}ethoxy)ethoxy]methyl}adenilyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidilyl-(3'→5')-2'-O-methyluridylyl-(3'→5')-2'-O-methylguanylyl-(3'→5')-2'-O-methylcytidine

duplex with *all-P-ambo-2'-O-methyl-P-thioguananylyl-(5'→3')-2'-O-methyl-P-thioguananylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-O-methylguanylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(5'→3')-2'-O-methyladenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-*P*-thioguananylyl-(5'→3')-4'-de(hydroxyméthyl)-4'-[[hydroxy(méthoxy)phosphoryl]méthoxy]-2'-O-méthyluridine*
angiotensin-converting enzyme 3 synthesis reducer

solbinsiran


tout-P-ambo-2'-O-méthyl-P-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluoroguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluoroguanilyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-[[2-(2-{5-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}éthoxy)éthoxy]méthyl]adénylyl-(3'→5')-2'-O-[[2-(2-{5-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}éthoxy)éthoxy]méthyl]adénylyl-(3'→5')-2'-O-[[2-(2-{5-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}éthoxy)éthoxy]méthyl]adénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidine
duplex avec *tout-P-ambo-2'-O-méthyl-P-thioguananylyl-(5'→3')-2'-O-méthyl-P-thioguananylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadénylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoroadénylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-*P*-thioguananylyl-(5'→3')-2'-O-méthyl-P-thiouridylyl-(5'→3')-4'-dés(hydroxyméthyl)-4'-[[hydroxy(méthoxy)phosphoryl]méthoxy]-2'-O-méthyluridine*
réducteur de la synthèse de la protéine de type angiotensin-converting enzyme 3

solbinsirán

todo-P-ambo-2'-O-metil-P-thiouridilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluoroguanilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluoroguanilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-[[2-(2-{5-[(2-acétamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]pentanamido}etoxi)etoxi]metil]adenilil-(3'→5')-2'-O-[[2-(2-{5-[(2-acétamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]pentanamido}etoxi)etoxi]metil]adenilil-(3'→5')-2'-O-[[2-(2-{5-[(2-acétamido-2-desoxi-β-D-galactopiranosil)oxi]pentanamido}etoxi)etoxi]metil]adenilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil

dúplex con *todo-P-ambo-2'-O-metil-P-tioguanilil-(5'→3')-2'-O-metil-P-tioguanilil-*
(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-
(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-
(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-
metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(5'→3')-2'-
O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-
(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-
fluoro-P-tioadenilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoro-P-tiouridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-
fluoro-P-tioguanilil-(5'→3')-2'-O-metil-P-tiouridilil-(5'→3')-4'-des(hidroximetil)-4'-
 {[hidroxil(metoxi)fosforil]metoxi}-2'-O-metiluridina
reductor de la síntesis de la proteína de tipo angiopoyetina 3




2718150-11-7



N · A C G U

N : 2'-O-methyl-*N* / 2'-O-méthyl-*N* / 2'-O-metil-*N*

N : 2'-deoxy-2'-fluoro-N / 2'-désoxy-2'-fluoro-N / 2'-desoxi-2'-fluoro-N

$$- : -\text{PO}(\text{OH})- \quad = : -\text{PO}(\text{SH})-$$


solizmestrocelum

solizmestrocel

allogeneic mesenchymal stromal cells (MSC) derived from genetically selected umbilical cord tissue. The cord tissue is enzymatically digested, and the cells cultured in a xeno-free medium supplemented with human platelet lysate. The cells are positive (>90%) for the mesenchymal stromal cell surface markers CD105+, CD73+, CD90+, and are negative (<10%) for CD45-, CD34-, CD19-, CD11b-, and HLA-DR-. The cells release anti-fibrotic molecules such as matrix metalloproteinase-1 (MMP-1) and microRNA-29c (miR-29c). The cells also inhibit T lymphocyte proliferation upon CD3/CD28/CD2 activation, suppress tumor necrosis factor alpha (TNF α) secretion of immune cells (peripheral blood mononuclear cells /macrophages) upon lipopolysaccharides (LPS) stimulation, and upregulate soluble TNF receptor 1 and 2 secretion upon TNF α /interferon gamma (IFN- γ) stimulation *cell therapy (tissue regeneration)*

solizmestrocel

cellules stromales mésenchymateuses allogéniques (CSM) dérivées de tissu de cordon ombilical génétiquement sélectionné. Le tissu ombilical est digéré par voie enzymatique et les cellules sont cultivées dans un milieu non-xéno, complémenté avec du lysat de plaquettes humaines. Les cellules sont positives (>90%) pour les marqueurs de surface des cellules stromales mésenchymateuses CD105+, CD73+, CD90+, et sont négatives (<10%) pour CD45-, CD34-, CD19-, CD11b-, et HLA-DR-. Les cellules libèrent des molécules anti-fibrotiques telles que la métalloprotéinase matricielle 1 (MMP-1) et le microARN-29c (miR-29c). Les cellules inhibent également la prolifération des lymphocytes T lors de l'activation des CD3/CD28/CD2, suppriment la sécrétion du facteur de nécrose tumorale

	alpha (TNFα) des cellules immunitaires (cellules mononucléaires du sang périphérique/macrophages) lors de la stimulation par les lipopolysaccharides (LPS), et régulent à la hausse la sécrétion des récepteurs 1 et 2 solubles du TNF lors de la stimulation par le TNFα/l'interféron gamma (IFN-γ) <i>thérapie cellulaire (régénération tissulaire)</i>
solizmestrocel	células estromales mesenquimales (MSC) alogénicas derivadas de tejido de cordón umbilical seleccionado genéticamente. El tejido de cordón se digiere enzimáticamente y las células se cultivan en un medio sin sustancias xenogénicas suplementado con lisado plaquetario humano. Las células son positivas (>90%) para los marcadores de superficie de células mesenquimales estromales CD105+, CD73+, CD90+, y negativas (<10%) para CD45-, CD34-, CD19-, CD11b- y HLA-DR-. Las células liberan moléculas anti-fibróticas tales como metaloproteínasa 1 de matriz (MMP-1) y microARN-29c (miR-29c). Las células también inhiben la proliferación de linfocitos T tras la activación por CD3/CD28/CD2, suprimen la secreción de factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) por parte de células inmunes (células mononucleares de sangre periférica/macrófagos) tras su estimulación con lipopolisacáridos (LPS) y sobre regulan la secreción de receptor soluble de TNF 1 y 2 tras la estimulación con TNFα/interferón gamma (IFN-γ) <i>terapia celular (regeneración tisular)</i>
solrikitungum # solrikitung	immunoglobulin G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> CRLF2 (cytokine receptor like factor 2, TSLP, thymic stromal lymphopoietin)], humanized monoclonal antibody; gamma1 heavy chain humanized (1-450) [VH (<i>Homo sapiens</i>IGHV1-46*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120) -<i>Homo sapiens</i>IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, D12, L14 (CH1 K120 (217) (121-218), hinge 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 D12 (359), L14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i>IGKV3-20*01 (85.4%) -IGKJ2*01 (91.7%) L124>V (104), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i>IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-DXB11, glycoform alfa <i>immunomodulator, anti-inflammatory</i>
solrikitung	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> CRLF2 (récepteur du facteur 2 cytokine like, TSLP, lymphopoïétine stromale thymique)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma1 humanisée (1-450) [VH (<i>Homo sapiens</i>IGHV1-46*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120) -<i>Homo sapiens</i>IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, D12, L14 (CH1 K120 (217) (121-218), charnière 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 D12 (359), L14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i>IGKV3-20*01 (85.4%) -IGKJ2*01 (91.7%) L124>V (104), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i>IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-DXB11, glycoforme alfa <i>immunomodulateur, anti-inflammatoire</i>

solrikritug

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CRLF2 (receptor del factor 2 de tipocitocina, TSLP, linfopoyetina estromal tímica)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma1 humanizada (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-46*01 (83.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, D12, L14 (CH1 K120 (217) (121-218), bisagra 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 D12 (359), L14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (85.4%) -IGKJ2*01 (91.7%) L124>V (104), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (229-229'':232-232'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-DXB11, forma glicosilada alfa *immunomodulador, antiinflamatorio*

2768721-24-8

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada	
QVQLVQSGAE VKKFGASVKV SCKASGYIFT DYAMHWVQA PGQGLEWMMGT	50
FIFLLDTSY AQKQGRVTM TADTSTSTAY MELRSLRSD TAVVYICARMG	100
VTSHVMDAW GQGLTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAAALGCLVK	150
DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT	200
YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKHTHCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP	250
KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN	300
STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ	350
VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPEV	400
LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK	450
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera	
EIVLTQSPGT LSLSPGERAT LSCRASQFIS ISVHWYQQKP GQAPRLLIYF	50
ASQSIISGIPD RFGSGSGSTD FTLTISRLEP EDFAVYYCQQ TFSLPYTFGQ	100
GTKVEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY BREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ ESVTEDQSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSFN RGEC	214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"
Intra-L (C23-C104) 23'-88" 134'-194'
23'''-88''' 134'''-194'''
Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-214' 223"-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 300, 300"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 450, 450"

sontigidomidum
sontigidomide

rac-N-({2-[(3R)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]-1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)methyl}-2-oxo-2-[4-[1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]phenyl]acetamide
antineoplastic

sontigidomide


rac-N-({2-[(3R)-2,6-dioxopiperidin-3-yl]-1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)méthyl}-2-oxo-2-[4-[1-(trifluorométhyl)cyclopropyl]phényl]acétamide
antineoplasique

sontigidomida

*rac-N-({2-[(3*R*)-2,6-dioxopiperidin-3-il]-1-oxo-2,3-dihidro-1*H*-isoindol-5-il}metil)-2-oxo-2-{4-[1-(trifluorometil)ciclopropil]fenil}acetamida*
antineoplásico

 $C_{26}H_{22}F_3N_3O_5$

2560577-69-5



and enantiomer
 et énantiomère
 y enantiómero

sucantomotidum

sucantomotide

L-phenylalanyl-L-methionyl-L-leucylglycyl-L-α-glutamyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucine
immunological agent for active immunization (antineoplastic)

sucantomotide

L-phénylalanyl-L-méthionyl-L-leucylglycyl-L-α-glutamyl-L-phénylalanyl-L-leucyl-L-lysyl-L-leucine
agent immunologique d'immunisation active (antinéoplasique)

sucantomotida

L-fenilalanil-L-metionil-L-leucilglicil-L-α-glutamil-L-fenilalanil-L-leucil-L-lisil-L-leucina
agente inmunológico para inmunización activa (antineoplásico)

 $C_{54}H_{84}N_{10}O_{12}S$

2378651-62-6

Phe — Met — Leu — Gly — Glu — Phe — Leu — Lys — Leu

sutidiazinum

sutidiazine

*N*²-(4-cyclopropyl-5-fluoro-6-methylpyridin-2-yl)-*N*⁴-(1,5-dimethyl-1*H*-pyrazol-3-yl)-5-[(3*R*)-3,4-dimethylpiperazin-1-yl]pyrimidine-2,4-diamine
antimalarial

sutidiazine


*N*²-(4-cyclopropyl-5-fluoro-6-méthylpyridin-2-yl)-*N*⁴-(1,5-diméthyl-1*H*-pyrazol-3-yl)-5-[(3*R*)-3,4-diméthylpipérazin-1-yl]pyrimidine-2,4-diamine
antipaludique

sutidiazina

*N*²-(4-ciclopropil-5-fluoro-6-metilpiridin-2-il)-5-[(3*R*)-3,4-dimetilpiperazin-1-il]-*N*⁴-(1,5-dimetil-1*H*-pirazol-3-il)pirimidina-2,4-diamina
antipalúdico

 $C_{24}H_{32}FN_9$

1821293-40-6



tacaciclimum

tacaciclíb

(2*E*)-4-(morpholin-4-yl)-*N*-[(3*S*)-4-oxo-3-(propan-2-yl)-5-aza-1(3)-pyridina-6(3,5)-pyrazola-2(1,3)-benzena-7(1)-cyclopropanaheptaphan-1⁶-yl]but-2-enamide
cyclin-dependent kinase inhibitor, antineoplastic

tacaciclíb


(2*E*)-4-(morpholin-4-yl)-*N*-[(3*S*)-4-oxo-3-(propan-2-yl)-5-aza-1(3)-pyridina-6(3,5)-pyrazola-2(1,3)-benzena-7(1)-cyclopropanaheptaphan-1⁶-yl]but-2-énamide
inhibiteur des kinases dépendantes des cyclines, antinéoplasique

tacaciclíb

(2*E*)-4-(morfolin-4-il)-*N*-[(3*S*)-4-oxo-3-(propan-2-il)-5-aza-1(3)-piridina-6(3,5)-pirazola-2(1,3)-benzena-7(1)-ciclopropanaheptafan-1⁶-il]but-2-enamida
inhibidor de las kinasas dependientes de las ciclinas, antineoplásico

C₃₀H₃₆N₆O₃

2768774-66-7

**tagtociclimum**

tagtociclíb

(1*R*,3*S*)-3-{5-[3-(methoxymethyl)-1-methyl-1*H*-pyrazole-5-carboxamido]-1*H*-pyrazol-3-yl}cyclopentyl (propan-2-yl)carbamate
cyclin-dependent kinase inhibitor, antineoplastic

tagtociclíb


(propan-2-yl)carbamate de (1*R*,3*S*)-3-{5-[3-(méthoxyméthyl)-1-méthyl-1*H*-pyrazole-5-carboxamido]-1*H*-pyrazol-3-yl}cyclopentyle
inhibiteur des kinases dépendantes des cyclines, antinéoplasique

tagtociclíb

(propan-2-il)carbamato de (1*R*,3*S*)-3-{5-[1-metil-3-(metoximetil)-1*H*-pirazol-5-carboxamido]-1*H*-pirazol-3-il}ciclopentilo
inhibidor de las kinasas dependientes de las ciclinas, antineoplásico

C₁₉H₂₆N₆O₄

2460249-19-6




tarumasum # tarumase	<i>Lucilia sericata</i> (common green bottle fly) peptidase S1 domain-containing protein (trypsin-like serine proteinase) with specificity for fibrin, produced in <i>Pichia pastoris</i> (<i>Komagataella phaffii</i>) <i>fibrinolytic</i>
tarumase	protéine contenant le domaine S1 de la peptidase (sérine protéinase de type trypsine) de <i>Lucilia sericata</i> (mouche verte commune) présentant une spécificité pour la fibrine, produite chez <i>Pichia pastoris</i> (<i>Komagataella phaffii</i>) <i>fibrinolytique</i>
tarumasa	<i>Lucilia sericata</i> (mosca verde botella común) proteína que contiene el dominio S1 (proteínasa sérica de tipo tripsina) con especificidad por la fibrina, producida en <i>Pichia pastoris</i> (<i>Komagataella phaffii</i>) <i>fibrinolítico</i>
1243416-10-5	
Sequence / Séquence / Secuencia	
IVNGVDTTIQ AHPYQVSLQT NNGFHFCEGGS IISEDIIVTA AHCMQSYKAY 50	
QFKVRLGSTG YDNGGELVAV KSKFYHEGYN PETMVNDVAV IKLATPVRES 100	
SKVRYVKLAE KTPATGTPAV VTGWGSKCFL FCQTAPKVLQ KVEVDIVDEK 150	
TCASSEYKYG DDIKETMLCA YAVKKDACQG DSGGPLVANN KLVGVVSWGK 200	
GCALAGYPGV YCDVATVRSW IEKTAKSL 228	
Post-translational modifications	
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro	
27-43, 128-132, 152-169, 178-202	
tebapivat tebapivat	6-[(6-aminopyridin-2-yl)methyl]-4-methyl-2-[(1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)methyl]-4,6-dihydro-5 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[5',4':4,5]pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyridazin-5-one <i>pyruvate kinase activator</i>
tébapivat	6-[(6-aminopyridin-2-yl)méthyl]-4-méthyl-2-[(1 <i>H</i> -pyrazol-3-yl)méthyl]-4,6-dihydro-5 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[5',4':4,5]pyrrolo[2,3- <i>d</i>]pyridazin-5-one <i>activateur de la pyruvate kinase</i>
tebapivat	6-[(6-aminopiridin-2-il)metil]-4-metil-2-[(1 <i>H</i> -pirazol-3-il)metil]-4,6-dihidro-5 <i>H</i> -[1,3]thiazolo[5',4':4,5]pirrolo[2,3- <i>d</i>]piridazin-5-ona <i>activador de la piruvato kinasa</i>
C ₁₈ H ₁₆ N ₈ OS	
2283422-04-6	
tegeprotafibum tegeprotafib	5-(1-fluoro-3-hydroxy-7-methoxynaphthalen-2-yl)-1λ ⁶ ,2,5-thiadiazolidin-1,1,3-trione <i>protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitor, antineoplastic</i>
tégéprotafib	5-(1-fluoro-3-hydroxy-7-méthoxynaphtalén-2-yl)-1λ ⁶ ,2,5-thiadiazolidin-1,1,3-trione <i>inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase (PTP), antinéoplasique</i>

tegeprotafib

5-(1-fluoro-3-hidroxi-7-metoxinaftalen-2-il)-1 λ ⁶,2,5-tiadiazolidin-1,1,3-triona
inhibidor de la proteína tirosina fosfatasa (PTP), antineoplásico

C₁₃H₁₁FN₂O₅S

2407610-46-0

**tegomili fumaras**

tegomil fumarate

dimethyl (2*E*,19*E*)-4,18-dioxo-5,8,11,14,17-pentaoxahenicosa-2,19-diene-1,21-dioate
immunomodulator

fumarate de tégomil


(2*E*,19*E*)-4,18-dioxo-5,8,11,14,17-pentaoxahénicoso-2,19-diène-1,21-dioate de diméthyle
immunomodulateur

fumarato de tegomil

(2*E*,19*E*)-4,18-dioxo-5,8,11,14,17-pentaoxahenicosa-2,19-dieno-1,21-dioato de dimetilo
immunomodulador

C₁₈H₂₆O₁₁

1817769-42-8

**tesrivetcelum**

tesrivetcel

equine allogeneic tenogenic-primed mesenchymal stromal/stem cells (MSCs), isolated from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) collected from donor horses. The MSCs are selected for by growing the PBMCs in media containing fetal bovine serum (FBS) and dexamethasone. The cells are then expanded in media containing FBS, and prior to differentiation towards tenocytes by growth in media containing FBS, fibroblast-growth factor 2 (FGF-2) and insulin-like growth factor-1 (IGF-I). The final cells are characterized by their stretched spindle shaped morphology, and by expression of the cellular surface markers CD90 (≥95%) and CD40 (≥85%) and absence of MHC class II expression (≤2%). The cells secrete prostaglandin E2 (PGE2) and express the actin alpha 2 (ACTA2) gene (>2.3 fold)
cell therapy (veterinary use)

tesrivetcel

cellules souches/stromales mésenchymateuses (CSM) allogènes équines amorcées par ténogénèse, isolées à partir de cellules mononucléaires de sang périphérique (PBMC) prélevées sur des chevaux donneurs. Les CSM sont sélectionnées en cultivant les PBMC dans un milieu contenant du sérum bovin fœtal (FBS) et de la dexaméthasone. Les cellules sont ensuite amplifiées dans un milieu contenant du FBS, et avant la différenciation en ténocytes par croissance dans un milieu contenant du FBS, du facteur de croissance des fibroblastes 2 (FGF-2) et du facteur de croissance analogue à l'insuline 1 (IGF-I).

Les cellules finales sont caractérisées par leur morphologie fusiforme étirée, et par l'expression des marqueurs de surface cellulaire CD90 (≥95%) et CD40 (≥85%) et l'absence d'expression du CMH de classe II (≤2%). Les cellules sécrètent de la prostaglandine E2 (PGE2) et expriment le gène de l'actine alpha 2 (ACTA2) (>2,3 fois)

thérapie cellulaire (usage vétérinaire)

tesrivetcel

células madre/estromales mesenquimales (MSC) equinas, alogénicas, primadas para tenogenia, aisladas de células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) recogida de caballos donantes. Las MSCs se seleccionan mediante crecimiento de las PBMCs en medio que contiene suero bovino fetal (FBS) y dexametasona. Las células se expanden después en medio que contiene FBS, y antes de la diferenciación hacia tenocitos mediante crecimiento en medio que contiene FBS, factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGF-2) y factor de crecimiento similar a insulina I (IGF-I).

Las células finales se caracterizan por su morfología en forma de huso estirado y por la expresión de los marcadores de superficie CD90 (≥ 95%) y CD40 (≥ 85%) y ausencia de expresión de MHC de clase II (≤2%). Las células secretan prostaglandina E2 (PGE2) y expresan el gen de la actina alfa 2 (ACTA2) (>2,3 veces)

terapia celular (uso veterinario)

tibremciclibum

tibremciclib

N-{5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-yl}-5-fluoro-4-[(1*R*)-6-fluoro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-pyrido[1,2-*a*][1,3]benzimidazol-8-yl]pyrimidin-2-amine

cyclin-dependent kinase inhibitor, antineoplastic

tibremciclib

N-{5-[(4-éthylpipérazin-1-yl)méthyl]pyridin-2-yl}-5-fluoro-4-[(1*R*)-6-fluoro-1-méthyl-1,2,3,4-tétrahydro-pyrido[1,2-*a*][1,3]benzimidazol-8-yl]pyrimidin-2-amine

inhibiteur des kinases dépendantes des cyclines, antinéoplasique


tibremciclib

N-{5-[(4-etilpiperazin-1-il)metil]piridin-2-il}-5-fluoro-4-[(1*R*)-6-fluoro-1-metil-1,2,3,4-tetrahidropirido[1,2-*a*][1,3]benzimidazol-8-il]pirimidin-2-amina

inhibidor de las kinasas dependientes de las ciclinas, antineoplásico

C₂₈H₃₂F₂N₈

2397678-18-9



tisolagilinum

tisolagiline

(2S)-2-({[4'-(trifluorométhyl)[1,1'-biphényl]-4-yl]méthyl}amino)propanamide
monoamine oxidase B inhibitor

tisolagiline


(2S)-2-({[4'-(trifluorométhyl)[1,1'-biphényl]-4-yl]méthyl}amino)propanamide
inhibiteur de la monoamine oxydase B

tisolagilina

(2S)-2-({[4'-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-4-il]metil}amino)propanamida
inhibidor de la monoamina oxidasa B

C₁₇H₁₇F₃N₂O

1894207-44-3

**trastuzumabum brengitecanum #**

trastuzumab brengitecan

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, epidermal growth factor receptor 2, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], humanized monoclonal antibody; conjugated to a camptothecin derivative;
gamma1 heavy chain humanized (1-449) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120) -*Homo sapiens*IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa; substituted at the sulfur atoms of the L-cysteiny residues 214', 214"', 223, 223", 229, 229", 232 and 232" with (3RS)-1-[(4S,13S,21S)-13-benzyl-1-carboxy-22-[[[(1S,9S)-9-ethyl-5-fluoro-9-hydroxy-4-methyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1H,12H-benzo[de]pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-1-yl]amino]-21-methyl-5,8,11,14,17,22-hexaoxo-20-oxa-2,6,9,12,15,18-hexaazadocosan-4-yl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl (*brengitecan*) groups
antineoplastic

trastuzumab brengitécan

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (récepteur tyrosine-protéine kinase erbB-2, récepteur 2 du facteur de croissance épidermique), EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], anticorps monoclonal humanisé; conjugué à un dérivé de la camptothécine;

chaîne lourde gamma1 humanisée (1-449) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (229-229'':232-232'')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa; substitué sur les atomes de soufre des résidus L-cystéinyl 214', 214''', 223, 223'', 229, 229'', 232 et 232'' avec des groupes (3RS)-1-[(4S,13S,21S)-13-benzyl-1-carboxy-22-[[[(1S,9S)-9-éthyl-5-fluoro-9-hydroxy-4-méthyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1H,12H-benzo[de]pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoléin-1-yl]amino)-21-méthyl-5,8,11,14,17,22-hexaoxo-20-oxa-2,6,9,12,15,18-hexaazadocosan-4-yl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yle (*brengitécán*)
antineoplasique

trastuzumab brengitecán


inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ERBB2 (receptor tirosina-proteína quinasa erbB-2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico, EGFR2, HER2, HER-2, p185c-erbB2, NEU, CD340)], anticuerpo monoclonal humanizado; conjugado con un derivado de la campotecina;
cadena pesada gamma1 humanizada (1-449) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (81.6%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (86.3%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01(100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (229-229'':232-232'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), forma glicosilada alfa; substituido en los átomos de azufre de los residuos L-cisteinil 214', 214''', 223, 223'', 229, 229'', 232 y 232'' con grupos (3RS)-1-[(4S,13S,21S)-13-bencil-1-carboxi-22-[[[(1S,9S)-9-etil-5-fluoro-9-hidroxi-4-metil-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahidro-1H,12H-benzo[de]pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolein-1-il]amino)-21-metil-5,8,11,14,17,22-hexaoxo-20-oxa-2,6,9,12,15,18-hexaazadocosan-4-il]-2,5-dioxopirrolidin-3-ilo (*brengitécán*)
antineoplásico

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
EVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGPNK DTYIHWVRQA PGKGLEWVAR 50
IYFTNGITRY ADSVGRFTI SADTSKNTAI LQMMSLRAD TAVVYCSRWG 100
GGGFYAMDYW GQGTLVTVSS ASTKGFSVFP LAPSGKSTSG GTAALGCLVK 150
DYFPEFVTVS WNSGALTSGV HTFFAVLQSS GLYSLSVTV VPSSSLGTQT 200
YICNVNHNKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLPFPKP 250
KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
STYRVSVLT VILHQDWLNGK EYCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ 350
VYTLPPSREE MTRKNQVSLTC LVKGFPYSDI AVEWESNGQP ENNYKTTFPV 400
LDSGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFCSCV MHEALHNHYT QKSLSLSPG 449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIQMTQSPSS LSASVGRVT ITCRASQDVN TAVAWYQQKPK GKAPKLLIYS 50
ASFLYSGVES RPSGSGSGTD FTLTITSLQP EDFATYICQQ HTTPTPEPQQ 100
GTRVIEIKRTV AAPSVFIFPP SDEQLKSGTA SVVCLLNFF PREAKVQRKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKHK VVACEVTHQG 200
LSSPVTKSFN RGEC 214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L* (h 5-CL 126) 223-214" 223"-214"
Inter-H-H* (h 11, h 14) 229-229" 232-232"
*The four inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 8 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker.
*Les quatre ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 8 cystéinyl en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif.
*Faltan los cuatro puentes disulfuro inter-catenarios, una media de 8 cisteinil está conjugada a conectores de principio activo.

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 300, 300"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantennarios complejos fucosilados
Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados
C (214", 214", 223, 223", 229, 229", 232, 232")



traxivitugum #
traxivitug

immunoglobulin G1-lambda2, anti-[BK polyomavirus (BKV) major capsid protein VP1], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-7*01 (89.7%) -(IGHD) - IGHJ5*01 (85.7%)) [8.8.13] (26-33.51-58.97-109) (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (217) (121-218), hinge 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (223-212')-disulfide with lambda2 light chain *Homo sapiens* (1'-213') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV3-21*03 (92.6%) -IGLJ2*01 (90.0%) L124>V (104)) [6.3.10] (26'-31'.49'-51'.88'-97') (1'-107') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (108'-213')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-C8TD, glycoform alfa
antiviral

traxivitug

immunoglobuline G1-lambda2, anti-[protéine majeure de la capside VP1 du polyomavirus BK (BKV)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*;

traxivitug

chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-7*01 (89.7%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (85.7%)) [8.8.13] (26-33.51-58.97-109) (1-120) - *Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (217) (121-218), charnière 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (224-213')-disulfure avec la chaîne légère lambda2 *Homo sapiens* (1'-213') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV3-21*03 (92.6%) -IGLJ2*01 (90.0%) L124>V (104)) [6.3.10] (26'-31'.49'-51'.88'-97') (1'-107') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (108'-213')]; dimère (229-229"-232-232")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-C8TD, glycoforme alfa
antiviral

inmunoglobulina G1-lambda2, anti-[proteína mayor de la cápside VP1 del poliomavirus BK (BKV)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*;
cadena pesada gamma1 *Homo sapiens* (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-7*01 (89.7%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (85.7%)) [8.8.13] (26-33.51-58.97-109) (1-120) - *Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, E12, M14 (CH1 R120 (217) (121-218), bisagra 1-15 (219-233), CH2 (234-343), CH3 CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS (449-450)) (121-450)], (224-213')-disulfuro con la cadena ligera lambda2 *Homo sapiens* (1'-213') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV3-21*03 (92.6%) -IGLJ2*01 (90.0%) L124>V (104)) [6.3.10] (26'-31'.49'-51'.88'-97') (1'-107') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (108'-213')]; dímero (229-229"-232-232")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-C8TD, forma glicosilada alfa
antiviral

2770852-89-4

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QQLVSGGT LVQPGGSLRL SCAASGFTFN NYWMTWVRQA PGKGLEWVAN 50
IKKDGSEKYY VDSVRGRFTI SRDNAKNSLF LQMNSLRPED TAVYFCATVR 100
SGRYFALDDW GQGTLLVTSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNHNKPS NTKVDKRVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPPK 250
KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
STYRVVSVLT VHLQDNLNKG EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ 350
VITLPPSREE MTKNQVSLTLC LVKGFPYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV 400
LSDGGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK 450

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
QSVLTQPPSV SVAPGKTARI TCGGDNIGSR PVHWYQKQPG QAPILVYVDD 50
SNRPSGIPER FSGSNSGNTA TLTIIRVEAG DEADYYCQVM SSTDDHPFGG 100
GTKVTVLGQP KAAPSVTLFP PSSEELQANK ATLVLCLISDF YPGAFTVAVK 150
ADSSPVKAGV ETTTPSKQSN NKYAASSYLS LTPEQWKSRR SYSCQVTHEG 200
STVEKTVAPT ECS 213

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22'-96" 147"-203" 264'-324" 370'-428"
Intra-L (C23-C104) 22'-87" 135"-194"
22"-87" 135"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 223-212' 223"-212"
Inter-H-H (h 11, h 14) 229-229" 232-232"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutamínilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"
L VL V-LAMBDA Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 300, 300"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 450, 450"

troculeucelum

troculeucel

allogeneic natural killer (NK) cells isolated from peripheral blood leukapheresis of individual healthy donors. The leukapheresis material is enriched for CD56+ cells by positive immunoselection and re-suspended in media containing fetal bovine serum (FBS), interleukin-2 (IL-2), and interleukin-21 (IL-21). The cells are initially cultured in media containing IL-2 and two different irradiated feeder cell lines and then cultured with IL-2 alone to induce cell expansion.

The final cell population consists of CD3-CD56+ NK cells (≥80%), with highly expressed activating NK cell receptors [Nkp30, Nkp44 and Nkp46, C-type lectin-like receptor (NKG2 family of receptors including NKG2C and NKG2D)], and other activating receptors such as CD16 and CD244. The cells also upregulate expression of perforin-1, granzyme, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interferon gamma (IFN-γ) and CD107a, and demonstrate cytotoxicity against K562 myeloid leukemia cells *in vitro* (≥50%)
cell therapy (antineoplastic)

troculeucel

cellules tueuses naturelles (NK) allogéniques isolées à partir de la leucaphérèse de sang périphérique de donneurs individuels sains. Le matériel de leucaphérèse est enrichi en cellules CD56+ par immunosélection positive et remis en suspension dans un milieu contenant du sérum bovin fœtal (FBS), de l'interleukine-2 (IL-2) et de l'interleukine-21 (IL-21). Les cellules sont d'abord cultivées dans un milieu contenant de l'IL-2 et deux lignées différentes de cellules nourricières irradiées, puis cultivées avec de l'IL-2 seule pour induire l'expansion cellulaire.

La population cellulaire finale se compose de cellules NK CD3-CD56+ (≥80%), d'une forte expression de récepteurs activateurs des cellules NK [Nkp30, Nkp44 et Nkp46, récepteur de type lectine C (famille des récepteurs NKG2 comprenant NKG2C et NKG2D)], et d'autres récepteurs activateurs tels que CD16 et CD244. Les cellules augmentent également l'expression de la perforine-1, de la granzyme, du facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-α), de l'interféron gamma (IFN-γ) et du CD107a, et démontrent une cytotoxicité contre les cellules de leucémie myéloïde K562 *in vitro* (≥50%)
thérapie cellulaire (antineoplasique)

troculeucel

células NK alogénicas aisladas de leucoaféresis de sangre periférica de donantes individuales sanos. El material de leucoaféresis se enriquece para células CD56+ mediante inmunoselección positiva y se resuspende en medio que contiene suero bovino fetal (FBS), interleuquina-2 (IL-2) e interleuquina-21 (IL-21). Las células se cultivan inicialmente en medio que contiene IL-2 y dos líneas celulares alimentadoras irradiadas diferentes, y después se cultivan sólo con IL-2 para inducir expansión.

La población celular final consiste en células NK CD3-CD56+ (≥80%) con alta expresión de receptores activadores de NK [Nkp30, Nkp44 y Nkp46, receptor similar a lectina tipo C (familia de receptores NKG2 incluyendo NKG2C y NKG2D)], y otros receptores activadores como CD16 y CD244. Las células también sobre regulan la expresión de perforina-1, granzima, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interferón gamma (IFN-γ) y CD107a, y demuestran citotoxicidad contra células de leucemia mieloide K562 *in vitro* (≥50%)
terapia celular (antineoplásico)

ucasareotidum dasaroxetanum


ucasareotide dasaroxetan $N^{2,1}$ -[5-[(8-methyl-3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosan-1-yl)amino]-5-oxopentanoyl]-S^{3,2},S^{3,7}-cyclo(D-phenylalanyl-L-cysteinyl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-L-cysteinyl-L-threonine)
diagnostic agent, antineoplastic

ucasaréotide dasaroxétan $N^{2,1}$ -[5-[(8-méthyl-3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosan-1-yl)amino]-5-oxopentanoyl]-S^{3,2},S^{3,7}-cyclo(D-phénylalanil-L-cystéinyl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-thréonyl-L-cystéinyl-L-thréonine)
agent diagnostique, antinéoplasique

ucasareotida dasaroxetan $N^{2,1}$ -[5-[(8-metil-3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosan-1-il)amino]-5-oxopentanoyl]-S^{3,2},S^{3,7}-ciclo(D-fenilalanil-L-cisteinil-L-tirosil-D-triptofil-L-lisil-L-treonil-L-cisteinil-L- treonina)
agente de diagnóstico, antineoplásico

C₆₉H₁₀₃N₁₇O₁₄S₂

1518779-60-6

**ucenprubartum #**

ucenprubart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD200R1 (CD200 receptor 1, MOX2 receptor, MOX2R, OX2R, HCRTR2)], humanized monoclonal antibody;
gamma4 heavy chain humanized (1-446) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (87.9%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (85.7%) R120>Q (112), CDR-IMGT [9.8.12] (26-34.52-59.98-109)) (1-120)-*Homo sapiens*IGHG4*01, *nG4m(a)* CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (121-218), hinge 1-12 S10>P (228) (219-230), CH2 L92 (309) (231-340), CH3 (341-445), CHS K2>del (446)) (121-446)], (134-215')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV6-21*02 (88.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimer (226-226'':229-229'')-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells lacking the glutamine synthetase (GS-KO) gene, glycoform alfa
immunosuppressant, anti-inflammatory

ucenprubart

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD200R1 (récepteur 1 de CD200, récepteur de MOX2, MOX2R, OX2R, HCRTR2)], anticorps monoclonal humanisé;

chaîne lourde gamma4 humanisée (1-446) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (87.9%) -(IGHD)-IGHJ2*01 (85.7%) R120>Q (112), CDR-IMGT [9.8.12] (26-34.52-59.98-109)) (1-120)-*Homo sapiens*IGHG4*01, *nG4m(a)* CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (121-218), charnière 1-12 S10>P (228) (219-230), CH2 L92 (309) (231-340), CH3 (341-445), CHS K2>del (446)) (121-446)], (134-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV6-21*02 (88.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimère (226-226"-229-229")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) ne présentant pas le gène de la glutamine synthétase (GS-KO), glycoforme alfa immunosuppresseur, anti-inflammatoire

ucenprubart

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD200R1 (receptor 1 de CD200, receptor de MOX2, MOX2R, OX2R, HCRT2)], anticuerpo monoclonal humanizado; cadena pesada gamma4 humanizada (1-446) [VH (*Homo sapiens*IGHV1-46*01 (87.9%) -(IGHD)-IGHJ2*01 (85.7%) R120>Q (112), CDR-IMGT [9.8.12] (26-34.52-59.98-109)) (1-120)-*Homo sapiens*IGHG4*01, *nG4m(a)* CH2 L92, G4v5 h P10 (CH1 (121-218), bisagra 1-12 S10>P (228) (219-230), CH2 L92 (309) (231-340), CH3 (341-445), CHS K2>del (446)) (121-446)], (134-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV6-21*02 (88.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dímero (226-226"-229-229")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO) en ausencia del gen glutamina sintetasa (GS-KO), forma glicosilada alfa inmunosupresor, antiinflamatorio

2414559-57-0

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGFSFS	SGYYMAWVRQ	APGQGLEWMG	50
LIIGVSGSLW	YAQKFQGRVT	MTRDTSTSTV	YMLSSSLRSE	DTAVYYCARH	100
FALSDPFWNL	QGQTLTVTVSS	ASTKGPSVF	LAPCSRSTSE	STAALGCLVK	150
DYFPEPVTVS	WNSGALTSGV	HTFPVAVLQSS	GLYSLSSVVT	VPSSSLGTRK	200
YTCNVDPKPS	NTKVDKRVES	KYGPPCPPCP	APEFLGGPSV	FLFPPPKPKDT	250
LMISRTPEVT	CVVVDVSQED	PEVQFNWYVD	GVEVHNAKTK	PREEQFNSTY	300
RVVSVLTIVL	QDWLNGKEYK	CKVSNKGLPS	SIEKTIKSKAK	GQPPRPQVYT	350
LPFSQDEMTK	NQVSLTCLVK	GFYPDSIAVE	WESNGQPENN	YKTTTPPVLD	400
DGSFFLYSRL	TVDKSRWQEG	NVFSCSVME	ALHNHYTQKS	LSLSLG	446

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

EIVLTQSPDF	QSVTPKEKVT	ITCQASESID	SYLLWYQQKP	DQSPKLLIKQ	50
ASTLASGVPS	RFGSGSGSTD	FTLTINSLEA	EDAATYYCQN	YYDISNDFG	100
GGTKVEIKRT	VAAPSVFIFP	PSDEQLKSGT	ASVCLLNLF	YPREAKVQWK	150
VDNALQSGNS	QESVTEQDSK	DSTYLSSTL	TLSKADYEKH	KVYACEVTHQ	200
GLSSPVTKSF	NRGEC				215

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-97 147-203 261-321 367-425
22"-97" 147"-203" 261"-321" 367"-425"

Intra-L (C23-C104) 23'-88' 135'-195'
23"-88" 135"-195"

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 134-215' 134"-215"

Inter-H-H (h 8, h 11) 226-226" 229-229"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal /

Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) /

piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)

H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 297, 297"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires

complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarijos complejos fucosilados.

uplarafenibum

uplarafenib

N-{2,4,5-trifluoro-3-[3-(morpholin-4-yl)quinoxaline-6-carbonyl]phenyl}propane-1-sulfonamide
antineoplástico

uplarafénib


N-{2,4,5-trifluoro-3-[3-(morpholin-4-yl)quinoxaline-6-carbonyl]phényl}propane-1-sulfonamide
antineoplasique

uplarafenib

N-{2,4,5-trifluoro-3-[3-(morfolin-4-il)quinoxalina-6-carbonil]fenil}propano-1-sulfonamida
antineoplásico

C₂₂H₂₁F₃N₄O₄S

1425485-87-5

**uprevstobartum #**

uprevstobart

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* NT5E (5'-nucleotidase ecto, 5' nucleotidase, 5'-NT, NT5, CD73)], humanized monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain humanized (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV5-51*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) Q120>A (113), L123>T (116), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120 CH3 E12, M14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120 (218) (122-219), hinge 1-15 (220-234), CH2 N84.4>A (301) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS K2>del (450)) (122-450)], (224-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (91.7%) Q120>G (100'), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1 lacking the glutamine synthetase (GS-KO) gene, non-glycosylated
immunostimulant, antineoplástico

uprevstobart

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* NT5E (5' ecto nucléotidase, 5' nucléotidase, 5'-NT, NT5, CD73)], anticorps monoclonal humanisé;
chaîne lourde gamma1 humanisée (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV5-51*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) Q120>A (113), L123>T (116), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120 CH3 E12, M14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120 (218) (122-219), charnière 1-15 (220-234), CH2 N84.4>A (301) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS K2>del (450)) (122-450)], (224-214')-disulfure avec la

chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (91.7%) Q120>G (100'), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (230-230":233-233")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1 ne présentant pas le gène de la glutamine synthétase (GS-KO), non-glycosylé
immunostimulant, antinéoplasique

uprevstobart

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* NT5E (5' ecto nucleotidasa, 5' nucleotidasa, 5'-NT, NT5, CD73)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma1 humanizada (1-450) [VH (*Homo sapiens* IGHV5-51*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) Q120>A (113), L123>T (116), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120 CH3 E12, M14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120 (218) (122-219), pesada 1-15 (220-234), CH2 N84.4>A (301) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS K2>del (450)) (122-450)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (83.2%) -IGKJ2*01 (91.7%) Q120>G (100'), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (230-230":233-233")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1 en ausencia del gen glutamina sintetasa (GS-KO), no glicosilado
inmunoeestimulante, antineoplásico

2762201-85-2

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada		
EVQLVQSGAE	VKKPGESLKI	SCKSGGYTFT
IYPGSGNTYY	NEKEFGQVTI	SADKSISTAY
YLGSYGFDFY	WGAGTTVTVS	SASTKGPSVF
KDYFPEPVTV	SWNSGALTSG	VHTFPAVLQS
TYICNVNHP	SNTKVDKRVK	PKSCDKTHTC
PKDTLMISRT	PEVTCVVVDV	SHEDPEVKFN
ASTYRVVSVL	TVLHQDWLNG	KEYKCKVSNK
QVYTLPPSRE	EMTKNQVSLT	CLVKGFYPSD
VLDSGDSFFL	YSKLTVDKSR	WQQGNVFSCS
		VMHEALHNNY
		TQKSLSLSPG
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera		
DIIVMTQSPDS	LAVSLGERAT	INCKASQDVS
ASVRYSGVPD	RFSGSGSGTD	FTLTISSLQA
GTKLEIKRTV	AAPSVFIIPP	SDEQLKSGTA
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSLSTLT
LSSPVTKSFN	RGEC	
Post-translational modifications		
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro		
Intra-H (C23-C104)	22-96	148-204
	22"-96"	148"-204"
Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'
	23"-88"	134"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126)	224-214'	224"-214"
Inter-H-H (h 11, h 14)	230-230"	233-233"
No N-glycosylation sites / pas de sites de N-glycosylation / ninguna posición de N-glycosilación		
H CH2 N84.4>A (G1v29): 301, 301"		

usilnetugum #
usilnetug

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* APP (amyloid beta A4 precursor protein) Abeta N3pGlu (amyloid beta N-terminal truncated and pyroglutamate modified at position 3, AβpE3) peptides], monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain (1-451) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV8-12*01 (82.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) A128>S (121)/*Homo sapiens* IGHV2-5*08 (75.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [10.7.13] (26-35.53-59.98-110)) (1-121) -*Homo*

	<i>sapiens</i>IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (218) (122-219), hinge 1-15 (220-234), CH2 (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-12*01 (88.4%) -IGKJ2*02 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214'')]; dimer (230-230":233-233'')-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, derived from the cell line CHO-K1, glycoform alfa <i>clearance of amyloid beta</i>
usilnetug	immunoglobuline G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> APP (protéine précurseur A4 amyloïde bêta) Abêta N3pGlu (amyloïde bêta N-terminal tronqué avec la position 3 modifiée en pyroglutamate, AβpE3) peptides], anticorps monoclonal; chaîne lourde gamma1 (1-451) [VH Musmus/Homsap (<i>Mus musculus</i> IGHV8-12*01 (82.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) A128>S (121)/<i>Homo sapiens</i> IGHV2-5*08 (75.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [10.7.13] (26-35.53-59.98-110)) (1-121) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (218) (122-219), charnière 1-15 (220-234), CH2 (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-12*01 (88.4%) -IGKJ2*02 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214'')]; dimère (230-230":233-233'')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), dérivant de la lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa <i>élimination d'amyloïde bêta</i>
usilnetug	inmunoglobulina G1-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> APP (proteína precursor A4 amiloide beta) Abeta N3pGlu (amiloide beta N-terminal truncada con la posición 3 modificada en piroglutamato, AβpE3) péptidos], anticuerpo monoclonal; cadena pesada gamma1 (1-451) [VH Musmus/Homsap (<i>Mus musculus</i> IGHV8-12*01 (82.0%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%) A128>S (121)/<i>Homo sapiens</i> IGHV2-5*08 (75.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [10.7.13] (26-35.53-59.98-110)) (1-121) -<i>Homo sapiens</i> IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 CH1 K120, CH3 E12, M14 (CH1 R120>K (218) (122-219), bisagra 1-15 (220-234), CH2 (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449), CHS (450-451)) (122-451)], (224-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-12*01 (88.4%) -IGKJ2*02 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97'')) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214'')]; dímero (230-230":233-233'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular derivada de CHO-K1, forma glicosilada alfa <i>eliminación de amiloide beta</i>

2770861-19-1

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada	
EVQLQESGPG LVKPSQTLST TCTFSGFSLT TSGMGVSWIR QPPGKGLEWL	50
AHIYWDDDKR YNPFYMKRRLT ISKDTSKNQV SLKISSVTAA DTAVYYCARR	100
ADDYDVGFAY WQQTGLTVTS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAAALGCLV	150
KDYFPEPVTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSV TVPSSSLGTQ	200
TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKHTC PPCAPELLG GPSVFLFFPK	250
PKDTLMISRT FEVTCVVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY	300
NSYRVVSVL TVLHGDWLG KEYKCKVSNK ALPAPIEKTI SKAKGQFPRE	350
QVTLFPSRE EMTKNQVSLT CLVKGFPSPD IAVEWESNGQ PENNYKTPFP	400
VLDSDGSFFL YSKLTVDKSR WQGNVFPSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG	450
K	451

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera	
DIQMTQSPSS VSASVGDRVT ITCLASQTIG TWLAWYQQPK GKSPKLLIYA	50
ATSLADGVPS RFGSGSGSTD FTLTISLQP EDFATYYCQQ LYSSPFTFGQ	100
GTKLEIKRTV AAPSVFIFFP SDEQLKSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEKKH VYACEVTHQG	200
LSSPVTKSFN RGECC	214

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-97 148-204 265-325 371-429
22"-97" 148"-204" 265"-325" 371"-429"
Intra-L (C23-C104) 23"-88" 134"-194"
23"-88" 134"-194"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 224-214" 224"-214"
Inter-H-H (h 11, h 14) 230-230" 233-233"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 301, 301"

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 451, 451"

usnoflastum
usnoflast

(1E)-2-[(2R)-1,2-dimethylpyrrolidin-2-yl]-N-[(1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-4-yl)carbamoyl]ethene-1-sulfonamide
non-steroidal anti-inflammatory


usnoflast

(1E)-2-[(2R)-1,2-diméthylpyrrolidin-2-yl]-N-[(1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacén-4-yl)carbamoyl]éthène-1-sulfonamide
anti-inflammatoire non-stéroïdien

usnoflast

(1E)-2-[(2R)-1,2-dimetilpirrolidin-2-il]-N-[(1,2,3,5,6,7-hexahidro-s-indacen-4-il)carbamoi]eteno-1-sulfonamida
antiinflamatorio no esteroide

C₂₁H₂₉N₃O₃S 2455519-86-3



vamagloxistatum
vamagloxistat

5-[[4'-(3,3-difluorocyclobutyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]oxy]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
glycolate oxidase inhibitor

vamagloxistat


acide 5-[[4'-(3,3-difluorocyclobutyl)[1,1'-biphényl]-4-yl]oxy]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylique
inhibiteur de la glycolate oxydase

vamagloxistat

ácido 5-[[4'-(3,3-difluorociclobutil)[1,1'-bifenil]-4-il]oxi]-1H-1,2,3-triazol-4-carboxílico
inhibidor de la glicolato oxidasa

C₁₉H₁₅F₂N₃O₃

2408241-62-1



venanprubartum #
venanprubart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* BTLA (B and T lymphocyte attenuator, BTLA1, CD272)], humanized monoclonal antibody; gamma4 heavy chain humanized (1-449) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (80.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), CDR-IMGT [8.7.17] (26-33.51-57.96-112)) (1-123)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10, G4v4 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 (124-221), hinge 1-12 S10>P (231) (222-233), CH2 F1.3>A (237), L1.2>A (238), L92 (312) (234-343), CH3 (344-448), CHS K2>del (449)) (124-449)], (137-217')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-217') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (88.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.12] (27'-32'.50'-52'.89'-100')) (1'-110') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (156'), V101 (194') (111'-217')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells lacking the glutamine synthetase (GS-KO) gene, glycoform alfa
immunosuppressant

vénanprubart

immunoglobuline G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* BTLA (atténuateur des lymphocytes B et T, BTLA1, CD272)], anticorps monoclonal humanisé; chaîne lourde gamma4 humanisée (1-449) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (80.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), CDR-IMGT [8.7.17] (26-33.51-57.96-112)) (1-123)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10, G4v4 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 (124-221), charnière 1-12 S10>P (231) (222-233), CH2 F1.3>A (237), L1.2>A (238), L92 (312) (234-343), CH3 (344-448), CHS K2>del (449)) (124-449)], (137-217')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-217') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (88.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.12] (27'-32'.50'-52'.89'-100')) (1'-110') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (156'), V101 (194') (111'-217')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) ne présentant pas le gène de la glutamine synthétase (GS-KO), glycoforme alfa
immunosuppresseur

venanprubart

inmunoglobulina G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* BTLA (atenuador de los linfocitos B y T, BTLA1, CD272)], anticuerpo monoclonal humanizado;

cadena pesada gamma4 humanizada (1-449) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-18*01 (80.6%) -(IGHD) -IGHJ1*01 (100%), CDR-IMGT [8.7.17] (26-33.51-57.96-112)) (1-123)-*Homo sapiens* IGHG4*01, nG4m(a) CH2 L92, G4v5 h P10, G4v4 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 (124-221), bisagra 1-12 S10>P (231) (222-233), CH2 F1.3>A (237), L1.2>A (238), L92 (312) (234-343), CH3 (344-448), CHS K2>del (449)) (124-449)], (137-217')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-217') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV3-20*01 (88.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.12] (27'-32'.50'-52'.89'-100'))] (1'-110') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (156'), V101 (194') (111'-217')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO) en ausencia del gen glutamina sintetasa (GS-KO), forma glicosilada alfa
inmunosupresor

2635407-50-8

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLVQSGAE	VKKPGASVKV	SCKASGFSLS	SYGVSWVRQA	PGQGLEWMGA	50
ISYDGTITYA	SWAKSRVTMT	RDTSTSTVYM	ELSSLSRSED	AVYYCARGDY	100
YDDYVYVYAL	DIWGQGLVT	VSSASTKGPS	VFLAPCSRS	TSESTAALGC	150
LVKDYFPEPV	TVSWNSGALT	SGVHTFPAVL	QSSGLYSLSS	VVTVPSSSLG	200
TKTYTCNVDH	KPSNTKVDKR	VESKYGPSCP	PCPAPEAAGG	PSVFLFPPKP	250
KDTLMISRT	EVTCTVVDVS	QEDPEVQFNW	YVDGVEVHNA	KTKPREQFN	300
STYRVVSVLT	VLHQDWLNGK	EYKCKVSNKG	LPSSIEKTIS	KAKGQPREPQ	350
VYTLPPSQEE	MTKNQVSLTC	LVKGFYPSDI	AVEWESNGQP	ENNYKTTTPV	400
LDSDGSFFLY	SRLTVDKSRW	QEGNVFSCSV	MHEALHNHYT	QKSLSLSLG	449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

EIVLTQSPGT	LSSLSPGERAT	LSCQASQSI	TALAWYQQKP	GQAPRLLIYA	50
ASTLASGIPD	RFSGSGSGTD	FTLTISRLEP	EDFAVYQCQ	GYSSSLNDNV	100
FGGGTKVEIK	RTVAAPSVEI	FPPSDEQLKS	GTASVVCCLN	NFYPREAKVQ	150
WKVDNALQSG	NSQESVTEQD	SKDSTYSLSS	TLTSLKADYE	KHKVYACEVT	200
HQGLSSPVTK	SFNRGEC				217

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-95	150-206	264-324	370-428
	22"-95"	150"-206"	264"-324"	370"-428"

Intra-L (C23-C104)	23'-88'	137'-197'
	23'''-88'''	137'''-197'''

Inter-H-L (CH1 10-CL 126) 137-217' 137"-217"

Inter-H-H (h 8, h 11) 229-229" 232-232"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamide (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 300, 300"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

verekitugum

verekitug

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CRLF2 (cytokine receptor like factor 2, TSLPR, thymic stromal lymphopoietin receptor)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;

gamma1 heavy chain *Homo sapiens* (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.11] (26-33.51-58.97-107)) (1-118)-*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (215) (119-216), hinge 1-15 (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfide with kappa light chain *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*02 (96.8%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimer (227-227":230-230")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, glycoform alfa
anti-inflammatory

vérekítug immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CRLF2 (récepteur du facteur 2 cytokine like, TSLPR, récepteur de la lymphopoïétine stromale thymique)]; anticorps monoclonal *Homo sapiens*; chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens* (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.11] (26-33.51-58.97-107)) (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (215) (119-216), charnière 1-15 (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*02 (96.8%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dimère (227-227":230-230")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), glycoforme alfa
anti-inflammatoire

verekítug inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CRLF2 (receptor del factor 2 de tipo citocina, TSLPR, receptor de la linfopoyetina estromal tímico)]; anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*; cadena pesada gamma1 *Homo sapiens* (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (89.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.11] (26-33.51-58.97-107)) (1-118) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14 (CH1 K120 (215) (119-216), bisagra 1-15 (217-231), CH2 (232-341), CH3 D12 (357), L14 (359) (342-446), CHS (447-448)) (119-448)], (221-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa *Homo sapiens* (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*02 (96.8%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27'-32'.50'-52'.89'-97')) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153'), V101 (191') (108'-214')]; dímero (227-227":230-230")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), forma glicosilada alfa
antiinflamatorio

2768386-15-6

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada			
EVQLLES	GGG	LVQPGGSLRL	SCAASGFTFR
SSAMHWVRQA	PGKGLKWVSS	50	
VSGSGAGTYY	ADSVKGRFTI	SRDNPKNLTLY	LQMNSLRAED
TAVVYCVKEG	100		
GSRGFDYWGQ	GTLVTSSAS	TKGPSVFPLA	PSKSTSGGT
AALGCLVKDY	150		
FPEPVTVSWN	SGALTSGVHT	FPAVLQSSGL	YSLSSVTVTP
SSSLGTQTYI	200		
CNVNHKFSNT	KVDKKVEPKS	CDKTHTCPPC	PAPELLGGPS
VFLFPPKPKD	250		
TLMISRTPEV	TCVVVDVSHE	DPEVKFNWYV	DGVEVHNAKT
KPREEQYNST	300		
YRVVSVLTVL	HQDWLNGKEY	KCKVSNKALP	APIEKTISKA
KGQPREPQVY	350		
TLPPSRDEL	KNQVSLTCLV	KGFPYSDIAV	EWESNGQPEN
NYKTTTPFVLD	400		
SDGSFFLYSK	LTVDKSRWQQ	GNVFSCSVHM	EALHNYHTQK
SLSLSPGK	448		

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera			
DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCRASQDIS	NYLAWFQQKP
GKAPKSLIYT	50		
ASSLQSGVPS	KFSGSGGTD	FTLTISSLQP	EDFATYYCQ
YNLYPPTFGQ	100		
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNIFY
PREAKVQWKV	150		
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSSTLT	LSKADYEKKH
VYACEVTHQG	200		
LSSPVTKSFN	RGEC		214

Post-translational modifications			
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro			
Intra-H (C23-C104)	22-96	145-201	262-322 368-426
	22"-96"	145"-201"	262"-322" 368"-426"
Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'	
	23'''-88'''	134'''-194'''	
Inter-H-L (h 5-CL 126)	221-214'	221"-214"	
Inter-H-H (h 11, h 14)	227-227"	230-230"	

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 298, 298"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados
C-terminal lysine clipping / Coupeure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 448, 448"

vevotadekinum

vevotadekin

human interleukin 18 (IL 18, interleukin-1 gamma, IL-1 gamma, interferon gamma-inducing factor) fragment (1-157), engineered variant (C³⁸>S, M⁵¹>K, K⁵³>S, ⁵⁶QP⁵⁷>LA, M⁶⁰>L, C⁶⁸>D, S¹⁰⁵>D, ¹¹⁰DN¹¹¹>SR) produced in *Escherichia coli*
interleukin-18 analogue, antineoplastic

vévotadékiné

fragment (1-157) de l'interleukine 18 humaine (IL18, interleukine-1 gamma, IL-1 gamma, facteur d'induction de l'interféron gamma), variant modifié (C³⁸>S, M⁵¹>K, K⁵³>S, ⁵⁶QP⁵⁷>LA, M⁶⁰>L, C⁶⁸>D, S¹⁰⁵>D, ¹¹⁰DN¹¹¹>SR) produit chez *Escherichia coli*
analogue de l'interleukine 18, antinéoplasique

vevotadekina

fragmento (1-157) de interleukina humana 18 (IL18, interleukina-1 gamma, IL-1 gamma, factor de inducción interferón gamma), variante diseñada (C³⁸>S, M⁵¹>K, K⁵³>S, ⁵⁶QP⁵⁷>LA, M⁶⁰>L, C⁶⁸>D, S¹⁰⁵>D, ¹¹⁰DN¹¹¹>SR) producida en *Escherichia coli*
análogo de la interleukina 18, antineoplásico

2768756-51-8

Sequence / Séquence / Secuencia

```
YFGKLESKLS VIRNLNDQVL FIDQGNRPLF EDMTDSDSRD NAPRTIFIIS 50
KYSDSLARGL AVTISVRDEK ISTLSCENKI ISFKEMNPPD NIKDTKSDII 100
FFQRDVPFGHS RKMQFESSY EGYFLACEKE RDLFKILKK EDELGDRSIM 150
FTVQNED 157
```

Mutation / Mutation / Mutación

C³⁸>S, M⁵¹>K, K⁵³>S, Q⁵⁶>L, P⁵⁷>A, M⁶⁰>L, C⁶⁸>D, S¹⁰⁵>D, D¹¹⁰>S, N¹¹¹>R

Post-translational modifications

none / aucun / ninguna

vicatertidum

vicatertide

L-leucyl-L-glutaminy-L-valyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-histidine
transforming growth factor (TGF) beta-1 inhibitor

vicatertide

L-leucyl-L-glutaminy-L-valyl-L-valyl-L-tyrosyl-L-leucyl-L-histidine
inhibiteur du facteur de croissance transformant (TGF) bêta-1

vicatertida

L-leucil-L-glutaminil-L-valil-L-valil-L-tirosil-L-leucil-L-histidina
inhibidor del factor de crecimiento transformante (TGF) beta-1

C₄₂H₆₆N₁₀O₁₀

1251838-01-3

H—Leu—Gln—Val—Val—Tyr—Leu—His—OH

vilastobartum #

vilastobart

immunoglobulin G1-fused prodomain kappa, anti-[*Homo sapiens* CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4, CTLA-4, CD152)], humanized monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain humanized (1-449) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*08 (84.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.12] (26-33.51-58.97-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17.1 CH1 K120, D12, L14, G1v7 CH2 D3, E117 (CH1 K120 (216) (120-217), hinge 1-15 (218-232), CH2 S3>D (241), I117>E (334) (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-241')-disulfide with fused prodomain kappa light chain humanized (1'-241') [prodomain (1'-28') fused to V- KAPPA (*Homo sapiens* IGKV6-21*02 (78.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [5.3.9] (55'-59'.77'-79'.116'-124')) (29'-134') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (180'), V101 (218') (135'-241')]; dimer (228-228":231-231")-bisdisulfide,

produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, glycoform alfa
immunostimulant, antineoplastic

vilastobart immunoglobuline G1-kappa à prodomaine fusionné, anti-[*Homo sapiens* CTLA4 (protéine 4 associée aux lymphocytes T cytotoxiques, CTLA-4, CD152)], anticorps monoclonal humanisé;
chaîne lourde gamma1 humanisée (1-449) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*08 (84.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.12] (26-33.51-58.97-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, D12, L14, G1v7 CH2 D3, E117 (CH1 K120 (216) (120-217), charnière 1-15 (218-232), CH2 S3>D (241), I117>E (334) (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-241')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée à prodomaine fusionné (1'-241') [prodomaine (1'-28') fusionné à V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV6-21*02 (78.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [5.3.9] (55'-59'.77'-79'.116'-124')) (29'-134') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (180'), V101 (218') (135'-241')]; dimère (228-228":231-231")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa
immunostimulant, antinéoplasique

vilastobart inmunoglobulina G1-kappa con prodominio fusionado, anti-[*Homo sapiens* CTLA4 (proteína 4 asociada con los linfocitos T citotóxicos, CTLA-4, CD152)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma1 humanizada (1-449) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*08 (84.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.12] (26-33.51-58.97-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, D12, L14, G1v7 CH2 D3, E117 (CH1 K120 (216) (120-217), bisagra 1-15 (218-232), CH2 S3>D (241), I117>E (334) (233-342), CH3 D12 (358), L14 (360) (343-447), CHS (448-449)) (120-449)], (222-241')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada con prodominio fusionado (1'-241') [prodominio (1'-28') fusionado con V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV6-21*02 (78.5%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [5.3.9] (55'-59'.77'-79'.116'-124')) (29'-134') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (180'), V101 (218') (135'-241')]; dímero (228-228":231-231")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, forma glicosilada alfa
inmunoestimulante, antineoplásico

2760549-50-4

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SKASGYTFT NYFMNWRQA PGQGLEWMGR 50
VDPEQGRADY AEKFKKRVTI TADKSTSTAY MELSSLRSED TAVVYCARRA 100
MDNYGFAYWG QGTLVTSSA STKGFSVFPL APSKSTSGG TAALGCLVKD 150
YFPEPTVTSW NSGALTSGVH TFPFALQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY 200
ICNVNHPKPSN TKVDKKVEPK SCDKTHTCPP CPAPELLGGP DVFLFPKPK 250
DTLMISRTPE VTCVVDVSH EDPEVKENWY VDGVEVHNAK TKPREEQYNS 300
TYRVVSVLTV LHQDNLNGKE YKCKVSNKAL PAPEEKTISK AKGQPREPV 350
YTLPPSRDEL TKMQVSLTCL VKGFYPSDIA VEWESNGQPE NNYKTPPV 400
DSDGFFFLYS KLTVDKSRWQ QGNVFSCVM HEALHNHYTQ KSLSLSPGK 449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
ACPGKGLPSC GGGSSGGSGV PLSLYSGGEI VLTQSPDFQS VTPKEKVTIT 50
CSANSALSAM YWYQQKPDQS PKLWVHGTSN LAGVPSRFS GSGSGTDFTL 100
TINSLEAEDA ATYYCHWNSN TQWTFGGGKTK VEIKRTVAAP SVFIFPPSDE 150
QLKSGTASVV CLLNFFYPRE AKVQWQVDNA LQSGNSQESV TEQDSKDSY 200
SLSSTLTLSK ADYEKHKVYA CEVTHQGLSS PVTSKFNRRGE C 241

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 146-202 263-323 369-427
22"-96" 146"-202" 263"-323" 369"-427"
Intra-L prodomain 2'-10' 2"-10"
Intra-L (C23-C104) 51"-115" 161"-221"
51"-115" 161"-221"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 222-241' 222"-241"
Inter-H-H (h 11, h 14) 228-228" 231-231"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutamínilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxopropilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 299, 299"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 449, 449"

vimekofuspum #
vimekofusp

Vibrio cholerae L-methionyl-cholix toxin (exotoxin A, NAD(+)-diphthamide ADP-ribosyltransferase, EC: 2.4.2.36), fragment (1-386, 2-387 in the current sequence), variant (D³>E⁴, E⁴>A⁵), fused via peptide linker ³⁸⁸GGGGSGGGSGGGG⁴⁰¹ to human interleukin 10 (IL-10, cytokine synthesis inhibitory factor (CSIF)) (1-160, 402-561 in the current sequence), dimer, produced in *Escherichia coli*
interleukin-10 analogue, anti-inflammatory

vimékofusp

toxine L-méthionyl-cholix de *Vibrio cholerae* (exotoxine A, NAD(+)-diphthamide ADP-ribosyltransférase, EC: 2.4.2. 36), fragment (1-386, 2-387 dans la séquence actuelle), variant (D³>E⁴, E⁴>A⁵), fusionné via la liaison peptidique ³⁸⁸GGGGSGGGSGGGG⁴⁰¹ à l'interleukine 10 humaine (IL-10, facteur d'inhibition de la synthèse des cytokines (CSIF)) (1-160, 402-561 dans la séquence actuelle), dimère, produit chez *Escherichia coli*
analogue de l'interleukine 10, anti-inflammatoire

vimekofusp

toxina L-metionil-colix de *Vibrio cholerae* (exotoxina A, NAD(+)-diftamida ADP-ribosiltransferasa, EC: 2.4.2.36), fragmento (1-386, 2-387 en la secuencia actual), variante (D³>E⁴, E⁴>A⁵), fusionado a través de un enlace peptídico ³⁸⁸GGGGSGGGSGGGG⁴⁰¹ a la interleukina 10 humana (IL-10, factor inhibidor de la síntesis de citocina (CSIF)) (1-160, 402-561 en la secuencia actual), dímero, producido en *Escherichia coli*
análogo de la interleukina 10, antiinflamatorio

2771192-33-5

Sequence / Séquence / Secuencia	
MVEEALNIFD ECRSPCSLTP EPGKPIQSKL SIPSDVVLDE GVLYYSMNTIN	50
DEQNDIKDED KGESIITIGE FATVRATRHY VNQDAPFGVI HLDITTENG	100
KTYSYNRKEG EFAINWLVIPI GEDSPASIKI SVDELDQQRN IIEVPKLYSI	150
DLNQTLQW KTQGNVSFSV TRPEHNIAIS WPSVSYKAAQ KEGSRHKRWA	200
HHWTGLALCW LVFMDAIYNY ITQONCTLGD NWFGGSYETV AGTPKVITVK	250
QGIEQKPFVEQ RIHFSKGNAM SALAAHRVCG VPLETLARSR KPRDLTDDL	300
CAYQAQNIYS LFAVTRILFS HLDVFTLNL DEQEPEVAER LSDLRNINEN	350
NPGMVTQVLT VARQIYNDYV THHPGLTPEQ TSAGAQAAGGG GSGGGSGGGG	400
GSPGGGTQSE NSCTHFPENL PNMLRDLRDA FSRVKTFFQM KDQLDNLK	450
ESLLEDFKGY LGCQALSEMI QFYLEEVMPPQ AENQDPDIKA HVNSLGENLK	500
TLRLRLRRCH RFLPCENKSK AVEQVKNAPN KLQEKGIYKA MSEFDIFINY	550
IEAYMTMKIR N	561

Mutation / Mutation / Mutación
N-L-methionyl added (M¹), D³>E⁴, E⁴>A⁵

Peptide linker / Peptide liant / Péptido de unión
³⁸⁸GGGGSGGGSGGGG⁴⁰¹

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-chain: 12-16, 209-226, 279-301, 413-509, 463-515,
12'-16', 209'-226', 279'-301', 413'-509', 463'-515'

vipalanebartum #
vipalanebart

immunoglobulin G4-kappa, anti-[*Homo sapiens* ADCYAP1 (adenylate cyclase-activating polypeptide 1, pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide, PACAP)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;

	gamma4 heavy chain <i>Homo sapiens</i> (1-449) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123)-<i>Homo sapiens</i> IGHG4*01, G4v5 h P10,nG4m(a) CH2 L92, G4v4 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 (124-221), hinge 1-12 S10>P (231) (222-233), CH2 F1.3>A (237), L1.2>A (238), L92 (312) (234-343), CH3 (344-448), CHS K2>del (449)) (124-449)], (137-214')-disulfide with kappa light chain <i>Homo sapiens</i> (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (87.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (229-229":232-232")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, glycoform alfa <i>antimigraine</i>
vipalanebart	immunoglobuline G4-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> ADCYAP1 (polypeptide 1 activant l'adénylate cyclase, polypeptide activant l'adénylate cyclase pituitaire, PACAP)], anticorps monoclonal <i>Homo sapiens</i>; chaîne lourde gamma4 <i>Homo sapiens</i> (1-449) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123)-<i>Homo sapiens</i> IGHG4*01, G4v5 h P10,nG4m(a) CH2 L92, G4v4 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 (124-221), charnière 1-12 S10>P (231) (222-233), CH2 F1.3>A (237), L1.2>A (238), L92 (312) (234-343), CH3 (344-448), CHS K2>del (449)) (124-449)], (137-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa <i>Homo sapiens</i> (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (87.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (229-229":232-232")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa <i>antimigraineux</i>
vipalanebart	inmunoglobulina G4-kappa, anti-[<i>Homo sapiens</i> ADCYAP1 (polipéptido 1 activador de la adenilato ciclase, polipéptido activador de la adenilato ciclase pituitaria, PACAP)], anticuerpo monoclonal <i>Homo sapiens</i>; cadena pesada gamma4 <i>Homo sapiens</i> (1-449) [VH (<i>Homo sapiens</i> IGHV3-23*01 (93.9%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123)-<i>Homo sapiens</i> IGHG4*01, G4v5 h P10,nG4m(a) CH2 L92, G4v4 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 (124-221), bisagra 1-12 S10>P (231) (222-233), CH2 F1.3>A (237), L1.2>A (238), L92 (312) (234-343), CH3 (344-448), CHS K2>del (449)) (124-449)], (137-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa <i>Homo sapiens</i> (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (87.8%) -IGKJ4*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -<i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (229-229":232-232")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, forma glicosilada alfa <i>antimigraña</i>

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada				
EVQLLES	GGG	LVQPGGS	LRL	SCASGFTFS
ISL	SGGSTYY	AASHKGR	ETI	SRDNSKNTLY
GASTHNY	YGM	DVWGQGT	MVT	VSSASTKGFS
LVKDY	FFPEV	TVSNWS	GALT	SGVHTFPAVL
TKTYTC	NVDH	KPSNTK	VDKR	VESKYGPPCP
KDTLMI	SRTP	EVT	CVV	DVS QEDPEVQFNW
STYRV	SVLT	VLHQD	WLNGK	EYKCKVSNKG
VYTL	FP	QEE	MTKNQ	VS
LDS	DSGFFLY	SRLT	VDKSRW	QEGNVFSCSV
				MHEALHNHYT
				QKSLSLSLG
				449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera				
DIQMTQ	SPSS	LSASV	GDRVT	ITCRASQSIW
ASQLF	EGVPS	RFGSG	SGSDT	FTFTISLQ
GTKVEI	KRTV	AAPSV	FIFPP	SDEQLKSGTA
DNALQ	SGNSQ	ESVTE	QDSKD	STYLSLSTLT
LSSP	VTKSFN	RGEC		
				214

Post-translational modifications				
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro				
Intra-H (C23-C104)	22-96	150-206	264-324	370-428
	22"-96"	150"-206"	264"-324"	370"-428"
Intra-L (C23-C104)	23"-88"	134"-194"		
	23"-88"	134"-194"		
Inter-H-L (CH1 10-CL 126)	137-214	137"-214"		
Inter-H-H (h 8, h 11)	229-229"	232-232"		

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 300, 300"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires
complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados.

visepegenatidum
visepegenatide

L-histidylglycyl-L-α-glutamylglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-seryl-L-lysyl-L-glutaminy-L-methionyl-L-α-glutamyl-L-α-glutamyl-L-α-glutamyl-L-alanyl-L-valyl-L-arginyl-L-leucyl-L-phenylalanyl-L-isoleucyl-L-α-glutamyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-lysyl-L-asparaginyglycylglycyl-L-prolyl-L-seryl-L-serylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-S-[(3Ξ)-1-3-[(α-methylpoly(oxyethylene)-ω-yloxy)propyl)amino]-3-oxopropyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]-L-cysteinamide
glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist

visépégénatide

L-histidylglycyl-L-α-glutamylglycyl-L-thréonyl-L-phénylalanyl-L-thréonyl-L-séryl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-séryl-L-lysyl-L-glutaminy-L-méthionyl-L-α-glutamyl-L-α-glutamyl-L-α-glutamyl-L-alanyl-L-valyl-L-arginyl-L-leucyl-L-phénylalanyl-L-isoleucyl-L-α-glutamyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-lysyl-L-asparaginyglycylglycyl-L-prolyl-L-séryl-L-sérylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-S-[(3Ξ)-1-3-[(α-méthylpoly(oxyéthylène)-ω-yloxy)propyl)amino]-3-oxopropyl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]-L-cystéinamide
agoniste du récepteur au peptide-1 d'action type glucagon (GLP-1)

visepegenatida


L-histidilglicil-L-α-glutamilglicil-L-treonil-L-fenilalanil-L-treonil-L-seril-L-α-aspartil-L-leucil-L-seril-L-lisil-L-glutaminil-L-metionil-L-α-glutamil-L-α-glutamil-L-α-glutamil-L-alanil-L-valil-L-arginil-L-leucil-fenilalanil-L-isoleucil-L-α-glutamil-L-triptofil-L-leucil-L-lisil-L-asparaginilglicilglicil-L-prolil-L-seril-L-serilglicil-L-alanil-L-prolil-L-prolil-L-prolil-S-[(3Ξ)-1-3-[(α-metilpoli(oxietileno)-ω-il]oxi)propil)amino]-3-oxopropil]-2,5-dioxopirrolidin-3-il]-L-cisteinamida
agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1)

$C_{195}H_{298}N_{52}O_{63}S_2(C_2H_4O)_n$

2641081-54-9

HGEFTFTSDL SKQMEEEAVR LFIEWLKNGG PSSGAPPPC 39

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados

**vorbipiprantum**

vorbipiprant

rac-(5⁵*R*)-4-oxo-7⁴-trifluoromethyl-3,5⁶-diaz-1,7(1)-dibenzena-5(5,6)-spiro[2.5]octana-2(1,1)-cyclopropanaheptaphane-1⁴-carboxylic acid
prostaglandin receptor antagonist

vorbipiprant


acide *rac*-(5⁵*R*)-4-oxo-7⁴-trifluorométhyl-3,5⁶-diaz-1,7(1)-dibenzéna-5(5,6)-spiro[2.5]octana-2(1,1)-cyclopropanaheptaphane-1⁴-carboxylique
antagoniste du récepteur des prostaglandines

vorbipiprant

ácido *rac*-(5⁵*R*)-4-oxo-7⁴-trifluorometil-3,5⁶-diaz-1,7(1)-dibencena-5(5,6)-spiro[2.5]octana-2(1,1)-ciclopropanaheptafano-1⁴-carboxílico
antagonista del receptor de las prostaglandinas

 $C_{26}H_{27}F_3N_2O_3$

1417742-86-9

**votoplamum**

votoplam

2-[3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]pyridazin-6-yl]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)phenol
gene splicing modulator (Huntington's disease)

votoplam


2-[3-(2,2,6,6-tétraméthylpipéridin-4-yl)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]pyridazin-6-yl]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)phénol
modulateur d'épissage de gène (maladie de Huntington)

votoplam

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol
modulador del empalme génico (enfermedad de Huntington)

C₂₁H₂₅N₉O

2407849-89-0



xirestomigum #
 xirestomig

immunoglobulin G1-scFv_{L2} dimer, anti-[*Homo sapiens* CD274 (programmed cell death 1 ligand 1, PDL1, PD-L1, B7 homolog 1, B7H1, B7-H1, PDCD1LG1) and anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (TNF receptor superfamily member 9, 4-1BB, T cell antigen ILA, CD137)], *Homo sapiens* monoclonal antibody, bispecific;
 G1-scFv fused heavy chain *Homo sapiens* (1-713) [gamma1 heavy chain anti-CD274 *Homo sapiens* (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*04 (96.9%) - (IGHD) - IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1-121)-*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120>K (218) (122-219), hinge 1-15 (220-234), CH2 N84.4>A (301)(235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449)) (122-449)] -15-mer tris(tetraglycyl-seryl) linker (450-464) -scFv heavy-lambda anti-TNFRSF9 *Homo sapiens* (465-713) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (99.0%) -IGHD -IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (490-497.515-522.561-573)) (465-587) -15-mer tris(tetraglycyl-seryl) linker (588-602) -V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-44*01 (95.9%) -IGLJ1*01 (91.7%) V124>L (709), CDR-IMGT [8.3.11] (628-635.653-655.692-702)) (603-713)], (224-216')-disulfide with lambda2 light chain anti-CD274 *Homo sapiens* (1'-217') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV2-14*03 (92.7%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [9.3.11] (26'-34'.52'-54'.91'-101')) (1'-111') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (112'-217')]; dimer (230-230":233-233")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, non-glycosylated
immunostimulant, antineoplastic

xirestomig

immunoglobuline G1-scFv_{L2} dimère, anti-[*Homo sapiens* CD274 (ligand 1 de mort cellulaire programmée 1,PDL1, PD-L1, B7 homologue 1, B7H1, B7-H1, PDCD1LG1) and anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (membre 9 de la superfamille des récepteurs du TNF, 4-1BB, antigène ILA des cellules T, CD137)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*, bispécifique;

xirestomig

cadena pesada fusionada G1-scFv *Homo sapiens* (1-713) [cadena pesada gamma1 anti-CD274 *Homo sapiens* (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*04 (96.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110))] (1-121)-*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120>K (218) (122-219), charnière 1-15 (220-234), CH2 N84.4>A (301) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449)) (122-449)] - 15-mer tris(tétraglicil-séryl) linker (450-464) -scFv heavy-lambda anti-TNFRSF9 *Homo sapiens* (465-713)[VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (99.0%) -IGHD -IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (490-497.515-522.561-573)) (465-587) -15-mer tris(tétraglicil-séryl) linker (588-602) -V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-44*01 (95.9%) -IGLJ1*01 (91.7%) V124>L (709), CDR-IMGT [8.3.11] (628-635.653-655.692-702)) (603-713)], (224-216')-disulfuro avec la chaîne légère lambda2 anti-CD274 *Homo sapiens* (1'-217') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV2-14*03 (92.7%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [9.3.11] (26'-34'.52'-54'.91'-101')) (1'-111') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (112'-217'))]; dimère (230-230'':233-233'')-bisdisulfuro, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, non-glycosylé
immunostimulant, antinéoplasique

inmunoglobulina G1-scFv_L2 dímero, anti-[*Homo sapiens* CD274 (ligando 1 de muerte celular programada 1, PDL1, PD-L1, B7 homólogo 1, B7H1, B7-H1, PDCD1LG1) y anti-[*Homo sapiens* TNFRSF9 (miembro 9 de la superfamilia de los receptores del TNF, 4-1BB, antígeno ILA de las células T, CD137)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*, biespecífico; cadena pesada fusionada G1-scFv *Homo sapiens* (1-713) [cadena pesada gamma1 anti-CD274 *Homo sapiens* (1-448) [VH (*Homo sapiens* IGHV1-69*04 (96.9%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110))] (1-121)-*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, CH1 K120, CH3 E12, M14, G1v29 CH2 A84.4 (CH1 R120>K (218) (122-219), bisagra 1-15 (220-234), CH2 N84.4>A (301) (235-344), CH3 E12 (360), M14 (362) (345-449)) (122-449)] - 15-mer tris(tétraglicil-seril) enlace (450-464) -scFv pesada-lambda anti-TNFRSF9 *Homo sapiens* (465-713)[VH (*Homo sapiens* IGHV3-23*04 (99.0%) -IGHD -IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [8.8.13] (490-497.515-522.561-573)) (465-587) -15-mer tris(tétraglicil-seril) enlace (588-602) -V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-44*01 (95.9%) -IGLJ1*01 (91.7%) V124>L (709), CDR-IMGT [8.3.11] (628-635.653-655.692-702)) (603-713)], (224-216')-disulfuro con la cadena ligera lambda2 anti-CD274 *Homo sapiens* (1'-217') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV2-14*03 (92.7%) -IGLJ2*01 (100%), CDR-IMGT [9.3.11] (26'-34'.52'-54'.91'-101')) (1'-111') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (112'-217'))]; dímero (230-230'':233-233'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, no glicosilado
inmunoestimulante, antineoplásico

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada: anti-CD274 G1 - anti-TNFRSF9 scFv
QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASRGPF S TYAISWVRQA PGQGLEWMGR 50
IIPILGLIANY AQKFQGRVTI TADKSTSTAY MELSSLSRSED TAVYYCARTM 100
EGYGFGNFDY WGQGTILVTVS SASTKGPSVF PLAPSSKSTS GGTAALGCLV 150
KDYFFPEPTV SWNSGALTSG VHTFPAVLQS SGLYSLSSVV TFPSSSLGTQ 200
TYICNVNHKP SNTKVDKKVE PKSCDKTHTC PPCPAPELLG GPSVFLFPPK 250
PKDTLMISRT PEVTCVVDV SHEDPEVKFN WYVDGVEVHN AKTKPREEQY 300
ASTYRVVSVL TVLHQDWLNG KEYKCKVSNK ALPAPIEIKTI SKAKGQPREP 350
QVYTLFPFSRE EMTKNQVSLT CLVKGIFYPSD IAVEWESNGQ PENNYKTPP 400
VLDSGDSFFL YSKLTVDKSR WQQGNVFSCS VMHEALHNHY TQKSLSLSPG 450
GGSGGGGGSG GGSQVQLVE SGGGLVQPGG SLRLSCAASG FTFSSYAMSW 500
VRQAPGKGLE WWSAISGSGG STYYADSVKG RFTISRDNK NTLYLQMNSL 550
RAEDTAVYYC AKTNWGPSDA FDIWGQTMV TVSSASTGGG GSGGGSGGG 600
GSQSVLTQPP SASGTPGQRV TISCSGSTSD IGSYSVNWYQ QLPGTAPKLL 650
IYSNNQRPSG VPDRFSGSKS GTSASLAISG LQSEDEADYY CAAWDDSLNG 700
YVFGTGTKLT VLG 713

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera: anti-CD274 L2
QSALTQSPASV SGSPGQSITI SCTGTVSEVG GYNEVSWYQQ HPGKAPKLM 50
YGNNSNRPSGV SNRFGSGKSG NTASLTISGL QAEDEADYYC QSYDSSLSGT 100
VFGGTTKLTIV LGQPKAAPS V TLFPPSSSEEL QANKATLVCL ISDFYPAVT 150
VAWKADSSPV KAGVETTPS KQSNKNYAAS SYLSLTPEQW KSHRSYSQCV 200
THEGSTVEKT VAPTECS 217

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22"-96 148"-204 265"-325 371"-429
22"-96" 148"-204" 265"-325" 371"-429"
486"-560 624"-691
486"-560" 624"-691"
Intra-L (C23-C104) 22"-90" 139"-198"
22"-90" 139"-198"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 224"-216" 224"-216"
Inter-H-H (h 11, h 14) 230"-230" 233"-233"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"
L VL V-LAMBDA Q1: 1', 1"

No N-glycosylation sites / pas de sites de N-glycosylation / ninguna posición de N-glicosilación
H CH2 N84.4>A (G1v29): 301, 301"

zalferminum #
zalfermin

human L-alanyl fibroblast growth factor 21 (FGF-21), variant (N¹²¹>Q¹²², M¹⁶⁸>L¹⁶⁹, A¹⁸⁰>C¹⁸¹), produced in *Escherichia coli*, substituted at the sulfur atom of L-cysteinyl residue 180 (C¹⁸¹ in the current sequence) with (28S)-28,46-dicarboxy-2,7,16,25,30-pentaoxo-9,12,18,21-tetraoxa-3,6,15,24,29-pentaazahexatetracontan-1-yl group
fibroblast growth factor

zalfermine

L-alanyl facteur de croissance des fibroblastes 21 (FGF-21) humain, variant (N¹²¹>Q¹²², M¹⁶⁸>L¹⁶⁹, A¹⁸⁰>C¹⁸¹), produit chez *Escherichia coli*, substitué sur l'atome de soufre du résidu L-cystéinyle 180 (C¹⁸¹ dans la séquence actuelle) par le groupe (28S)-28,46-dicarboxy-2,7,16,25,30-pentaoxo-9,12,18,21-tétraoxa-3,6,15,24,29-pentaazahexatetracontan-1-yle
facteur de croissance des fibroblastes

zalfermina

L-alanil factor de crecimiento de los fibroblastos 21 (FGF-21) humano, variante (N¹²¹>Q¹²², M¹⁶⁸>L¹⁶⁹, A¹⁸⁰>C¹⁸¹), producido en *Escherichia coli*, substituido en el átomo de azufre del residuo L-cisteinil residuo 180 (C¹⁸¹ en la secuencia actual) con el grupo (28S)-28,46-dicarboxi-2,7,16,25,30-pentaoxo-9,12,18,21-tetraoxa-3,6,15,24,29-pentaazahexatetracontan-1-ilo
factor de crecimiento de los fibroblastos


1958040-66-8

Sequence / Séquence / Secuencia	
<u>A</u> HPIDSSPL LQFGGQVRQR YLYTDDAQQT EAHLEIREDG TVGGAADQSP	50
ESLLQLKALK PGVIQILGVK TSRFLCQRPD GALYGSLHFD PEACSFRELL	100
LEDGYNVYQS EAHGLPLHLPG <u>Q</u> KSPHRDPA PRGPARFLPL PGLPPALPEP	150
PGILAPQFPD VGSSDPLS <u>L</u> V GPSQGRSPSY <u>C</u> S	182

Mutation / Mutation / Mutación
N-L-alanyl added (A¹), N¹²¹->Q¹²², M¹⁶⁸->L¹⁶⁹, A¹⁸⁰->C¹⁸¹

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
76-94

Modified residue / Résidu modifié / Resto modificado
C181:



zalogananum
zaloganan

L-arginyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-valyl-L-arginyl-L-arginyl-L-valyl-L-arginyl-L-arginyl-L-valyl-L-tryptophyl-L-arginyl-L-arginyl-L-valyl-L-valyl-L-arginyl-L-valyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-valyl-L-arginyl-L-argininamide
antibacterial

zaloganan

L-arginyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-valyl-L-arginyl-L-arginyl-L-valyl-L-arginyl-L-arginyl-L-valyl-L-tryptophyl-L-arginyl-L-arginyl-L-valyl-L-valyl-L-arginyl-L-arginyl-L-tryptophyl-L-valyl-L-arginyl-L-argininamide
antibactérien


zaloganán

L-arginil-L-arginil-L-triptofil-L-valil-L-arginil-L-arginil-L-valil-L-arginil-L-arginil-L-valil-L-triptofil-L-arginil-L-arginil-L-valil-L-valil-L-arginil-L-valil-L-arginil-L-triptofil-L-valil-L-arginil-L-argininamida
antibacteriano

C₁₅₁H₂₆₁N₆₇O₂₄ 2759007-66-2

RRWVRRVRRV WRRVVRRVRR WVRR 24

Modified residue / Résidu modifié / Resto modificado



zamaporvintum
zamaporvint

2-{5-methyl-4-[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]-1H-imidazol-1-yl}-N-[5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl]acetamide
Wnt pathway inhibitor, antineoplastic

zamaporvint


2-{5-méthyl-4-[2-(trifluorométhyl)pyridin-4-yl]-1H-imidazol-1-yl}-N-[5-(pyrazin-2-yl)pyridin-2-yl]acétamide
inhibiteur de la voie Wnt, antinéoplasique

zamaporvint

2-[5-metil-4-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]-1H-imidazol-1-il]-N-[5-(pirazin-2-il)piridin-2-il]acetamida
inhibidor de la vía Wnt, antineoplásico

C₂₁H₁₆F₃N₇O

1900754-56-4

**zelatriazinum**

zelatriazin

2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)-N-((1S)-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethyl)acetamide
G protein-coupled receptor 139 (GPR139) agonist

zélatriazine


2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)-N-((1S)-1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]éthyl)acétamide
agoniste du récepteur 139 couplé à la protéine G (GPR139)

zelatriazina

2-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)-N-((1S)-1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil)acetamida
agonista del receptor 139 acoplado a proteína G (GPR139)

C₁₈H₁₅F₃N₄O₃

1929519-13-0

**zelecimentum #**

zeleciment

immunoglobulin Fab-G1kappa (VH-CH1 L-kappa), anti-[*Homo sapiens* TFRC (transferrin receptor, TfR1, TFR1, CD71)], monoclonal antibody;
 Fab-G1 VH-CH1 chain (1-227) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV3-6*01 (84.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (85.7%) L124>V (115)/*Homo sapiens* IGHV4-30*01 (82.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [9.7.12] (26-34.52-58.97-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-h (100%), G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (216) (120-217), hinge 1-10 (218-227)) (120-227)], (222-214')-disulfide with L-kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.51-53.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')], produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, non-glycosylated
transferrin receptor binding protein

zéléciment	immunoglobuline Fab-G1kappa (VH-CH1_L-kappa), anti-[<i>Homo sapiens</i> TFRC (récepteur de la transferrine, Tfr1, TFR1, CD71)], anticorps monoclonal; chaîne Fab-G1 VH-CH1 (1-227) [VH Musmus/Homsap (<i>Mus musculus</i> IGHV3-6*01 (84.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (85.7%) L124>V (115)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV4-30-4*01 (82.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [9.7.12] (26-34.52-58.97-108)) (1-119) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*01 CH1-h (100%), (CH1 G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (216) (120-217), charnière 1-10 (218-227)) (120-227)], (222-214')-disulfure avec la chaîne légère L-kappa (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.51-53.89-97)) (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')], produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, non-glycosylé <i>protéine de liaison du récepteur de la transferrine</i>
zeleciment	inmunoglobulina Fab-G1kappa (VH-CH1_L-kappa), anti-[<i>Homo sapiens</i> TFRC (receptor de la transferrina, Tfr1, TFR1, CD71)], anticuerpo monoclonal; cadena Fab-G1 VH-CH1 (1-227) [VH Musmus/Homsap (<i>Mus musculus</i> IGHV3-6*01 (84.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (85.7%) L124>V (115)/ <i>Homo sapiens</i> IGHV4-30-4*01 (82.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [9.7.12] (26-34.52-58.97-108)) (1-119) - <i>Homo sapiens</i> IGHG1*01 CH1-h (100%), (CH1 G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (216) (120-217), bisagra 1-10 (218-227)) (120-227)], (222-214')-disulfuro con la cadena ligera L-kappa (1'-214') [V-KAPPA (<i>Homo sapiens</i> IGKV1-39*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.51-53.89-97)) (1'-107') - <i>Homo sapiens</i> IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')], producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, no glicosilado <i>proteína de unión al receptor de la transferrina</i>
2725863-34-1	

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

QVQLQESGPG LVKPSQTL	SL TCTVTGYSIT	SGYYWNWIRQ	PPGKGLEWIG	50
YITFDGANNY	NPSLKNRVS	I SRDTSKNQFS	LKLSSVTAED	TATYYCTRSS 100
YDYDVL	DYWG QGTTVT	VSSA STKGPSV	FPL APSSKSTSGG	TAALGCLVKD 150
YFPEPVT	VS	NSGALTSGVH	TFFAVLQSSG	LYSLSSVVTV PSSSLGTQTY 200
ICNVNHKPSN	TKVDKKVEPK	SCDKTHT		227

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS	LSASVGD	RVT ITCRASQDIS	NFLN	WYQQKP	GQPVKLLIYY	50
TSRLHSGVPS	RFGSGSGTD	FTLTIS	LQF EDFATYYCQ	GHTLPYTFGQ	100	
GTKLEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLN	NFY PREAKVQW	KV 150	
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYSL	SLTL LSKADYEKHK	VYACEVTHQG	200	
LSSPVTKSFN	RGEC				214	

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-96 146-202

Intra-L (C23-C104) 23'-88' 134'-194'

Inter-H-L (h 5-CL 126) 222-214'

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxopropilo)

H VH Q1: 1

zelecimentum basivarsenum #

zeleciment basivarsen

immunoglobulin Fab G1-kappa (VH-CH1_L-kappa), anti-[*Homo sapiens* TFRC (transferrin receptor, Tfr1, TFR1, CD71)], monoclonal antibody; substituted at N^o of lysine residues with *basivarsen* groups;
 Fab-G1 VH-CH1 heavy chain (1-227) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV3-6*01 (84.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (85.7%) L124>V (115)/*Homo sapiens* IGHV4-30-4*01 (82.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [9.7.12] (26-34.52-58.97-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%) CH1-h (100%), G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (216) (120-217), hinge 1-10 (218-227)) (120-227)], (222-214')-disulfide with L-kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.51-53.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')], produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, non-glycosylated; substituted at N^o of 1 to 3 L-lysine residues with 1-{{(5aRS,6SR,6aSR)-1-[(6S,9S)-1-amino-6-{{4-{{[(6-{{all-*P*-ambo-2'-O,4'-C-methylene-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-5-methyl-2'-O,4'-C-methylene-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-O-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-O-(2-methoxyethyl)-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-5-methyl-2'-O-(2-methoxyethyl)-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-O-(2-methoxyethyl)-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-2'-O,4'-C-methylene-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-5-methyl-2'-O,4'-C-methylene-5'-cytidylyl[oxy]hexyl)carbamoyl[oxy]methyl)phenyl]carbamoyl}-1,8,11-trioxo-9-(propan-2-yl)-14,17,20-trioxa-2,7,10-triazadocosan-22-yl]-1,4,5,5a,6,6a,7,8-octahydrocyclopropa[5,6]cycloocta[1,2-*d*][1,2,3]triazol-6-yl]-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azanonadecan-19-oyl (basivarsen) groups
myotonic dystrophy protein kinase synthesis reducer

zéléciment basivarsen

immunoglobuline Fab-G1kappa (VH-CH1_L-kappa), anti-[*Homo sapiens* TFRC (récepteur de la transferrine, TFR1, TFR1, CD71)], anticorps monoclonal; conjugué sur les résidus lysine avec des groupes *basivarsen*;
 chaîne Fab-G1 VH-CH1(1-227) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV3-6*01 (84.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (85.7%) L124>V (115)/*Homo sapiens* IGHV4-30-4*01 (82.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [9.7.12] (26-34.52-58.97-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-h (100%), G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (216) (120-217), charnière 1-10 (218-227)) (120-217)], (222-214')-disulfure avec la chaîne légère L-kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.51-53.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')], produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, non-glycosylé; substitué en N^o de 1 à 3 résidus L-lysine avec


un groupe 1-[(5aRS,6SR,6aSR)-1-[(6S,9S)-1-amino-6-[[4-([[(6-[[[*tout-P-ambo-2'-O,4'-C-méthylène-P-thioadénylyl*-(5'→3')-5-méthyl-2'-O,4'-C-méthylène-*P-thiocytidylyl*-(5'→3')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P-thiouridylyl*-(5'→3')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-*P-thioguanilyl*-(5'→3')-2'-désoxy-*P-thioadénylyl*-(5'→3')-2'-désoxy-*P-thiocytidylyl*-(5'→3')-2'-désoxy-*P-thiocytidylyl*-(5'→3')-2'-désoxy-*P-thioadénylyl*-(5'→3')-2'-désoxy-*P-thiocytidylyl*-(5'→3')-2'-désoxy-*P-thiocytidylyl*-(5'→3')-2'-désoxy-*P-thioguanilyl*-(5'→3')-5-méthyl-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-*P-thiocytidylyl*-(5'→3')-2'-O-(2-méthoxyéthyl)-*P-thioguanilyl*-(5'→3')-2'-O,4'-C-méthylène-*P-thioadénylyl*-(5'→3')-5-méthyl-2'-O,4'-C-méthylène-5'-cytidyl[oxy]hexyl)carbamoyle[oxy]méthyl)phényl]carbamoyle]-1,8,11-trioxa-9-(propan-2-yl)-14,17,20-trioxa-2,7,10-triazadocosan-22-yl]-1,4,5,5a,6,6a,7,8-octahidrocyclopropa[5,6]cicloocta[1,2-*d*][1,2,3]triazol-6-yl]-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azanonadécane-19-oyle (*basivarsén*)
réducteur de la synthèse de la protéine kinase de la dystrophie myotonique

zeleciment basivarsén

inmunoglobulina Fab-G1 kappa (VH-CH1_L-kappa), anti-[*Homo sapiens* TFRC (receptor de la transferrina, Tfr1, TFR1, CD71)], anticuerpo monoclonal; conjugado con residuos de lisina con grupos *basivarsén*; cadena Fab-G1 VH-CH1(1-227) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV3-6*01 (84.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (85.7%) L124>V (115)/*Homo sapiens* IGHV4-30-4*01 (82.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [9.7.12] (26-34.52-58.97-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-h (100%), G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (216) (120-217), bisagra 1-10 (218-227)) (120-217)], (222-214')-disulfuro con la cadena ligera L-kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.51-53.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')], producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, no glicosilado; substituido en N° de 1 a 3 L-residuos de lisina con grupo 1-[(5aRS,6SR,6aSR)-1-[(6S,9S)-1-amino-6-[[4-([[(6-[[[*todo-P-ambo-2'-O,4'-C-metileno-P-tioadenilil*-(5'→3')-5-metil-2'-O,4'-C-metileno-*P-tiocitidilil*-(5'→3')-2'-O-(2-metoxietil)-5-metil-*P-tiouridilil*-(5'→3')-2'-O-(2-metoxietil)-*P-tioguanilil*-(5'→3')-2'-deoxi-*P-tioadenilil*-(5'→3')-2'-deoxi-*P-tiocitidilil*-(5'→3')-2'-deoxi-*P-tiocitidilil*-(5'→3')-2'-deoxi-*P-tiocitidilil*-(5'→3')-2'-deoxi-*P-tiocitidilil*-(5'→3')-2'-deoxi-*P-tiocitidilil*-(5'→3')-2'-deoxi-*P-tioguanilil*-(5'→3')-5-metil-2'-O-(2-metoxietil)-*P-tiocitidilil*-(5'→3')-2'-O-(2-metoxietil)-*P-tioguanilil*-(5'→3')-2'-O,4'-C-metileno-*P-tioadenilil*-(5'→3')-5-metil-2'-O,4'-C-metileno-5'-citidil[oxy]hexil)carbamoyle[oxy]metil)fenil]carbamoyle]-1,8,11-trioxa-9-(propan-2-il)-14,17,20-trioxa-2,7,10-triazadocosan-22-il]-1,4,5,5a,6,6a,7,8-octahidrociclopropa[5,6]cicloocta[1,2-*d*][1,2,3]triazol-6-il]-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azanonadecan-19-oilo (*basivarsén*)
reductor de la síntesis de la proteína kinase de la distrofia miotónica


2767191-74-0

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada		
QVQLQESGPG	LVKPSQTL	SL TCTVTGYSIT SGYYWNWIRQ PPGKGLEWIG 50
YITFDGANNY	NPSLKNR	SVI SRDTSKNQFS LKLSSTVAED TATYICTRSS 100
YDYDVL	DYWG QGTTVT	VSSA STKGPSVFPL APSSKSTSGG TALGCLVKD 150
YFPEPVT	TSWV NSGALT	SGVH TFAVLQSSG LYSLSSTVTV PSSSLGTQTY 200
ICNVNHK	PSN TKVDKK	VEPK SCDKTHT 227
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera		
DIQMTQSPSS	LSASVGD	RVT ITCRASQDIS NFLNWWYQKP GQPKLLIYY 50
TSRLHSGVPS	RFGSGSG	STD FTLTISLQP EDFATYCYQQ GHTLPYTFGQ 100
GTKLEIKRTV	AAPSVFI	FPP SDEQLKSGTA SVVCLNNFY PREAKVQMKV 150
DNALQSGNSQ	ESVTEQ	DSKD STYLSSTLT LSKADYKHK VYACEVTHQG 200
LSSPYTKSFN	RGEC	214
Post-translational modifications / Modifications post-traductionnelles / Modificaciones postraduccionales		
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / posiciones de los puentes disulfuro		
Intra-H 22-96 146-202 22"-96" 146"-202"		
Intra-L 23"-88" 134"-194" 23"-88" 134"-194"		
Inter-H-L 222-214" 222"-214"		
N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal 1,1"		
Potential modified residues / résidus modifiés potentiels / restos modificados potenciales*		
K		
*(basivarsen:mAb ~ 2:1)		



R2: $\text{---}[(3'-5')(P\text{-thio})(m^5C_A\text{-Gmoe-}m^5C\text{moe-dG-dC-dC-dA-dC-dC-dA-Gmoe-}m^5U\text{moe-}m^5C_A)]$

N: nucleoside / nucléoside / nucleósido
dN: 2'-deoxy-N / 2'-désoxy-N / 2'-desoxi-N
m⁵N: 5-methyl-N / 5-méthyl-N / 5-metil-N
Nmo: 2'-O-(2-methoxyethyl)-N / 2'-O-(2-méthoxyéthyl)-N / 2'-O-(2-metoxietil)-N



zelecimentum rostudirsenum #
zeleciment rostudirsen

immunoglobulin Fab-G1kappa (VH-CH1_L-kappa), anti-[*Homo sapiens* TFRC (transferrin receptor, Tfr1, TFR1, CD71)], monoclonal antibody, conjugated at lysine residues with *rostudirsen* groups;
Fab-G1 VH-CH1 chain (1-227) [VH Musmus/Homsap (*Mus musculus* IGHV3-6*01 (84.5%) -(IGHD) -IGHJ2*01 (85.7%) L124>V (115)/*Homo sapiens* IGHV4-30-4*01 (82.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (85.7%) L123>T (114), CDR-IMGT [9.7.12] (26-34.52-58.97-108)) (1-119) -*Homo sapiens* IGHG1*01 CH1-h (100%), G1m17 CH1 K120 (CH1 K120 (216) (120-217), hinge 1-10 (218-227)) (120-217)], (222-214')-disulfide with L-kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-39*01 (85.3%) -IGKJ2*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.51-53.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')], produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, non-glycosylated; substituted at N° of 1 to 3 L-lysine residues with 1-((5aRS,6SR,6aSR)-1-[(6S,9S)-6-[[4-[[6-[(4-[[4-[[all-P-ambo-2'-N-acetyl[2',3'-azanediyl-P,2',3'-trideoxy-P-(dimethylamino)-2',3'-seco](5'→2'-N)(GATCTTTACG GTAGAAGGAA CTACAACCTC-5'-O)](dimethylamino)phosphoryl]piperazin-1-yl)-6-[(2-amino-2-oxoethyl)(methyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)oxy]hexyl]carbamoyl]oxy)methyl]phenyl]carbamoyl]-1-amino-

2725863-42-1

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada		
QVQLQESGPG	LVKPSQTL	SL TCTVTGYSIT SGYYNWIRQ PPGKLEWIG 50
YITFDGANNY	NPSLKNRVS	I SRDTSKNQFS LKLSVTAED TATYCTRSS 100
YDYLVDLYWG	QGTITVTSSA	STKGPSVPEL APSSKSTSGG TAAIGCLVKD 150
YFPEPVTISW	NSGALTSGVH	TFFAVLQSSG LYSLSVVTV PSSSLGTQTY 200
ICNVNHKPSN	TKVDKKVEPK	SCDKTHT 227

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera		
DIQMTQSPSS	LSASVGDRTV	ITCRASQDIS NFLNYYQKP GQPVKLLIYY 50
TSRLHSGVPS	RFSGSGSGTD	FTLTISSLQP EDFATYYCQQ GHTLPYTFQG 100
GTKLEIKRTV	AAPSVEIFEP	SDEQLKSGTA SVVCLNNFY PRAKVVQWKV 150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYSLSTLT LSKADYERHK VIACEVTHQG 200
LSPEVTKSFN	RGEC	214


Post-translational modifications / Modifications post-traductionnelles / Modificaciones postraduccionales

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H	22-96	146-202	22"-96"	146"-202"
Intra-L	23"-88"	134'-194'	23'''-88'''	134'''-194'''
Inter-H-L	222-214'	222"-214"		

N-terminal glutaminylation / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal 1,1"

Potential modified residues / résidus modifiés potentiels / restos modificados potenciales*
K *(rostdisire:nAb - 2:1)



zelenectidum
zelenectide

$S^{3.1}, S^{3.5}, S^{3.15}$ -[(1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)tris(3-oxopropane-3,1-diyl)]-L-cysteinyl-L-prolyl-3-(naphthalen-1-yl)-L-alanyl-D- α -aspartyl-L-cysteinyl-L-methionyl- N^6 -carbamimidoyl-L-lysyl-L- α -aspartyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-threonyl-L-prolyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolyl-L-tryptophyl-L-cysteine
nectin-4-binding peptide

zélénectide


$S^{3.1}, S^{3.5}, S^{3.15}$ -[(1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)tris(3-oxopropane-3,1-diyl)]-L-cystéinyl-L-prolyl-3-(naphthalén-1-yl)-L-alanyl-D- α -aspartyl-L-cystéinyl-L-méthionyl- N^6 -carbamimidoyl-L-lysyl-L- α -aspartyl-L-tryptophyl-L-séryl-L-thréonyl-L-prolyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolyl-L-tryptophyl-L-cystéine
peptide de liaison de la nectine 4

zelenectida

$S^{3.1}, S^{3.5}, S^{3.15}$ -[(1,3,5-triazinano-1,3,5-triil)tris(3-oxopropano-3,1-diil)]-L-cisteinil-L-prolil-3-(naftalen-1-il)-L-alanil-D- α -aspartil-L-cisteinil-L-metionil- N^6 -carbamimidoil-L-lisil-L- α -aspartil-L-triptofil-L-seril-L-treonil-L-prolil-(4R)-4-hidroxi-L-prolil-L-triptofil-L-cisteína
péptido de unión a la nectina 4

$C_{98}H_{129}N_{23}O_{26}S_4$

2407543-83-1

**zelenectidum pevedotinum**

zelenectide pevedotin

$S^{3,12}, S^{3,16}, S^{3,26}$ -[(1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)tris(3-oxopropane-3,1-diyl)][N-(5-[(2S)-1-[(2S)-1-{4-[(5S,8S,11S,12R)-11-[(2S)-butan-2-yl]-12-(2-{(2S)-2-[(1R,2R)-3-[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl]-4,10-dimethyl-3,6,9-trioxo-5,8-di(propan-2-yl)-2,13-dioxo-4,7,10-triazatetradecan-1-yl]anilino)-5-(carbamoylamino)-1-oxopentan-2-yl]amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino)-5-oxopentanoyl)-β-alanyl-N-methylglycyl-N-methylglycyl-N-methylglycyl-N-methylglycyl-N-methylglycyl-N-methylglycyl-N-methylglycyl-N-methylglycyl-L-cysteinyl-L-prolyl-3-(naphthalen-1-yl)-L-alanyl-D-α-aspartyl-L-cysteinyl-L-methionyl-N⁶-carbamimidoyl-L-lysyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-threonyl-L-prolyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolyl-L-tryptophyl-L-cysteine]

antineoplastic

zélénectide pévédotine

$S^{3,12}, S^{3,16}, S^{3,26}$ -[(1,3,5-triazinane-1,3,5-triyl)tris(3-oxopropane-3,1-diyl)][N-(5-[(2S)-1-[(2S)-1-{4-[(5S,8S,11S,12R)-11-[(2S)-butan-2-yl]-12-(2-{(2S)-2-[(1R,2R)-3-[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phénylpropan-2-yl]amino]-1-méthoxy-2-méthyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl)-2-oxoéthyl]-4,10-diméthyl-3,6,9-trioxo-5,8-di(propan-2-yl)-2,13-dioxo-4,7,10-triazatétradécan-1-yl]anilino)-5-(carbamoylamino)-1-oxopentan-2-yl]amino)-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl]amino)-5-oxopentanoyl)-β-alanyl-N-méthylglycyl-N-méthylglycyl-N-méthylglycyl-N-méthylglycyl-N-méthylglycyl-N-méthylglycyl-N-méthylglycyl-L-cystéinyl-L-prolyl-3-(naphtalén-1-yl)-L-alanyl-D-α-aspartyl-L-cystéinyl-L-méthionyl-N⁶-carbamimidoyl-L-lysyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-séryl-L-thréonyl-L-prolyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolyl-L-tryptophyl-L-cystéine]

antinéoplasique


zelenectida pevedotina

$S^{3,12}, S^{3,16}, S^{3,26}$ -[(1,3,5-triazinano-1,3,5-triil)tris(3-oxopropano-3,1-diil)][N-(5-[(2S)-1-[(2S)-1-{4-[(5S,8S,11S,12R)-11-[(2S)-butan-2-il]-12-(2-{(2S)-2-[(1R,2R)-3-[(1S,2R)-1-hidroxi-1-fenilpropan-2-il]amino]-1-metoxi-2-metil-3-oxopropil]pirrolidin-1-il)-2-oxoetil]-4,10-dimetil-3,6,9-trioxo-5,8-di(propan-2-il)-2,13-dioxo-4,7,10-triazatetradecan-1-il]anilino)-5-(carbamoilamino)-1-oxopentan-2-il]amino)-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino)-5-oxopentanoyl)-β-alanil-N-metilglicil-N-metilglicil-N-metilglicil-N-metilglicil-N-metilglicil-N-metilglicil-N-metilglicil-L-cisteinil-L-prolil-3-(naftalen-1-il)-L-alanil-D-α-aspartil-L-cisteinil-L-metionil-N⁶-carbamimidoil-L-lisil-L-α-aspartil-L-triptofil-L-seril-L-treonil-L-prolil-(4R)-4-hidroxi-L-prolil-L-triptofil-L-cisteina]

antineoplásico

$C_{194}H_{282}N_{44}O_{51}S_4$

2407446-48-2

**zelicapavirum**

zelicapavir

(3*S*)-3-({5-[3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}amino)-5-phenyl-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-one
antiviral

zélicapavir


(3*S*)-3-({5-[3-(morpholin-4-yl)-5-(trifluorométhyl)pyridin-2-yl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}amino)-5-phényl-1,3-dihydro-2*H*-1,4-benzodiazépin-2-one
antiviral

zelicapavir

(3*S*)-5-fenil-3-({5-[3-(morfolin-4-il)-5-(trifluorometil)piridin-2-il]-1,3,4-oxadiazol-2-il}amino)-1,3-dihidro-2*H*-1,4-benzodiazepin-2-ona
antiviral

 $C_{27}H_{22}F_3N_7O_3$

2070852-76-3

**zevotrelvirum**

zevotrelvir

N-{[(2*S*)-1-[(3*R*,5'*S*)-5'-cyano-2-oxo-1,2-dihydrospiro[indole-3,3'-pyrrolidin]-1'-yl]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]-4,6,7-trifluoro-*N*-methyl-1*H*-indole-2-carboxamide
antiviral

zévotrelvir


N-((2*S*)-1-[(3*R*,5'*S*)-5'-cyano-2-oxo-1,2-dihydrospiro[indole-3,3'-pyrrolidin]-1'-yl]-4-méthyl-1-oxopentan-2-yl)-4,6,7-trifluoro-*N*-méthyl-1*H*-indole-2-carboxamide
antiviral

zevotrelvir

N-((2*S*)-1-[(3*R*,5'*S*)-5'-ciano-2-oxo-1,2-dihidrospiro[indole-3,3'-pirrolidin]-1'-il]-4-metil-1-oxopentan-2-il)-4,6,7-trifluoro-*N*-metil-1*H*-indole-2-carboxamida
antiviral

C₂₈H₂₆F₃N₅O₃

2773516-53-1



zimislecelum
zimislecel

allogenic pancreatic islets derived from a human embryonic stem cell (ESC) line. The initial ESCs are positive for OCT4A (>70%) and stage-specific embryonic antigen-4 (SSEA4; >90%). The pancreatic islets are differentiated from the ESCs in five stages: (1) definitive endoderm induction, (2) gut tube formation, (3) early pancreatic progenitor induction, (4) late pancreatic progenitor induction, and (5) pancreatic endocrine induction. In stage 1 the pluripotent stem cell aggregates are cultured in MCDB-131 serum-free medium supplemented with activin A and 6-[(2-{[4-(2,4-dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1*H*-imidazol-2-yl)pyrimidin-2-yl]amino}ethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile (*laduviglusib*); in stage 2, the cell culture medium is exchanged with medium supplemented with keratinocyte growth factor (KGF); in stage 3 the medium is supplemented with KGF, (1*Ξ*)-*N*-(4-benzylpiperazin-1-yl)-1-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1*H*-pyrazol-4-yl)methanimine (SANT-1), (2*E*,4*E*,6*E*,8*E*)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid (*tretinoin*), phorbol 12,13-dibutyrate (PDBu), *N*-benzyl-2-[(pyrimidin-4-yl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxamide (thiazovivin), 4-(6-{4-[(propan-2-yl)oxy]phenyl}pyrazolo[1,5-*a*]pyrimidin-3-yl)quinoline (DMH-1), and activin A; in stage 4 the medium is supplemented with KGF, SANT-1, *tretinoin*, PDBu, thiazovivin, and activin A; and in stage 5 the medium is supplemented with *N*-(cyclopropylmethyl)-2-[4-(4-methoxybenzoyl)piperidin-1-yl]-*N*-[(4-oxo-3,5,7,8-tetrahydro-4*H*-pyrano[4,3-*d*]pyrimidin-2-yl)methyl]acetamide (NVP-TNKS656), PDBu, SANT-1, betacellulin, (2*S*)-2-[2-(3,5-difluorophenyl)acetamido]-*N*-[(3*S*)-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1*H*-1,4-benzodiazepin-3-yl]propanamide (γ-secretase inhibitor XXI), low-dose *naltrexone* (LDN), activin receptor-like kinase 5 (ALK5) inhibitor,

glucocorticoid (GC), thiazovivin, staurosporine, 3-deazaneplanocin A (DZNep), *trétinoïne*, and zinc sulfate.

At the end of stage 5 the islet-like aggregates are dissociated into a single cell suspension and cryopreserved. Thawed cells are subsequently reaggregated into islet cell clusters, removing single cells, and then washed before administration. The final substance consists of pancreatic islet β -cells (positive for NK6 homeobox 1 (NKX6.1+) and ISL LIM homeobox 1 (ISL1+)) that synthesize insulin, as well as non- β islet cells (α and δ cell type) and enterochromaffin (EC) cells. There are no detectable residual pluripotent stem cells (OCT 4+/LIN28+) *cell therapy (type 1 diabetes)*

zimislecel

îlots pancréatiques allogènes dérivés d'une lignée de cellules souches embryonnaires humaines (CSE). Les CSE initiales sont positives pour OCT4A (>70%) et l'antigène embryonnaire spécifique du stade 4 (SSEA4; >90%).

Les îlots pancréatiques sont différenciés à partir des CSE en cinq étapes: (1) induction de l'endoderme définitif, (2) formation du tube digestif, (3) induction des progéniteurs pancréatiques précoces, (4) induction des progéniteurs pancréatiques tardifs et (5) induction endocrine pancréatique. Au stade 1, les agrégats de cellules souches pluripotentes sont cultivés dans un milieu sans sérum MCDB 131 complété avec de l'activine A et du 6-[[2-([4-(2,4-dichlorophényl)-5-(4-méthyl-1H-imidazol-2-yl)pyrimidine-2-yl]amino)éthyl]amino]pyridine-3-carbonitrile (*laduviglusib*); au stade 2, le milieu de culture cellulaire est remplacé par un milieu complété avec du facteur de croissance des kératinocytes (KGF); à l'étape 3, le milieu est complété avec du KGF, de la (1 Ξ)-N-(4-benzylpipérazin-1-yl)-1-(3,5-diméthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthanimine (SANT-1), de l'acide (2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6, 8-tétraénoïque (*trétinoïne*), le 12,13-dibutyrate de phorbol (PDBu), le N-benzyl-2-[(pyrimidin-4-yl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxamide (thiazovivine), la 4-(6-{4-[(propan-2-yl)oxy]phényl}pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoléine (DMH-1) et l'activine A; à l'étape 4, le milieu est complété avec du KGF, du SANT-1, de la *trétinoïne*, du PDBu, de la thiazovivine et de l'activine A; et au stade 5, le milieu est complété avec du N-(cyclopropylméthyl)-2-[4-(4-méthoxybenzoyl)pipéridin-1-yl]-N-[(4-oxo-3,5,7,8-tétrahydro-4H-pyrano[4, 3-d]pyrimidine-2-yl)méthyl]acétamide (NVP-TNKS656), PDBu, SANT-1, bétacelluline, (2S)-2-[2-(3,5-difluorophényl)acétamido]-N-[(3S)-1-méthyl-2-oxo-5-phényl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazépin-3-yl]propanamide (inhibiteur de la γ -sécrétase XXI), *naltrexone* à faible dose (LDN), de l'inhibiteur de l'activine de type récepteur de la kinase 5 (ALK5), de glucocorticoïde (GC), de la thiazovivine, de la staurosporine, de la 3-désazanéplanocine A (DZNep), de la *trétinoïne* et du sulfate de zinc.

À la fin de l'étape 5, les agrégats en forme d'îlots sont dissociés en une suspension cellulaire unique et cryopréservés. Les cellules décongelées sont ensuite réaggrégées en amas d'îlots cellulaires en éliminant les cellules individuelles, puis lavées avant d'être administrées. La substance finale est constituée de cellules β des îlots pancréatiques (positives pour l'homéobox 1 NK6 (NKX6.1+) et l'homéobox 1 ISL LIM (ISL1+)) qui synthétisent l'insuline, ainsi que de cellules d'îlots non- β (de type α et δ) et de cellules d'entérochromaffine (EC). Il n'y a pas de cellules souches pluripotentes résiduelles détectables (OCT 4+/LIN28+).

thérapie cellulaire (diabète sucré type 1)

zimislecel

islotas pancreáticos alogénicos derivados de una línea de células madre embrionarias (ESC) humanas. Las ESCs iniciales son positivas para OCT4A (>70%) y para el antígeno embrionario específico de etapa-4 (SSEA4; >90%).

Los islotas pancreáticos se diferencian desde las ESCs en cinco etapas: (1) inducción del endodermo definitivo, (2) formación del tubo gástrico, (3) inducción del progenitor pancreático temprano, (4) inducción del progenitor pancreático tardío y (5) inducción del páncreas endocrino.

En la etapa 1 los agregados de células madre pluripotentes se cultivan en medio sin suero MCDB 131 suplementado con activina A y 6-[(2-[[4-(2,4-diclorofenil)-5-(4-metil-1*H*-imidazol-2-il)pirimidin-2-il]amino]etil]amino]piridina-3-carbonitrilo (*laduviglusib*); en la etapa 2, el medio de cultivo se intercambia por medio suplementado con factor de crecimiento de queratinocitos (KGF); en la etapa 3 el medio se suplementa con KGF, (1*E*)-*N*-(4-benzilpiperazin-1-il)-1-(3,5-dimetil-1-fenil-1*H*-pirazol-4-il)metanimina (SANT-1), ácido (2*E*,4*E*,6*E*,8*E*)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexeno-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoico (*tretinoína*), forbol 12,13-dibutirato (PDBu), *N*-benzil-2-[(pirimidin-4-il)amino]-1,3-tiazol-4-carboxamida (tiazovivina), 4-(6-{4-[(propan-2-il)oxi]fenil}pirazolo[1,5-*a*]pirimidin-3-il)quinoleína (DMH-1) y activina A; en la etapa 4 el medio se suplementa con KGF, SANT-1, *tretinoína*, PDBu, tiazovivina y activina A; y en la etapa 5, el medio se suplementa con *N*-(ciclopropilmetil)-2-[4-(4-metoxibenzoil)piperidin-1-il]-*N*-[(4-oxo-3,5,7,8-tetrahidro-4*H*-pirano[4,3-*d*]pirimidin-2-il)metil]acetamida (NVP-TNKS656), PDBu, SANT-1, betacelulina, (2*S*)-2-[2-(3,5-difluorofenil)acetamido]-*N*-[(3*S*)-1-metil-2-oxo-5-fenil-2,3-dihidro-1*H*-1,4-benzodiazepin-3-il]propanamida (inhibidor de γ -secretasa XXI), *naltrexona* en dosis baja (LDN), inhibidor de quinasa 5 similar al receptor de activina (ALK5), glucocorticoide (GC), tiazovivina, estaurosporina, 3-desazaneplanocina A (DZNep), *tretinoína* y sulfato de zinc.

Al final de la etapa 5, los agregados similares a islotes se disocian para obtener una suspensión de células individuales y se criopreservan. Las células descongeladas se vuelven a reagregar para formar agrupamientos de células de islote, eliminando las células aisladas y lavándolas después antes de su administración. La sustancia final consiste en células β de islote pancreático (positivas para NK6 homeobox 1 (NKX6.1+) e ISL LIM homeobox 1 (ISL1+)) que sintetizan insulina, así como células de islote no- β (células tipo α y δ) y células enterocromafines (EC). No hay células madre pluripotentes residuales detectables (OCT 4+/LIN28+).

terapia celular (diabetes mellitus tipo 1)

zotresiranum

zotresiran

[(2*S*,4*R*)-1-(1-[(2-acetamido-2-deoxy- β -D-galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis{3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-deoxy- β -D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropyl}-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)methyl hydrogen
all-P-ambo-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-deoxy-2'-fluoroadenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyluridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylcytidylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyladenylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyluridylyl-(3'→5')-2'-*O*-methylguanylyl-(3'→5')-2'-*O*-methyl-3'-uridylylate duplex with *all-P-ambo*-2'-*O*-methyl-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyl-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-2'-*O*-methyladenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylguanylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluorocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyladenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluorouridylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyladenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyladenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyladenylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyluridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluorocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylguanylyl-(5'→3')-2'-*O*-methylcytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyl-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-deoxy-2'-fluoro-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-methyladenosine
xanthine dehydrogenase synthesis reducer


zotrésiran

[(2S,4R)-1-(1-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-16,16-bis{3-[(3-{5-[(2-acétamido-2-désoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]pentanamido}propyl)amino]-3-oxopropyl}-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oyl)-4-hydroxypyrrolidin-2-yl)méthyl hydrogène tout-*P-ambo*-2'-O-méthyl-*P*-thiouridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyl-*P*-thiocytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(3'→5')-2'-désoxy-2'-fluoroadénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyluridylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylcytidylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthyladénylyl-(3'→5')-2'-O-méthylguanylyl-(3'→5')-2'-O-méthyl-3'-uridylate duplex avec tout-*P-ambo*-2'-O-méthyl-*P*-thioadénylyl-(5'→3')-2'-O-méthyl-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluorocytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyluridylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluorouridylyl-(5'→3')-2'-O-méthylguanylyl-(5'→3')-2'-O-méthylcytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyl-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-désoxy-2'-fluoro-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-O-méthyladénosine réducteur de la synthèse de la xanthine-déshydrogénase

zotresiran

[(2S,4R)-1-(1-[(2-acetamido-2-desoxy-β-D-galactopiranosil)oxi]-16,16-bis{3-[(3-{5-[(2-acetamido-2-desoxy-β-D-galactopiranosil)oxi]pentanamido}propil)amino]-3-oxopropil}-5,11,18-trioxo-14-oxa-6,10,17-triazanonacosan-29-oil)-4-hidroxi-pirrolidin-2-il]metil hidrógeno todo-*P-ambo*-2'-O-metil-*P*-tiouridilil-(3'→5')-2'-O-metil-*P*-tiocitidilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilguanyilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(3'→5')-2'-desoxi-2'-fluoroadenilil-(3'→5')-2'-O-metiluridilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilcitidilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metiladenilil-(3'→5')-2'-O-metilguanilil-(3'→5')-2'-O-metil-3'-uridilato dúplex con todo-*P-ambo*-2'-O-metil-*P*-tioadenilil-(5'→3')-2'-O-metil-*P*-tioguanilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluorocitidilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-O-metiladenilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metiluridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluorouridilil-(5'→3')-2'-O-metilguanilil-(5'→3')-2'-O-metilcitidilil-(5'→3')-2'-O-metil-*P*-tiouridilil-(5'→3')-2'-desoxi-2'-fluoro-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-O-metiladenosina reductor de la síntesis de la xantina deshidrogenasa


2756821-85-7



N : A,C,G,U

N : 2'-O-methyl-N / 2'-O-méthyl-N / 2'-O-metil-N

N : 2'-deoxy-2'-fluoro-N / 2'-désoxy-2'-fluoro-N / 2'-desoxi-2'-fluoro-N

$$- : -\text{PO}(\text{OH})- = : -\text{PO}(\text{SH})-$$


Electronic structure available on MedNet: <https://extranet.who.int/soinn/>

Structure électronique disponible sur MedNet: <https://extranet.who.int/soinn/>

Estructura electrónica disponible en MedNet: <https://extranet.who.int/soinn/>

Proposed International Nonproprietary Names: List 129 – COVID-19 (special edition)

Comments on, or formal objections to, the proposed names may be forwarded by any person to the INN Programme of the World Health Organization within two weeks of the date of their publication on *WHO INN Programme website*, i.e., for **List 129 – COVID-19 (special edition) of Proposed INN not later than 14 July 2023, exceptionally for this special edition. Publication date: 30/06/2023**

Dénominations communes internationales proposées: Liste 129 - COVID-19 (édition spéciale)

Des observations ou des objections formelles à l'égard des dénominations proposées peuvent être adressées par toute personne au Programme des Dénominations communes internationales de l'Organisation mondiale de la Santé dans un délai de deux semaines à compter de la date de leur publication sur le *site Internet du Programme des DCI de l'OMS*, c'est à dire pour la **Liste 129 - COVID-19 (édition spéciale) de DCI Proposées le 14 juillet 2023 au plus tard, exceptionnellement pour cette édition spéciale. Date de publication: 30/06/2023**

Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas: Lista 129 - COVID-19 (edición especial)

Cualquier persona puede dirigir observaciones u objeciones respecto de las denominaciones propuestas, al Programa de Comunes Internacionales de la Organización Mundial de la Salud, en un plazo de dos semanas, contados desde la fecha de su publicación en el *sitio web del Programa de las DCI de la OMS*, es decir, para la **Lista 129 - COVID-19 (edición especial) de DCI Propuestas el 14 de julio de 2023 a más tardar, excepcionalmente para esta edición especial. Fecha de publicación: 30/06/2023**

<i>Proposed INN</i> (Latin, English, French, Spanish)	<i>Chemical name or description: Action and use: Molecular formula, Chemical Abstracts Service (CAS) registry number: Graphic formula</i>
<i>DCI Proposée</i>	<i>Nom chimique ou description: Propriétés et indications: Formule brute, Numéro dans le registre du CAS: Formule développée</i>
<i>DCI Propuesta</i>	<i>Nombre químico o descripción: Acción y uso: Fórmula molecular, Número de registro del CAS: Fórmula desarrollada</i>

andusomeranum

andusomeran messenger RNA (mRNA), 5'-capped, encoding a full-length, codon-optimised pre-fusion stabilised conformation variant (K982P and V983P) of the SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) spike (S) glycoprotein (Omicron variant XBB.1.5; based upon GISAID: EPI_ISL_15948646) further optimized by two additional stop codons, flanked by an artificial 5' untranslated region (UTR) and a 3' UTR derived from the human alpha globin gene (HBA1) modified to contain an identification and ratio (IDR) sequence to enable identification and relative ratio determination of individual RNA components in a multivalent mRNA vaccine, and terminated by a 3' polyadenylation (polyA) tail; contains N¹-methylpseudouridine instead of uridine (*aU-U>m¹Ψ*).
immunological agent for active immunization (anti-SARS-CoV-2)

andusoméran

ARN messenger (ARNm), protégé d'une coiffe en 5', codant la séquence entière aux codons optimisés d'un variant de conformation stabilisée avant fusion (K982P et V983P) de la glycoprotéine de spicule (S) du SARS-CoV-2 (coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère) (variant Omicron XBB.1.5; d'après GISAID: EPI_ISL_15948646) dont l'optimisation a été renforcée par l'addition de deux codons stop supplémentaires, flanquée d'une région non traduite (UTR) artificielle en 5' et d'une UTR en 3' dérivée du gène de l'alpha-globine humaine (HBA1) modifiée pour contenir une séquence d'identification et de ratio (IDR) afin de permettre l'identification et la détermination du ratio relatif de chaque composant d'ARN dans un vaccin ARNm multivalent, et terminée par une queue polyadénylation (polyA) en 3'; contient de la N¹-méthylpseudouridine en lieu de l'uridine (*tout-U>m¹Ψ*).
agent immunologique pour immunisation active (anti-SARS-CoV-2)

andusomerán

ARN mensajero (ARNm), protegido en 5', que codifica, para la secuencia completa con codones optimizados, de una variante (K982P y V983P) estabilizada en la conformación pre-fusión de la glicoproteína de la espícula (S) del SARS-Cov-2 (coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo) (variante XBB.1.5 de Omicron; basado en GISAID: EPI_ISL_15948646), optimizada mediante dos codones de terminación adicionales, flanqueado por una región artificial no traducida (UTR) en 5' y una 3' UTR derivada del gen de la alfa globina humana (HBA1), modificada para que contenga una secuencia de identificación y ratio (IDR) para permitir la identificación y la determinación del ratio relativo de los componentes individuales de ARN en una vacuna de ARNm multivalente, y terminado por una cola poliadenilación (poliA) en 3'; contiene N¹-metilpseudouridina en lugar de uridina (*todo->m¹Ψ*).
agente inmunológico para inmunización activa (anti-SARS-CoV-2)

2918977-08-7

pitozinameranum #
pitozinameran

messenger RNA (mRNA), 5'-capped, encoding a full-length, codon-optimised pre-fusion stabilised conformation variant (K982P and V983P) of the SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) spike (S) glycoprotein (Omicron sub-lineage XBB.1.16; based upon GISAID: EPI_ISL_16835403), flanked by 5' and 3' untranslated regions and a 3' polyadenylation (polyA) tail; contains N¹-methylpseudouridine instead of uridine (*all-U>m¹Ψ*).
immunological agent for active immunization (anti-SARS-CoV-2)

pitozinaméran

ARN messenger (ARNm), protégé d'une coiffe en 5', codant la séquence entière aux codons optimisés d'un variant à la conformation stabilisée avant fusion (K982P et V983P) de la glycoprotéine de spicule (S) du SARS-CoV-2 (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2) (sous-lignée Omicron XBB.1.16; d'après GISAID: EPI_ISL_16835403), flanquée de régions non traduites en 5' et 3' et d'une queue polyadénylation (polyA) en 3'; contient de la N¹-méthylpseudouridine au lieu de l'uridine (*tout-U>m¹Ψ*).
agent immunologique pour immunisation active (anti-SARS-CoV-2)

pitozinamerán

ARN mensajero (ARNm), protegido en 5', que codifica, para la secuencia completa con codones optimizados, de una variante estabilizada en la conformación pre-fusión (K982P y V983P) de la glicoproteína de la espícula (S) del SARS-Cov-2 (coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo) (sublinaje XBB.1.16 de Omicron; basado en GISAID: EPI_ISL_16835403), flanqueado por regiones 5' y 3' no traducidas y una cola poliadenilación (poliA) en 3'; contiene N¹-metilpseudouridina en lugar de uridina (*todo-U>m¹Ψ*).
agente inmunológico para inmunización activa (anti-SARS-CoV-2)

2920299-36-9

raxtozinameranum #

raxtozinameran

messenger RNA (mRNA), 5'-capped, encoding a full-length, codon-optimised pre-fusion stabilised conformation variant (K982P and V983P) of the SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) spike (S) glycoprotein (Omicron sub-lineage XBB.1.5; based upon GISAID: EPI_ISL_17157779), flanked by 5' and 3' untranslated regions and a 3' polyadenylation (polyA) tail; contains N¹-methylpseudouridine instead of uridine (*all-U>m¹Ψ*).
immunological agent for active immunization (anti-SARS-CoV-2)

raxtozinaméran

ARN messenger (ARNm), protégé d'une coiffe en 5', codant la séquence entière aux codons optimisés d'un variant à la conformation stabilisée avant fusion (K982P et V983P) de la glycoprotéine de spicule (S) du SARS-CoV-2 (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2) (sous-lignée Omicron XBB.1.5; d'après GISAID: EPI_ISL_17157779), flanquée de régions non traduites en 5' et 3' et d'une queue polyadénylation (polyA) en 3'; contient de la N¹-méthylpseudouridine au lieu de l'uridine (*tout-U>m¹Ψ*).
agent immunologique pour immunisation active (anti-SARS-CoV-2)

raxtozinamerán

ARN mensajero (ARNm), protegido en 5', que codifica, para la secuencia completa con codones optimizados, de una variante estabilizada en la conformación pre-fusión (K982P y V983P) de la glicoproteína de la espícula (S) del SARS-CoV-2 (coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo) (sublinaje XBB.1.5 de Omicron; basado en GISAID: EPI_ISL_17157779), flanqueado por regiones 5' y 3' no traducidas y una cola poliadenilación (poliA) en 3'; contiene N¹-metilpseudouridina en lugar de uridina (*todo-U>m¹Ψ*).

agente inmunológico para inmunización activa (anti-SARS-CoV-2)

2887554-49-4

tegrenmeranum #

tegrenmeran

messenger RNA (mRNA), 5'-capped, encoding the codon-optimized receptor binding domain (RBD) of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) spike (S) glycoprotein (Omicron sublineages B.1.1.529.4 (BA.4) and B.1.1.529.5 (BA.5); based upon GISAID: EPI_ISL_12607996), with a cysteine 233 to serine substitution, expressed as a fusion protein with the S glycoprotein signal peptide derived from SARS-CoV-2 Wuhan-Hu 1 strain (GenBank: MN908947.3), flanked by 5' and 3' untranslated regions (UTRs) derived from the human β-globin gene and a 3' polyadenylation (polyA) tail; contains 5-methyluridine instead of uridine (*all-U>5-Me-U*) and 5-methylcytidine instead of cytidine (*all-C>5-Me-C*).

immunological agent for active immunization (anti-SARS-CoV-2)

tégrenméran

ARN messenger (ARNm), protégé d'une coiffe en 5', codant le domaine de liaison au récepteur (RBD) aux codons optimisés de la glycoprotéine de spicule (S) du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) (sous-lignes Omicron B.1.1.529.4 (BA.4) et B.1.1.529.5 (BA.5); d'après GISAID: EPI_ISL_12607996), avec substitution de la cystéine 233 par la sérine, exprimé sous la forme d'une protéine de fusion avec le peptide signal de la glycoprotéine S dérivée de la souche SARS-CoV-2 Wuhan-Hu 1 (GenBank: MN908947.3), flanquée des régions non traduites (UTR) en 5' et 3' dérivées du gène de la β-globine humaine et d'une queue de polyadénylation (polyA) en 3'; contient de la 5-méthyluridine en lieu de l'uridine (*tout-U>5-Me-U*) et de la 5-méthylcytidine en lieu de la cytidine (*tout-C>5-Me-C*).

agent immunologique pour immunisation active (anti-SARS-CoV-2)

tegrenmerán

ARN mensajero (ARNm), protegido en 5', que codifica, con codones optimizados, para el dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína de la espícula (S) del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-Cov-2) (sublinajes B.1.1.529.4 (BA.4) y B.1.1.529.5 (BA.5) de Omicron; basado en GISAID: EPI_ISL_12607996), con una sustitución de la cisteína 233 a serina, expresado como una proteína de fusión con el péptido señal de la glicoproteína S derivada de la cepa Wuhan-Hu 1 de SARS-Cov-2 (GenBank: MN908947.3), flanqueado por regiones 5' y 3' no traducidas (UTRs) derivadas del gen de la β-globina humana y una cola poliadenilación (poliA) en 3'; contiene 5-metiluridina en lugar de uridina (*todo-U>5-Me-U*) y 5-metilcitosina en lugar de citidina (*todo-C>5-Me-C*).
agente inmunológico para inmunización activa (anti-SARS-CoV-2)

2889466-36-6

upalsecovateinum #
upalsecovatein

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) omicron lineage B.1.1.529.5 also known as BA.5 (GISAID: EPI_ISL_12097410) spike (S) glycoprotein (S glycoprotein) (1-1255), stable prefusion conformation variant (R⁶⁶⁴>Q, R⁶⁶⁵>Q, R⁶⁶⁷>Q, K⁹⁶⁸>P, V⁹⁶⁹>P), trimer, produced in *Spodoptera frugiperda* (Sf9) insect cells, glycoform alfa
immunological agent for active immunization (anti-SARS-CoV-2)

upalsécovatéine

glycoprotéine du spicule (S) (glycoprotéine S) du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) lignée omicron B.1.1.529.5 également connue sous le nom de BA.5 (GISAID: EPI_ISL_12097410) (1-1255), variant de conformation stable par pré-fusion (R⁶⁶⁴>Q, R⁶⁶⁵>Q, R⁶⁶⁷>Q, K⁹⁶⁸>P, V⁹⁶⁹>P), trimère, produit dans des cellules d'insecte *Spodoptera frugiperda* (Sf9), glycoforme alfa
agent immunologique pour immunisation active (anti-SARS-CoV-2)

upalsecovateína

glicoproteína de espícula (S) (glicoproteína S) del coronavirus 2 del síndrome severo agudo respiratorio (SARS-CoV-2) linaje ómicron B.1.1.529.5 también conocido como BA.5 (GISAID: EPI_ISL_12097410) (1-1255), variante de conformación estable prefusión (R⁶⁶⁴>Q, R⁶⁶⁵>Q, R⁶⁶⁷>Q, K⁹⁶⁸>P, V⁹⁶⁹>P), trímero, producido en células de insectos *Spodoptera frugiperda* (Sf9), forma glicosilada alfa
agente inmunológico para inmunización activa (anti-SARS-CoV-2)

2918783-99-

Monomer sequence / Séquence du monomère / Secuencia del monómero			
QCVNLITRTQ	SYTNSFTRGV	YYPDKVFRSS	VLHSTQDLFL
AISGNTGTRK	FDNPVLPFND	GVYFASTEKS	NIIRGWIFGT
IVNNATNVVI	KVCEQFCND	PFLDVYYHKN	NKSWMESEFR
EYVSQPFLLM	LEGKQGNFKN	LREFVFKNID	GYFKIYSKHT
GFSALEPLVD	LPIGINITRF	QTLALHRSY	LTPGDSSSGW
YLQPRTFLLK	YNENGTITDA	VDCALDPLSE	TKCTLKSFTV
RVQPTESIVR	FPNITNLCPF	DEVFNATRFA	SVYAWNKRRI
YNFAFFFAFK	CYGVSPTKLN	DLCFNTVYAD	SFVIRGNEVS
ADYNYKLDD	FTGCVIAWNS	NKLDSKVGGN	YNYRYRLFRK
STEIYQAGNK	PCNGVAGVNC	YFPLQSYGFR	PTYGVGHQPY
HAPATVCGPK	KSTNLVKKNC	VNFNFNGLTG	TGVLTESNKK
IADTTDAVRD	PQTEILDIT	PCSEGGVSVI	TPGTNTSNQV
EVVPAIHADQ	LTPTRVYST	GSNVFQTRAG	CLIGAEYVNN
GTCASYQTQT	KSHQQAQSV	SQSIIAYTMS	LGAENSVAYS
TISVTEILP	VSMTKTSVDC	TMYICGDSTE	CSNLLQYGS
GIAVEQDKNT	QEVFAQVKQI	YKTPPIKYFG	GFNFSQILPD
EDLLFNKVTL	ADAGFIKQYG	DCLGDIARD	LICAQKFNGL
MIAQYTSALL	AGTITSGWTF	GAGAALQIPF	AMQMAYRFNG
NQKLIANQFN	SAIGKIQDSL	SSTASALGKL	QDVVNHNAAQ
KFGAISSVLN	DILSRLEPE	AEVQIDRLIT	GRLQSLQTYV
RASANLAATK	MSECVLGQSK	RVDFCGKGYH	LMSFPQSAPH
PAQEKNFETA	PAICHDGKAH	FPREGVFVSN	GTHWFVTQRN
NTFVSGNCDV	VIGIVNNTVY	DPLQPELDSF	KEELDKYFKN
ISGINASVVN	IQKEIDRLNE	VAKNLNESLI	DLQELGKYEQ
GFIAGLIAIV	MVTIMLCCMT	SCCSCLKGCC	SCGSCCKFDE
KLHYT			

Mutation / Mutation / Mutación
R⁶⁶⁴>Q, R⁶⁶⁵>Q, R⁶⁶⁷>Q, K⁹⁶⁸>P, V⁹⁶⁹>P

Post-translational modifications

Disulfide location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-chain: 2-118, 113-148, 273-283, 318-343, 361-414, 373-507, 462-470, 520-572, 599-631, 644-653, 720-742, 725-731, 822-833, 1014-1025, 1064-1108

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
N45, N56, N104, N131, N147, N216, N264, N313, N325, N585, N598, N639, N691, N699, N783, N1056, N1080, N1116, N1140, N1155, N1176

O-glycosylation sites / Sites de O-glycosylation / Posiciones de O-glicosilación
O-glycosylation is experimentally confirmed with uncertainty on precise Ser and Thr glycosylated residues

vintesomeranum #
vintesomeran

messenger RNA (mRNA), 5'-capped, encoding a full-length, codon-optimised pre-fusion stabilised conformation variant (K982P and V983P) of the SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) spike (S) glycoprotein (Omicron variant XBB.1.16; based upon GISAID: EPI_ISL_16835403) further optimized by two additional stop codons, flanked by an artificial 5' untranslated region (UTR) and a 3' UTR derived from the human alpha globin gene (HBA1) modified to contain an identification and ratio (IDR) sequence to enable identification and relative ratio determination of individual RNA components in a multivalent mRNA vaccine, and terminated by a 3' polyadenylation (polyA) tail; contains N'-methylpseudouridine instead of uridine (all-U>m¹Ψ).
immunological agent for active immunization (anti-SARS-CoV-2)

vintésoméran

ARN messenger (ARNm), protégé d'une coiffe en 5', codant la séquence entière aux codons optimisés d'un variant de conformation stabilisée avant fusion (K982P et V983P) de la glycoprotéine de spicule (S) du SARS-CoV-2 (coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère) (variant Omicron XBB.1.16; d'après GISAID: EPI_ISL_16835403) dont l'optimisation a été renforcée par l'addition de deux codons stop supplémentaires, flanquée d'une région non traduite (UTR) artificielle en 5' et d'une UTR en 3' dérivée du gène de l'alpha-globine humaine (HBA1) modifiée pour contenir une séquence d'identification et de ratio (IDR) afin de permettre l'identification et la détermination du ratio relatif de chaque composant d'ARN dans un vaccin ARNm multivalent, et terminée par une queue polyadénylation (polyA) en 3'; contient de la N¹-méthylpseudouridine en lieu de l'uridine (*tout-U>m¹Ψ*).
agent immunologique pour immunisation active (anti-SARS-CoV-2)

vintesomerán

ARN mensajero (ARNm), protegido en 5', que codifica, para la secuencia completa con codones optimizados, de una variante (K982P y V983P) estabilizada en la conformación pre-fusión de la glicoproteína de la espícula (S) del SARS-Cov-2 (coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo) (variante XBB.1.16 de Omicron; basado en GISAID: EPI_ISL_16835403), optimizada mediante dos codones de terminación adicionales, flanqueado por una región artificial no traducida (UTR) en 5' y una 3' UTR derivada del gen de la alfa globina humana (HBA1), modificada para que contenga una secuencia de identificación y ratio (IDR) para permitir la identificación y la determinación del ratio relativo de los componentes individuales de ARN en una vacuna de ARNm multivalente, y terminado por una cola poliadenilación (poliA) en 3'; contiene N¹-metilpseudouridina en lugar de uridina (*todo->m¹Ψ*).
agente inmunológico para inmunización activa (anti-SARS-CoV-2)

2923391-66-4

Electronic structure available on MedNet: <https://extranet.who.int/soinn/>

Structure électronique disponible sur MedNet: <https://extranet.who.int/soinn/>

Estructura electrónica disponible en MedNet: <https://extranet.who.int/soinn/>

Please note that due to exceptional pandemic circumstances, this Proposed INN List is open for public consultation for a period of two weeks only (instead of four months) and the publication date to be retained is the date of web publication on the WHO INN website. The procedure "INN for Variant COVID-19 Vaccine Active Substances" can be found at <https://www.who.int/publications/i/item/inn-21-520>.

Veuillez noter qu'en raison de circonstances pandémiques exceptionnelles, cette Liste de DCI Proposées est ouverte à la consultation publique pour une période de deux semaines seulement (au lieu de quatre mois) et la date de publication à retenir est la date de publication sur le site Internet du Programme des DCI de l'OMS. La procédure "INN for Variant COVID-19 Vaccine Active Substances" peut être trouvée à <https://www.who.int/publications/i/item/inn-21-520>.

Tenga en cuenta que debido a circunstancias excepcionales de la pandemia, esta Lista de DCI Propuestas está abierta a la consulta pública durante un periodo de sólo dos semanas (en lugar de cuatro meses) y la fecha de publicación que debe conservarse es la fecha de publicación en el sitio web del Programa de las DCI de la OMS. Se puede encontrar la procedura "INN for Variant COVID-19 Vaccine Active Substances" en nuestro sitio web <https://www.who.int/publications/i/item/inn-21-520>.

Proposed International Nonproprietary Names: List 129 – COVID-19 (special edition – ADDENDUM 1)

Comments on, or formal objections to, the proposed names may be forwarded by any person to the INN Programme of the World Health Organization within four months of the date of their publication in *WHO Drug Information*, i.e., for **List 129 – COVID-19 (special edition – ADDENDUM 1)**

Proposed INN not later than 3 December 2023. Publication date: 04.08.2023

Dénominations communes internationales proposées: Liste 129 – COVID-19 (édition spéciale – ADDENDUM 1)

Des observations ou des objections formelles à l'égard des dénominations proposées peuvent être adressées par toute personne au Programme des Dénominations communes internationales de l'Organisation mondiale de la Santé dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur publication dans *WHO Drug Information*, c'est à dire pour la **Liste 129 – COVID-19 (édition spéciale – ADDENDUM 1)** de DCI Proposées le 3 décembre 2023 au plus tard.

Date de publication: 04.08.2023

Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas: Lista 129 – COVID-19 (edición especial – ADDENDUM 1)

Cualquier persona puede dirigir observaciones u objeciones respecto de las denominaciones propuestas, al Programa de Denominaciones Comunes Internacionales de la Organización Mundial de la Salud, en un plazo de cuatro meses, contados desde la fecha de su publicación en *WHO Drug Information*, es decir, para la **Lista 129 – COVID-19 (edición especial – ADDENDUM 1)** de DCI Propuestas el 3 de Diciembre de 2023 a más tardar.

Fecha de publicación: 04.08.2023

<i>Proposed INN</i> (Latin, English, French, Spanish)	<i>Chemical name or description: Action and use: Molecular formula, Chemical Abstracts Service (CAS) registry number: Graphic formula</i>
<i>DCI Proposée</i>	<i>Nom chimique ou description: Propriétés et indications: Formule brute: Numéro dans le registre du CAS: Formule développée</i>
<i>DCI Propuesta</i>	<i>Nombre químico o descripción: Acción y uso: Fórmula molecular: Número de registro del CAS: Fórmula desarrollada</i>

atilotrelvirum

atilotrelvir

(1*R*,4*S*,6*S*)-*N*-((1*S*)-1-cyano-2-[(3*S*)-2-oxopyrrolidin-3-yl]ethyl)-5-[(2*S*)-3,3-dimethyl-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)butanoyl]-5-azaspiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,1'-cyclopropane]-6-carboxamide
antiviral

atilotrelvir

(1*R*,4*S*,6*S*)-*N*-((1*S*)-1-cyano-2-[(3*S*)-2-oxopyrrolidin-3-yl]éthyl)-5-[(2*S*)-3,3-diméthyl-2-(2,2,2-trifluoroacétamido)butanoyl]-5-azaspiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,1'-cyclopropane]-6-carboxamide
antiviral

Proposed INN: List 129


atilotrelvir

WHO Drug Information, Vol. 37, No. 2, 2023

(1*R*,4*S*,6*S*)-*N*-{[(1*S*)-1-ciano-2-[(3*S*)-2-oxopirrolidin-3-
il]etil]-5-[(2*S*)-3,3-diméthyl-2-(2,2,2-
trifluoroacétamido)butanoil]-5-
azaespiro[biciclo[2.2.1]heptano-2,1'-cyclopropano]-6-
carboxamida
antiviral

C₂₄H₃₂F₃N₅O₄

2850365-55-6



canvircceptum #

canvirccept

human angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2,
angiotensin-converting enzyme homolog, ACEH, ACE-
related carboxypeptidase, metalloprotease MPROT15,
EC: 3.4.17.23) soluble extracellular domain fragment
(3-598, 1-596 in the current sequence), enzymatically
inactive variant (H³⁵⁷>N³⁵⁵, H³⁶¹>N³⁵⁹), fused to human
immunoglobulin G1 Fc fragment (h-CH2-CH3-CHS
domains [*Homo sapiens*IGHG1*01 (hinge C⁶⁰¹>S
(597-611), CH2 (612-721), CH3 P⁸²⁶>T (722-826),
CHS (827-828))]), fused to human immunoglobulin M
(IgM) C-terminal tail fragment (829-846), covalent
pentamer of dimers, produced in Chinese hamster
ovary (CHO) cells, glycoform alfa
*angiotensin-converting enzyme 2 based decoy
receptor, antiviral*

canvirccept

enzyme de conversion de l'angiotensine 2 humaine
(ACE2, homologue de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine, ACEH, carboxypeptidase liée à l'ACE,
métalloprotéase MPROT15, EC: 3.4.17. 23) fragment
du domaine extracellulaire soluble (3-598, 1-596 dans
la séquence actuelle), variant inactif sur le plan
enzymatique (H³⁵⁷>N³⁵⁵, H³⁶¹>N³⁵⁹), fusionné au
variant (C⁶⁰¹>S, P⁸²⁶>T) du fragment Fc de
l'immunoglobuline G1 humaine (h-CH2-CH3-CHS
domains [*Homo sapiens*IGHG1*01 (charnière C⁶⁰¹>S
(597-611), CH2 (612-721), CH3 P⁸²⁶>T (722-826),
CHS (827-828))]), fusionné à un fragment de la queue
en C-terminal de l'immunoglobuline M humaine (829-
846), pentamère covalent de dimères, produit dans
des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO),
glycoforme alfa
*récepteur leurre basé sur l'enzyme de conversion de
l'angiotensine 2, antiviral*

canvircept

enzima convertidora de la angiotensina 2 humana (ACE2, homólogo de la enzima convertidora de la angiotensina, ACEH, carboxipeptidasa relacionada con ACE, metaloproteasa MPROT15, EC: 3.4.17.23) fragmento del dominio soluble extracelular (3-598, 1-596 en la secuencia actual), variante inactiva enzimáticamente (H³⁵⁷>N³⁵⁵, H³⁶¹>N³⁵⁹), fusionada al fragmento Fc de la inmunoglobulina G1 humana (h-CH2-CH3-CHS domains [*Homo sapiens*IGHG1*01 (bisagra C⁶⁰¹>S (597-611), CH2 (612-721), CH3 P⁸²⁶>T (722-826), CHS (827-828))]), variante (C⁶⁰¹>S, P⁸²⁶>T) fusionada al fragmento de cubierta C-terminal de la inmunoglobulina M human, pentámero covalente de dímeros, producido en células ováricas de hámster Chino (CHO), forma glicosilada alfa
receptor señuelo basado en la enzima convertidora de angiotensina 2, antiviral

2833647-10-0

Monomer sequence / Séquence du monomère / Secuencia del monómero		
TIEEQAKTFL	DKFNHEAEDL	FYQSSLASWN YNTNITEENV QNMNAGDKW 50
SAFLKEQSTL	AQMYPLQEIQ	NLTVKLQLQA LQQNGSSVLS EDKSKRLNTI 100
INTMSTIYST	GKVCNPDNPQ	ECLLLEPGLN EIMANSIDYN ERLWAWESWR 150
SEVGKQLRPL	YEEYVVLKNE	MARANHYEDY GDYWRGDYEV NGVDGYDYSR 200
GQLIEDVEHT	FEEIKPLYEH	LHAYVRAKLM NAYPSYISPI GCLPAHLLGD 250
MWGRFWTNLY	SLTVPFQGKP	NIDVTDAMVD QAWDAQRIFK EAEKFFVSVG 300
LPNMTQGFWE	NSMLTDPGNV	QKAVCHPTAW DLGKGDFRIL MCTKVTMDDF 350
LTAHNEGNI	QYDMAYAAQP	FLLRNGANEG FHEAVGEIMS LSAATPKHLK 400
SIGLLSPDFQ	EDNETEINFL	LKQALTIVGT LPFTYMLEKW RWMVFKGEIP 450
KDQWMKKWWE	MKREIVGVVE	PVPHDETYCD PASLFHVSND YSFIRYTRT 500
LYQFQFEAL	CQAAKHGEPH	LHKCDISNSTE AGQKLFNMLR LGKSEPWTLA 550
LENVVGAKNM	NVRPLLNYFE	PLFTWLKDQN KNSFVGWSTD WSPYADPKS 600
SDKTHTCPCC	PAPELLGGPS	VFLFPKPKPD TLMISRTPEV TCVVDVDSHE 650
DPEVKFNWYV	DGVEVHNART	KPREEQYNST YRVVSVLTVL HQDWLNGKEY 700
KCKVSNKALP	APIEKTISK	KGQPREPQVY TLPFSRDEL KNQVSLTCLV 750
KGFYPSDIAV	EWESNGQFEN	NYKTTFPVLD SDGSFFLYSK LTVDKSRWQQ 800
GNVFSCSVMH	ELAHNHYTKL	SLSLSTGPN LNTSVSLVMSD TAGTCY 846
Mutation / Mutation / Mutación		
1 ^{Q52} >del, H ³⁵⁷ >N ³⁵⁵ , H ³⁶¹ >N ³⁵⁹ , C ⁶⁰¹ >S, P ⁸²⁶ >T		
Post-translational modifications		
Disulfide location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro		
Intra-chain in each of the 10 ACE2 monomers: 114-122, 325-342, 511-523, 642-702, 748-806		
Intra-chain within each of the five Fc dimers: 607-607, 607'-607', 610-610, 610'-610'		
Inter-chain among the five IgM tail dimers: 845 ^m -845 ^m (1≤m≤5; 1≤n≤5; m≠n)		
N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación		
N34, N71, N84, N303, N413, N527, N678, N833 (in all 10 subunits of the pentamer of dimers)		
Deamidation sites / Sites de désamidation / Posiciones de desamidación		
98, 169, 175, 191, 375, 667, 696, 742, 765, 815 (in all 10 subunits of the pentamer of dimers)		

deunirmatrelvirum
deunirmatrelvir


(1R,2S,5S)-N-((1S)-1-cyano-2-[(3S)-2-oxo(5,5-²H₂)pyrrolidin-3-yl]ethyl)-3-[(2S)-3,3-dimethyl-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)butanoyl]-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamide
antiviral

deunirmatrelvir


(1R,2S,5S)-N-((1S)-1-cyano-2-[(3S)-2-oxo(5,5-²H₂)pyrrolidin-3-yl]éthyl)-3-[(2S)-3,3-diméthyl-2-(2,2,2-trifluoroacétamido)butanoyl]-6,6-diméthyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxamide
antiviral

deunirmatrelvir

(1R,2S,5S)-N-((1S)-1-ciano-2-[(3S)-2-oxo(5,5-²H₂)pirrolidin-3-il]etil)-3-[(2S)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)butanoil]-6,6-dimetil-3-azabicio[3.1.0]hexano-2-carboxamida
antiviral



2861202-79-9

**ibuzatrelvirum**

ibuzatrelvir


methyl {(2S)-1-[(2S,4R)-2-(((1S)-1-cyano-2-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]éthyl)carbamoyl)-4-(trifluorométhyl)pyrrolidin-1-yl]-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl}carbamate
antiviral

ibuzatrelvir


{{(2S)-1-[(2S,4R)-2-(((1S)-1-cyano-2-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]éthyl)carbamoyl)-4-(trifluorométhyl)pyrrolidin-1-yl]-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl}carbamate de méthyle
antiviral

ibuzatrelvir

{{(2S)-1-[(2S,4R)-2-(((1S)-1-ciano-2-[(3S)-2-oxopirrolidin-3-il]etil)carbamoil)-4-(trifluorometil)pirrolidin-1-il]-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il}carbamato de metilo
antiviral



2755812-39-4

**olgotrelvirum**

olgotrelvir

(1R,2S)-1-hydroxy-2-[(2S)-2-(1H-indole-2-carboxamido)-4-méthylpentanamido]-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propane-1-sulfonic acid
antiviral

olgotrelvir


acide (1R,2S)-1-hydroxy-2-[(2S)-2-(1H-indole-2-carboxamido)-4-méthylpentanamido]-3-[(3S)-2-oxopyrrolidin-3-yl]propane-1-sulfonique
antiviral

olgotrelvir

ácido (2S)-1-hidroxi-2-[(2S)-2-(1H-indol-2-carboxamido)-4-metilpentanamido]-3-[(3S)-2-oxopirrolidin-3-il]propano-1-sulfónico
antiviral

C₂₂H₃₀N₄O₇S

2763596-71-8



pemivibartum #
pemivibart

immunoglobulin G1-lambda2, anti-[severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) spike (S) protein, receptor binding domain (RBD)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain *Homo sapiens* (1-454) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-21*07 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.17] (26-33.51-58.97-113)) (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, G1v78 L107, A114 (CH1 R120 (221) (125-222), hinge 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365), M107>L (435), N114>A (441) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-217')-disulfide with lambda2 light chain *Homo sapiens* (1'-218') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-40*01 (95.9%) -IGLJ1*01 (91.7%), CDR-IMGT [9.3.12] (26'-34'.52'-54'.91'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (113'-218')]; dimer (233-233'':236-236'')-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, glycoform alfa
antiviral

pémivibart

immunoglobuline G1-lambda2, anti-[domaine de liaison au récepteur (RBD) de la glycoprotéine spike (S) du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*; chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens* (1-454) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-21*07 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.17] (26-33.51-58.97-113)) (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, G1v78 L107, A114 (CH1 R120 (221) (125-222), charnière 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365), M107>L (435), N114>A (441) (348-452), CHS (453-454)) (125-454)], (227-217')-disulfure avec la chaîne légère lambda2 *Homo sapiens* (1'-218') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-40*01 (95.9%) -IGLJ1*01 (91.7%), CDR-IMGT [9.3.12] (26'-34'.52'-54'.91'-102')) (1'-112') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (113'-218')]; dimère (233-233'':236-236'')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa
antiviral

pemivibart

inmunoglobulina G1-lambda2, anti-[dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína de espícula (S) del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*; cadena pesada gamma1 *Homo sapiens* (1-454) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-21*07 (88.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.17] (26-33.51-58.97-113)) (1-124) -*Homo sapiens* IGHG1*03, G1m3, nG1m1 CH1 R120, CH3 E12, M14, G1v78 L107, A114 (CH1 R120 (221) (125-222), bisagra 1-15 (223-237), CH2 (238-347), CH3 E12 (363), M14 (365), M107>L (435), N114>A (441) (348-452), CHS (453-454) (125-454)], (227-217')-disulfuro con la cadena ligera lambda2 *Homo sapiens* (1'-218') [V-LAMBDA (*Homo sapiens* IGLV1-40*01 (95.9%) -IGLJ1*01 (91.7%), CDR-IMGT [9.3.12] (26'-34'.52'-54'.91'-102'')] (1'-112') -*Homo sapiens* IGLC2*01 (100%) (113'-218')]; dímero (233-233":236-236")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, forma glicosilada alfa *antiviral*

2858673-18-2

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada	
EVQLVESGGG LVKPGGSLRL SCAASGFTFG SYEMNWRQA PGKLEWVSS	50
ISEDGYSTYY PDSLKGRFTI SRDSAKNSLY LQMNSLRADD TAVYYCARDF	100
GGDTAWAGTG FTYWQGQTLV TVSSASTKGP SVFFLAPSSK STSGGTAAALG	150
CLVKDYFPEP VTVSWNSGAL TSGVHTFPAV LQSSGLYSLS SVVTVPSSSL	200
GTQTYICNVN HKFSNTKVDK RVEPKSCDKT HTCPPCPAPE LGGPSPVFLF	250
PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE	300
EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNKKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP	350
REPQVYTLFP SREEMTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT	400
TPPVLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVLHEALH AHYTQKLSLS	454
SPK	
Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera	
QSVLTQPPSV SGAPGQRITI SCTGSSSNIG AGYDVHWYQQ LPGTAPKLLI	50
YGSSSRNSGV PDRFSGSKSG TSASLAITGL QAEDADYYC QSYDSSLVL	100
YTFGTGTKVT VLGGPKAAPS VTLFPPSSEE LQANKATLVC LISDFYPGAV	150
TVAWKADSSP VKAGVETTFP SKQSNKYAA SSYLSLTPEQ WKSHRSYSCQ	200
VTHEGSTVEK TVAPTECS	218

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22°-96' 151°-207' 268°-328' 374°-432'
22°-96" 151°-207" 268°-328" 374°-432"
Intra-L (C23-C104) 22°-90' 140°-199'
22°-90" 140"-199"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 227°-217' 227°-217"
Inter-H-H (h 11, h 14) 233°-233" 236°-236"

N-terminal glutaminyl cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutamilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
L VL V-LAMBDA Q1: 1', 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 304, 304"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 454, 454"

rovunaptabinum
rovunaptabin

2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-2'-deoxyguanylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-2'-deoxyguanosine
immunomodulator, β1-adrenoreceptor-autoantibodies neutralizing aptamer

rovunaptabine	2'-désoxyguanylyl-(3'→5')-2'-désoxyguanylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-2'-désoxyguanylyl-(3'→5')-2'-désoxyguanylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-2'-désoxyguanylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-2'-désoxyguanylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-thymidylyl-(3'→5')-2'-désoxyguanylyl-(3'→5')-2'-désoxyguanosine <i>immunomodulateur, aptmère neutralisant les autoanticorps antiadrénorecepteurs β1</i>
rovunaptabina	2'-desoxiguanilil-(3'→5')-2'-desoxiguanilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-2'-desoxiguanilil-(3'→5')-2'-desoxiguanilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-2'-desoxiguanilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-2'-desoxiguanilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-timidilil-(3'→5')-2'-desoxiguanosina <i>inmunomodulador, aptámero neutralizante los autoanticuerpos antiadrenoreceptores β1</i>
	$C_{150}H_{187}N_{57}O_{94}P_{14}$ 145563-68-4
	(3'-5')d(G-G-T-T-G-G-T-G-T-G-G-T-T-G-G)
	N : nucleoside / nucléoside / nucleósido dN : 2'-deoxy-N / 2'-désoxy-N / 2'-desoxi-N
talovirtidum	
talovirtide	L-valyl-L-α-aspartyl-L-leucylglycyl-L-α-aspartyl-L-isoleucyl-L-serylglycyl-L-isoleucyl-L-asparaginyl-L-alanyl-L-seryl-L-valyl-L-valyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-lysyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-α-aspartyl-L-arginyl-L-leucyl-L-asparaginyl-L-α-glutamyl-L-valyl-L-alanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-leucyl-L-asparaginyl-L-α-glutamyl-L-seryl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-α-glutamyl-L-leucylglycyl-L-serylglycyl-L-serylglycyl-S-{1-[(cholest-5-en-3β-yl)oxy]-1,16-dioxo-3,6,9,12-tetraoxa-15-azaheptadecan-17-yl}-L-cysteinamide <i>antiviral</i>
talovirtide	L-valyl-L-α-aspartyl-L-leucylglycyl-L-α-aspartyl-L-isoleucyl-L-sérylglycyl-L-isoleucyl-L-asparaginyl-L-alanyl-L-séryl-L-valyl-L-valyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-lysyl-L-α-glutamyl-L-isoleucyl-L-α-aspartyl-L-arginyl-L-leucyl-L-asparaginyl-L-α-glutamyl-L-valyl-L-alanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-leucyl-L-asparaginyl-L-α-glutamyl-L-séryl-L-leucyl-L-isoleucyl-L-α-aspartyl-L-leucyl-L-glutamyl-L-α-glutamyl-L-leucylglycyl-L-sérylglycyl-L-sérylglycyl-S-{1-[(cholest-5-én-3β-yl)oxy]-1,16-dioxo-3,6,9,12-tétraoxa-15-azaheptadécan-17-yl}-L-cystéinamide <i>antiviral</i>
talovirtida	L-valil-L-α-aspartil-L-leucilglicil-L-α-aspartil-L-isoleucil-L-serilglicil-L-isoleucil-L-asparaginil-L-alanil-L-seril-L-valil-L-valil-L-asparaginil-L-isoleucil-L-glutaminil-L-lisil-L-α-glutamil-L-isoleucil-L-α-aspartil-L-arginil-L-leucil-L-asparaginil-L-α-glutamil-L-valil-L-alanil-L-lisil-L-asparaginil-L-leucil-L-asparaginil-L-α-glutamil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-L-α-aspartil-L-leucil-L-glutaminil-L-α-glutamil-L-leucilglicil-L-serilglicil-L-serilglicil-S-{1-[(colest-5-en-3β-il)oxi]-1,16-dioxo-3,6,9,12-tetraoxa-15-azaheptadecan-17-il}-L-cisteinamida <i>antiviral</i>


C₂₄₃H₄₁₀N₆₀O₈₁S

2868285-05-4

VDLGDISGIN ASVVNIQKEI DRLNEVAKNL NESLIDLQEL GSGSGC 46

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados

C (46)

**timcevibartum #**

timcevibart

immunoglobulin G1-kappa, anti-[severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) spike (S) protein, receptor binding domain (RBD)], *Homo sapiens* monoclonal antibody;

gamma1 heavy chain *Homo sapiens* (1-445) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (96.9%) -(IGHD)-IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [8.7.10] (26-33.51-57.96-105)) (1-116) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v50-79 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.A, G27, Q110, S115 (CH1 K120 (213) (117-214), hinge 1-15 (215-229), CH2 E1.4>del, L1.3>P (232), L1.2>V (233), G1.1>A (234), D27>G (263), A110>Q (325), A115>S (328) (230-338), CH3 D12 (354), L14 (356) (339-443), CHS (444-445)) (117-445)], (219-215')-disulfide with kappa light chain *Homo sapiens* (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-9*01 (97.9%) -IGKJ3*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimer (225-225'':228-228'')-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, derived from the cell line CHO-K1, glycoform alfa

antiviral

timcévibart

immunoglobuline G1-kappa, anti-[domaine de liaison au récepteur (RBD) de la glycoprotéine spike (S) du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2)], anticorps monoclonal *Homo sapiens*;

chaîne lourde gamma1 *Homo sapiens* (1-445) [VH (*Homo sapiens*IGHV3-66*01 (96.9%) -(IGHD)-IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [8.7.10] (26-33.51-57.96-105)) (1-116) -*Homo sapiens*IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v50-79 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1, G27, Q110, S115 (CH1 K120 (213) (117-214), charnière 1-15 (215-229), CH2 E1.4>del, L1.3>P (232), L1.2>V (233), G1.1>A (234), D27>G (263), A110>Q (325), A115>S (328) (230-338), CH3 D12 (354), L14 (356) (339-443), CHS (444-445)) (117-445)], (219-215')-disulfure avec la chaîne légère kappa *Homo sapiens* (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens*IGKV1-9*01 (97.9%) -IGKJ3*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens*IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dimère (225-225'':228-228'')-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), dérivant de la lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa

antiviral

timcevibart

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína de espícula (S) del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2)], anticuerpo monoclonal *Homo sapiens*; cadena pesada gamma1 *Homo sapiens* (1-445) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-66*01 (96.9%) -(IGHD) -IGHJ3*02 (100%), CDR-IMGT [8.7.10] (26-33.51-57.96-105))] (1-116) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1 CH1 K120, CH3 D12, L14, G1v50-79 CH2 delE1.4, P1.3, V1.2, A1.1, G27, Q110, S115 (CH1 K120 (213) (117-214), bisagra 1-15 (215-229), CH2 E1.4>del, L1.3>P (232), L1.2>V (233), G1.1>A (234), D27>G (263), A110>Q (325), A115>S (328) (230-338), CH3 D12 (354), L14 (356) (339-443), CHS (444-445)) (117-445)], (219-215')-disulfuro con la cadena ligera kappa *Homo sapiens* (1'-215') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-9*01 (97.9%) -IGKJ3*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.10] (27'-32'.50'-52'.89'-98')) (1'-108') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3, A45.1 (154'), V101 (192') (109'-215')]; dímero (225-225":228-228")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular derivada de CHO-K1SV, forma glicosilada alfa
antiviral

2857862-27-0

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVESGGG LVQPGGSLRL SCAASGLTVS SNYMSWVRQA PGKGLEWVSV 50
IYSGGSTYYA DSVKGRFTLS RDDSKNTLYL QMNSLRAEDT AVYYCARDVA 100
DAFDINGQGT MVTVSSASTK GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP 150
EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS LSSVTVTPSS SLGTQTYICN 200
VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KHTCTCPCPA PPVAGPSVFL FPPKPKDTLM 250
ISRTPEVTCV VVGVSHEDEP VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV 300
VSVLTVLHQD WLNKGEYKCK VSNKQLPSPV EKTISKAKGQ PREPQVYTLF 350
PSRDELTKNQ VSLTCLVKGK YPSDIAVEWE SNGQFENNYK TTPPVLDSDG 400
SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMEAL HNHYTQKSL SLPKG 445

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
DIVMTQSPSF LSASVGDRTV ITCRASQGIS SYLAWYQQKPK GKAPKLLIYA 50
ASTLQSGVPS RFSGSGSGTE FTLTISSLQF EDFATYYCQQ LNSYPPEFEG 100
PGTKVDIKRT VAAPSVFIFP PSDEQLKSGT ASVVCLLNNF YPREAKVQWK 150
VDNALQSGNS QESVTEQDSK DSTYLSSTL TLSKADYEKHK VYACEVTHQ 200
GLSSPVTKSF NRGEK 215

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22"-95 143-199 259-319 365-423
22"-95" 143"-199" 259"-319" 365"-423"
Intra-L (C23-C104) 23'-88' 135'-195'
23"-88" 135"-195"
Inter-H-L (h 5-CL 126) 219-215' 219"-215"
Inter-H-H (h 11, h 14) 225-225" 228-228"

N-terminal glutaminyI cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal
Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4: 295, 295"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal
H CHS K2: 443, 445"

tirfipiravirum
tirfipiravir


(4E)-2',3'-O-carbonyl-N⁴-hydroxycytidine 5'-(2-methylpropanoate)
antiviral

tirfipiravir 5'-(2-méthylpropanoate) de (4 Ξ)-2',3'-O-carbonyl-*N*⁴-hydroxycytidine
antiviral

tirfipiravir 5'-(2-metilpropanoato) de (4 Ξ)-2',3'-O-carbonil-*N*⁴-hidroxicitidina
antiviral

C₁₄H₁₇N₃O₈

2759996-93-3



vecilmeranum #
vecilmeran

messenger RNA (mRNA), 5'-capped, encoding a codon-optimised receptor binding domain (RBD) of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) spike (S) glycoprotein (Omicron sub-lineages B.1.1.529.4 and B.1.1.529.5; also known as BA.4 and BA.5; based upon, GISAID: EPI_ISL_12431317) expressed as a fusion protein with a human immunoglobulin (Ig) ϵ -chain signal peptide, flanked by a 5' untranslated region (UTR) derived from *Xenopus laevis* β -globin gene (HBB) and a 3' UTR derived from the human α -globin gene (HBA1), and terminated by a 3' polyadenylation (polyA) tail
immunological agent for active immunization (anti-SARS-CoV-2)

vécilméran

ARN messenger (ARNm), protégé d'une coiffe en 5', codant un domaine de liaison au récepteur (RBD) aux codons optimisés de la glycoprotéine de spicule (S) du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) (sous-lignées Omicron B.1.1.529.4 et B.1.1.529.5; également connu sous le nom de BA.4 et BA.5; d'après, GISAID: EPI_ISL_12431317) exprimée sous la forme d'une protéine de fusion avec un peptide signal de la chaîne ϵ d'une immunoglobuline (Ig) humaine, flanquée d'une région non traduite (UTR) en 5' dérivée du gène de la β -globine de *Xenopus laevis* (HBB) et d'une UTR en 3' dérivée du gène de l' α -globine humaine (HBA1), et terminée par une queue polyadénylation (polyA) en 3'
agent immunologique pour immunisation active (anti-SARS-CoV-2)

vecilmerán

ARN mensajero (ARNm), protegido en 5', que codifica, con codones optimizados, para el dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína de la espícula (S) del coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-Cov-2) (sublinajes B.1.1.529.4 and B.1.1.529.5 de Omicron; también conocidos como BA.4 y BA.5; basado en GISAID: EPI_ISL_12431317), expresado como una proteína de fusión con el péptido señal de la cadena ϵ de

la inmunoglobulina (Ig) humana, flanqueado por una región 5' no traducida (UTR) derivada del gen de la β -globina (HBB) de *Xenopus laevis* y una 3' UTR derivada del gen de la α -globina (HBA1) humana y terminado con una cola poliadenilación (poliA)
agente inmunológico para inmunización activa (anti-SARS-CoV-2)

2854349-87-2

velucovacapum #
 velucovacap

N-L-glycyl-split protein tag peptide (2-15) fused via the peptide linker ¹⁶GSGTAGGGSGS²⁶ to *Acinetobacter* phage AP205 coat protein fragment (Met¹>del, 2-131, 27-156 in the current sequence), produced in *Escherichia coli*, conjugated via isopeptide bond (formed by the reaction between N⁹ and K³² with associated loss of one amino group) to *N*-L-glycyl-catcher peptide fragment (2-114) derived from *Streptococcus dysgalactiae* fibronectin binding protein fused via peptide linker ¹¹⁵GSGS¹¹⁸ to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) spike glycoprotein (S glycoprotein) receptor binding domain (RBD) fragment (GenBank ID: QIA20044.1; 306-578, 119-391 in the current sequence) fused via peptide linker ³⁹²GSGS³⁹⁵ to a ³⁹⁶EPEA³⁹⁹ C-terminal tag peptide, produced in *Drosophila melanogaster* S2 cells, glycoform alfa. The *Acinetobacter* phage AP205 coat protein-containing monomers self-assemble into a virus-like particle (VLP) consisting of 180 subunits of which approximately 61 surface exposed copies spontaneously conjugate with the RBD-containing recombinant fusion protein when mixed together
immunological agent for active immunization (anti-SARS-CoV2)

vélucovacap

peptide *N*-L-glycyl-split servant de marquage protéique (2-15) fusionné via le peptide liant ¹⁶GSGTAGGGSGS²⁶ à un fragment de la protéine d'enveloppe d'*Acinetobacter* phage AP205 (Met¹>del, 2-131, 27-156 dans la séquence actuelle), produit chez *Escherichia coli*, conjugué par liaison isopeptidique (formée par la réaction entre N⁹ et K³² avec perte associée d'un groupe amine) à un fragment du peptide *N*-L-glycyl-catcher (2-114) dérivé de la protéine de liaison à la fibronectine de *Streptococcus dysgalactiae* fusionné via la liaison peptidique ¹¹⁵GSGS¹¹⁸ à un fragment de domaine de liaison au récepteur (RBD) de la glycoprotéine de spicule du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) (identifiant GenBank: QIA20044. 1; 306-578, 119-391 dans la séquence actuelle) fusionné via le peptide liant ³⁹²GSGS³⁹⁵ à un peptide de marquage en C-terminal ³⁹⁶EPEA³⁹⁹, produit dans les cellules S2 de *Drosophila melanogaster*, glycoforme alfa. Les monomères contenant la protéine d'enveloppe du phage *Acinetobacter* AP205 s'auto-assemblent en une particule de type virus (VLP) composée de 180 sous-unités dont environ 61 copies présentées à la surface se conjuguent spontanément avec la protéine de fusion recombinante contenant le RBD lorsqu'elles se mélangent
agent immunologique pour immunisation active (anti-SARS-CoV-2)

velucovacap

péptido de marca de proteína *N*-L-glicil-dividido (2-15) fusionado a través de enlace peptídico ¹⁶GSGTAGGGSGS²⁶ al fragmento de proteína de cubierta del fago *Acinetobacter* AP205 (Met¹>del, 2-131, 27-156 en la secuencia actual), producido en *Escherichia coli*, conjugado a través de un enlace isopéptido (formado por la reacción entre N⁹ y K³² con pérdida asociada a un grupo amino) a un fragmento peptídico *N*-L-glicil-receptor (2-114) derivado de

Streptococcus dysgalactiae proteína de unión a la fibronectina fusionada a través de enlace peptídico ¹¹⁵GS¹¹⁸ al fragmento del dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína de espícula (glicoproteína S) del síndrome severo agudo respiratorio del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (GenBank ID: QIA20044.1; 306-578, 119-391 en la secuencia actual) fusionado a través de enlace peptídico ³⁹²GS³⁹⁵ a un ³⁹⁶EPEA³⁹⁹ péptido de marca de proteína C-terminal, producido en células *Drosophila melanogaster* S2, forma glicosilada alfa. Los monómeros que contienen la proteína de cubierta del fago *Acinetobacter* AP205 se autoensamblan en una partícula similar al virus (VLP) que consta de 180 subunidades, de las cuales aproximadamente 61 copias expuestas a la superficie se conjugan espontáneamente con la proteína de fusión recombinante que contiene RBD cuando se mezclan

agente inmunológico para inmunización activa (anti-SARS-CoV-2)

2856375-51-2

Sequence / Séquence / Secuencia

VLP-AP205 monomer

GNPLIVMVND TTKVKSSGTA	<i>GGSGGS</i> ANKP MQPITSTANK IVWSDPTRL	50
TTFSASLLRQ RVKVGIAELN	NVSGQYVS VY KRPAPKPEGC ADACVIMPNE	100
NQSIRTVISG SAENLATLKA	EWETHKRNVD TLFASGNAGL GFLDPTAAIV	150
SSDTTA		156

SARS-CoV-2 RBD-antigen monomer

GIDTMSGLSG ETGQSGNTTI EEDSTTHVKF	SKRDSNGKEL AGAMIELRNL	50
SGQTIQSWVS DGTVKDFYLM PGTYQFVETA	APEGYELAAP ITFTVQDNGE	100
VIIQGRLLTRG DVHIGSGSRV	QPTESIVRFP NITNLCPFGE VFNATRFASV	150
YAWNRRKRSN CVADYSVLIN	SASFSTFKCY GVSPTKINDL CFTNVYADSF	200
VIRGDEVRFQI APGQTGKIAD	YNYKLDDFT GCVIAWNSNN LDSKVGNGYN	250
YLRLFRKSN LKPFERDIST	EIQAGSTPC NGVEGFNCYF PLQSYGFQPT	300
NGVGYPYRV VVLSFELLHA	PATVCGPKKS TNLVKNKCVN FNFNGLTGTG	350
VLTESNKKFL PFQQFGRDIA	DTTDAVRDPQ TLEILDITPC <i>SGSGSEPEA</i>	399

Mutation / Mutation / Mutación

Met¹ > Met²⁷del

Peptide linker / Peptide liant / Péptido de unión

VLP-AP205: ¹⁶*GS***GTAGGGGS**²⁶
 RBD-antigen: ¹¹⁵*GS***GS**¹¹⁸ and ³⁹²*GS***GS**³⁹⁵

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Inter-chain VLP-AP205: 90^m-94ⁿ (m=1,...,180; n=1,...,180; m≠n) (predicted)

Intra-chain RBD-antigen: 136-161, 179-232, 191-325, 280-288, 338-390 (predicted)

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

RBD-antigen: N17, N49, N131, N143

Gluconoylation sites / Sites de gluconoylation / Posiciones de gluconoilación

VLP-AP205: G1 (K13 and K63 to a minor extent)

Phosphogluconoylation sites

VLP-AP205: G1 (K13 and K63 to a minor extent)

Oxidation sites / Sites d'oxydation / Posiciones de oxidación

VLP-AP205: M31 RBD-antigen: M44

Deamidation sites / Sites de désamidation / Posiciones de desamidación


VLP-AP205: N9, N28, N70, N71

RBD-antigen: N160, N170, (N281/N287/Q293/N301)*, N344

*Deamidation can be in any of the listed amino acids

Amide bridge location / Position du pont amide / Posición del puente amido

VLP-AP205 D⁹- RBD- antigen K³² (VLP-AP205 N⁹- RBD-antigen norleucine³²)
 approximately 61 RBD-antigen monomers are conjugated per VLP, which itself is composed of 180 monomers of AP205



Names for chemical modifications of INN (substituent groups, counterions, adduct partners, etc.):

Many pharmaceutical substances for which an International Nonproprietary Name (INN) has been established are used as modified derivatives (salts, esters, protein-drug conjugates, solvates, etc.). The chemical modification (including counterions) involved may be of complex nature and it is then inconvenient to use its systematic chemical name. Consequently, shorter nonproprietary names for such modifications have been devised, and these are recommended for creating modified International Nonproprietary Names (INN).

Dénominations applicables aux modifications chimiques des DCI (groupes substituants, contre-ions, adduits, etc.) :

Certaines substances pour lesquelles une dénomination commune internationale proposée a été établie sont parfois utilisées comme dérivés modifiés (sels, esters, médicaments conjugués à des protéines, produits de solvation, etc.). Les modifications chimiques (incluant les contre-ions) sont alors quelques fois si complexes qu'il est malcommode de les désigner conformément à la nomenclature chimique systématique. Des dénominations communes abrégées ont donc été formées ou choisies pour certaines d'entre elles et il est suggéré de les employer pour créer les dénominations communes internationales modifiées (DCIM).

Denominaciones aplicables a modificaciones químicas de las DCI (grupos sustituyentes, contraiones, aductos, etc.):

Muchas sustancias farmacéuticas para las cuales hay establecidas una denominación común internacional (DCI) pueden usarse como derivados modificados (sales, ésteres, medicamentos conjugados con proteínas, solvatos, etc.). Las modificaciones químicas (incluidos los contraiones) implicadas pueden ser de naturaleza compleja y por tanto es inapropiado utilizar su nombre químico sistemático. Como consecuencia, se han diseñado denominaciones abreviadas para estas modificaciones y se recomiendan para la creación de Denominaciones Comunes Internacionales modificadas (DCIM).

basivarsenum

basivarsen


1-((5*aRS*,6*SR*,6*aSR*)-1-[(6*S*,9*S*)-1-amino-6-[[4-(((6-[[*all-P-ambo*-2'-*O*,4'-*C*-methylene-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-5-methyl-2'-*O*,4'-*C*-methylene-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-5-methyl-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-deoxy-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-5-methyl-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-(2-methoxyethyl)-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-2'-*O*,4'-*C*-methylene-*P*-thioadenylyl-(5'→3')-5-methyl-2'-*O*,4'-*C*-methylene-5'-cytidilyl]oxy]hexyl)carbamoyl]oxy)methyl]phenyl]carbamoyl}-1,8,11-trioxo-9-(propan-2-yl)-14,17,20-trioxa-2,7,10-triazadocosan-22-yl]-1,4,5,5*a*,6,6*a*,7,8-octahydrocyclopropa[5,6]cycloocta[1,2-*d*][1,2,3]triazol-6-yl]-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azanonadecan-19-oyl

basivarsen

1-((5*aRS*,6*SR*,6*aSR*)-1-[(6*S*,9*S*)-1-amino-6-[[4-(((6-[[*tout-P-ambo*-2'-*O*,4'-*C*-méthylène-*P*-thioadénylyl-(5'→3')-5-méthyl-2'-*O*,4'-*C*-méthylène-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-5-méthyl-*P*-thiouridylyl-(5'→3')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-5-méthyl-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thiocytidylyl-(5'→3')-2'-*O*-(2-méthoxyéthyl)-*P*-thioguanilyl-(5'→3')-2'-*O*,4'-*C*-méthylène-*P*-thioadénylyl-(5'→3')-5-méthyl-2'-*O*,4'-*C*-méthylène-5'-cytidilyl]oxy]hexyl)carbamoyl]oxy)méthyl]phényl]carbamoyl}-1,8,11-trioxo-9-(propan-2-yl)-14,17,20-trioxa-2,7,10-triazadocosan-22-yl]-1,4,5,5*a*,6,6*a*,7,8-octahydrocyclopropa[5,6]cycloocta[1,2-*d*][1,2,3]triazol-6-yl]-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azanonadécan-19-oyl

basivarsén

1-((5*aRS*,6*SR*,6*aSR*)-1-((6*S*,9*S*)-1-amino-6-[[4-((6-[[*todo-P-ambo*-2'-*O*,4'-*C*-metileno-*P*-tioadenilil-(5'→3')-5-metil-2'-*O*,4'-*C*-metileno-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-*O*-(2-metoxietil)-5-metil-*P*-tiouridilil-(5'→3')-2'-*O*-(2-metoxietil)-*P*-tioguanilil-(5'→3')-2'-deoxi-*P*-tioadenilil-(5'→3')-2'-deoxi-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-deoxi-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-deoxi-*P*-tioadenilil-(5'→3')-2'-deoxi-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-deoxi-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-deoxi-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-5-metil-2'-*O*-(2-metoxietil)-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-*O*-(2-metoxietil)-*P*-tioguanilil-(5'→3')-2'-*O*,4'-*C*-metileno-*P*-tioadenilil-(5'→3')-5-metil-2'-*O*,4'-*C*-metileno-5'-citidilil[oxy]hexil]carbamoil[oxy]metil]fenil]carbamoil)-1,8,11-trioxo-9-(propan-2-il)-14,17,20-trioxa-2,7,10-triazadocosan-22-il)-1,4,5,6a,6,6a,7,8-octahidrociclopropa[5,6]cicloocta[1,2-*d*][1,2,3]triazol-6-il]-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azanonadecan-19-oilo




R2 : $\text{---}[(3' \rightarrow 5')\text{(P-thio)}(\text{m}^5\text{C-A-Gmoe-m}^5\text{Cmoe-dG-dC-dC-dC-dA-dC-dA-Gmoe-m}^5\text{Umoe-m}^5\text{C-A})$

N : nucleoside / nucléoside / nucleósido

dN : 2'-deoxy-N / 2'-désoxy-N / 2'-desoxi-N

m⁵N : 5-methyl-N / 5-méthyl-N / 5-metil-N

Nmoe : 2'-*O*-methoxyethyl-N / 2'-*O*-méthoxyéthyl-N / 2'-*O*-metoxietil-N



brenegitecanum

brenegitecan


(3*RS*)-1-[(4*S*,13*S*,21*S*)-13-benzyl-1-carboxy-22-[[[(1*S*,9*S*)-9-ethyl-5-fluoro-9-hydroxy-4-methyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1*H*,12*H*-benzo[*de*]pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolin-1-yl]amino]-21-methyl-5,8,11,14,17,22-hexaoxo-20-oxa-2,6,9,12,15,18-hexaazadocosan-4-yl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl

brenegitecan

(3*RS*)-1-[(4*S*,13*S*,21*S*)-13-benzyl-1-carboxy-22-[[[(1*S*,9*S*)-9-éthyl-5-fluoro-9-hydroxy-4-méthyl-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahydro-1*H*,12*H*-benzo[*de*]pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinoléin-1-yl]amino]-21-méthyl-5,8,11,14,17,22-hexaoxo-20-oxa-2,6,9,12,15,18-hexaazadocosan-4-yl]-2,5-dioxopyrrolidin-3-yle

brenegitecán

(3*RS*)-1-[(4*S*,13*S*,21*S*)-13-bencil-1-carboxi-22-[[[(1*S*,9*S*)-9-etil-5-fluoro-9-hidroxi-4-metil-10,13-dioxo-2,3,9,10,13,15-hexahidro-1*H*,12*H*-benzo[*de*]pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolein-1-il]amino]-21-metil-5,8,11,14,17,22-hexaoxo-20-oxa-2,6,9,12,15,18-hexaazadocosan-4-il]-2,5-dioxopirrolidin-3-ilo

**dasaroxetanum**


dasaroxetan

 $N^{2,1}$ -{5-[(8-methyl-3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosan-1-yl)amino]-5-oxopentanoyl}

dasaroxétan

 $N^{2,1}$ -{5-[(8-méthyl-3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosan-1-yl)amino]-5-oxopentanoyle}

dasaroxetán

 $N^{2,1}$ -{5-[(8-metil-3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosan-1-il)amino]-5-oxopentanoilo}**elmanitinum**


elmanitin

1-[6-({1,8-anhydro: $C^{2,4}$, $S^{3,8}$ -cyclo[L-asparaginyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolyl-(4R)-4,5-dihydroxy-L-alloisoleucyl-L-tryptophylglycyl-L-isoleucylglycyl-L-cystein]- $C^{6,4}$ -yl)oxy)hexyl]2,5-dioxopyrrolidin-3-yl

elmanitine

1-[6-({1,8-anhydro: $C^{2,4}$, $S^{3,8}$ -cyclo[L-asparaginyl-(4R)-4-hydroxy-L-prolyl-(4R)-4,5-dihydroxy-L-alloisoleucyl-L-tryptophylglycyl-L-isoleucylglycyl-L-cystéin]- $C^{6,4}$ -yl)oxy)hexyl]2,5-dioxopyrrolidin-3-yle

elmanitina


1-[6-({1,8-anhidro: $C^{2,4}$, $S^{3,8}$ -ciclo[L-asparaginil-(4R)-4-hidroxi-L-prolil-(4R)-4,5-dihidroxi-L-alloisoleucil-L-triptofilglicil-L-isoleucilglicil-L-cistein]- $C^{6,4}$ -il)oxi)hexil]2,5-dioxopirrolidin-3-ilo

grenodum

grenod 6-(nitrooxy)hexanoate

grénod 6-(nitrooxy)hexanoate


grenod 6-(nitrooxi)hexanoato

**pevedotinum**

pevedotin 5-[[[(2S)-1-[[[(2S)-1-{4-[(5S,8S,11S,12R)-11-[(2S)-butan-2-yl]-12-(2-{(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl]-2-oxoethyl)-4,10-dimethyl-3,6,9-trioxo-5,8-di(propan-2-yl)-2,13-dioxo-4,7,10-triazatetradecan-1-yl]anilino)-5-(carbamoylamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-5-oxopentanoyl


pévédotine 5-[[[(2S)-1-[[[(2S)-1-{4-[(5S,8S,11S,12R)-11-[(2S)-butan-2-yl]-12-(2-{(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phénylpropan-2-yl]amino]-1-méthoxy-2-méthyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl]-2-oxoéthyl)-4,10-diméthyl-3,6,9-trioxo-5,8-di(propan-2-yl)-2,13-dioxa-4,7,10-triazatétradécan-1-yl]anilino)-5-(carbamoylamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-méthyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-5-oxopentanoyl

pevedotina 5-[[[(2S)-1-[[[(2S)-1-{4-[(5S,8S,11S,12R)-11-[(2S)-butan-2-il]-12-(2-{(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[[(1S,2R)-1-hidroxi-1-fenilpropan-2-il]amino]-1-metoksi-2-metil-3-oxopropil]pirrolidin-1-il]-2-oxoetil)-4,10-dimetil-3,6,9-trioxo-5,8-di(propan-2-il)-2,13-dioxa-4,7,10-triazatetradecan-1-il]anilino)-5-(carbamoilamino)-1-oxopentan-2-il]amino]-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino]-5-oxopentanoilo


**rostudirsenum**

rostudirsén 1-{[(5aRS,6SR,6aSR)-1-[(6S,9S)-6-[[4-[[[6-[[4-{4-[[all-P-ambo-2''¹-N-acetyl[2',3'-azanediyl-P,2',3'-trideoxy-P-(dimethylamino)-2',3'-seco](5'→2'-N)(GATCTTTACG GTAGAAGGAA CTACAACCTC-5'-O)](dimethylamino)phosphoryl]piperazin-1-yl]-6-[(2-amino-2-oxoethyl)(methyl)amino]-1,3,5-triazin-2-

	yl)oxy]hexyl]carbamoyl)oxy)methyl]phenyl]carbamoyl]-1-amino-1,8,11-trioxo-9-(propan-2-yl)-14,17,20-trioxo-2,7,10-triazadocosan-22-yl]-1,4,5,5a,6,6a,7,8-octahydrocyclopropa[5,6]cycloocta[1,2- <i>d</i>][1,2,3]triazol-6-yl]-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azanonadecan-19-oyl
rostudirsén	1-[(5 <i>aRS</i> ,6 <i>SR</i> ,6 <i>aSR</i>)-1-[(6 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-6-[(4-[[[6-[(4-{4-[[<i>tout-P-ambo-2</i> ¹¹ - <i>N</i> -acetyl[2',3'-azanediyl- <i>P</i> ,2',3'-tridésoxy- <i>P</i> -(diméthylamino)-2',3'-séco]](5'→2'- <i>N</i>)(GATCTTTACG GTAGAAGGAA CTACAACCTC-5'-O)](diméthylamino)phosphoryl]pipérazin-1-yl]-6-[(2-amino-2-oxoéthyl)(méthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)oxy]hexyl]carbamoyl)oxy)méthyl]phényl]carbamoyl]-1-amino-1,8,11-trioxo-9-(propan-2-yl)-14,17,20-trioxo-2,7,10-triazadocosan-22-yl]-1,4,5,5a,6,6a,7,8-octahydrocyclopropa[5,6]cycloocta[1,2- <i>d</i>][1,2,3]triazol-6-yl]-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azanonadécan-19-oyle
rostudirsén	1-[(5 <i>aRS</i> ,6 <i>SR</i> ,6 <i>aSR</i>)-1-[(6 <i>S</i> ,9 <i>S</i>)-6-[(4-[[[6-[(4-{4-[[<i>todo-P-ambo-2</i> ¹¹ - <i>N</i> -acetyl[2',3'-azanedii- <i>P</i> ,2',3'-tridéoxi- <i>P</i> -(diméthylamino)-2',3'-seco]](5'→2'- <i>N</i>)(GATCTTTACGGTAGAAGGAAC TACAACCTC-5'-O)](diméthylamino)fosforil]pipérazin-1-il]-6-[(2-amino-2-oxoetil)(metil)amino]-1,3,5-triazin-2-il)oxi]hexil]carbamoil)oxi]metil]fenil]carbamoil]-1-amino-1,8,11-trioxo-9-(propan-2-il)-14,17,20-trioxo-2,7,10-triazadocosan-22-il]-1,4,5,5a,6,6a,7,8-octahydrocyclopropa[5,6]cicloocta[1,2- <i>d</i>][1,2,3]triazol-6-il]-3-oxo-2,7,10,13,16-pentaoxa-4-azanonadecan-19-oilo

**tesaroxetanum**

tesaroxetan	3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosane-1,8-diyl
tesaroxétan	3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosane-1,8-diyle
tesaroxetán	3,6,10,13,16,19-hexaazabicyclo[6.6.6]icosano-1,8-diilo



tirumotecanum

tirumotecan


5-(6-[[[1-[(3*S*)-38-amino-34-[[4-[[[(4*S*)-4-ethyl-11-{2-[*N*-(propan-2-yl)methanesulfonamido]ethyl}-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolin-4-yl]oxy]carbonyl]oxy]methyl]phenyl]carbamoil]-28,32-dioxo-3,6,9,12,15,18,21,24,30-nonaoxa-27,33-diazaoctatriacontan-1-yl]-1*H*-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amino)-6-oxohex-1-yn-1-yl]pyrimidin-2-yl

tirumotécán

5-(6-[[[1-[(3*S*)-38-amino-34-[[4-[[[(4*S*)-4-éthyl-11-{2-[*N*-(propan-2-yl)méthanesulfonamido]éthyl}-3,14-dioxo-3,4,12,14-tétrahydro-1*H*-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolin-4-yl]oxy]carbonyl]oxy]méthyl]phényl]carbamoil]-28,32-dioxo-3,6,9,12,15,18,21,24,30-nonaoxa-27,33-diazaoctatriacontan-1-yl]-1*H*-1,2,3-triazol-4-yl)méthyl]amino)-6-oxohex-1-yn-1-yl]pyrimidin-2-yle

tirumotecán

5-(6-[[[1-[(3*S*)-38-amino-34-[[4-[[[(4*S*)-4-etil-11-{2-[*N*-(propan-2-il)metanosulfonamido]etil}-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1*H*-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-*b*]quinolin-4-il]oxi]carbonil]oxi]metil]fenil]carbamoil]-28,32-dioxo-3,6,9,12,15,18,21,24,30-nonaoxa-27,33-diazaoctatriacontan-1-il]-1*H*-1,2,3-triazol-4-il)metil]amino)-6-oxohex-1-in-1-il]pirimidin-2-ilo



AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES

Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 117

Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 117

Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Lista 117

(WHO Drug Information, Vol. 31, No. 2, 2017)

p.295 **loncastuximabum tesirinum**

-297 loncastuximab tesirine

loncastuximab tésirine

loncastuximab tesirina

replace the chemical name and structure by the following ones

remplacer le nom chimique et la structure par les suivants

sustitúyase el nombre químico y la estructura por los siguientes

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (B lymphocyte surface antigen B4, Leu-12)], chimeric monoclonal antibody conjugated to the pyrrolobenzodiazepine (PBD) dimer SCX; gamma1 heavy chain (1-449) [*Mus musculus* VH (IGHV1-69*02 (85.70%) -(IGHD) -IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), hinge (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-211')-disulfide with kappa light chain (1'-211') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV4-70*01 (91.40%) -IGKJ1*01) [5.3.7] (1'-104') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3 A45.1 (150), V101 (188) (105'-211')]; dimer (229-229'':232-232'')-bisdisulfide; conjugated, on an average of 2 to 3 cysteines, to the pyrrolobenzodiazepine (PBD) dimer SCX, via a cleavable (valine-alanine dipeptide as cathepsine B cleavage site) maleimide type linker containing a spacer PEG (n=8)

For the *tesirine* part, please refer to the prop.INN List 113, published in the *WHO Drug Information*, Vol.29, No.2, 2015.

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antigène de surface B4 des lymphocytes B, Leu-12)], anticorps monoclonal chimérique conjugué au dimère de pyrrolobenzodiazépine (PDB) SCX; chaîne lourde gamma1 (1-449) [*Mus musculus* VH (IGHV1-69*02 (85.70%) - (IGHD) -IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), charnière (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-211')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-211') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV4-70*01 (91.40%) -IGKJ1*01) [5.3.7] (1'-104') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3(105'-211')]; dimère (229-229'':232-232'')-bisdisulfure; conjugué, sur 2 à 3 cystéines en moyenne, au dimère de pyrrolobenzodiazépine (PBD) SCX, via un linker clivable (dipeptide valine-alanine clivable par la cathepsine B) de type maléimide et comprenant un espaceur PEG (n=8)

Pour la partie *tesirine*, veuillez-vous référer à la Liste 113 des DCI prop, publiée dans le *WHO Drug Information*, Vol.29, No.2, 2015.

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* CD19 (antígeno de superficie B4 de los linfocitos B, Leu-12)], anticuerpo monoclonal quimérico conjugado con el dímero de pirrolobenzodiazepina (PDB) SCX; cadena pesada gamma1 (1-449) [*Mus musculus* VH (IGHV1-69*02 (85.70%) - (IGHD) -IGHJ4*01) [8.8.13] (1-120) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1 (CH1 R120>K (217) (121-218), bisagra (219-233), CH2 (234-343), CH3 E12 (359), M14 (361) (344-448), CHS K2>del (449)) (121-449)], (223-211')-disulfuro con la cadena ligera kappa (1'-211') [*Mus musculus* V-KAPPA (IGKV4-70*01 (91.40%) -IGKJ1*01) [5.3.7] (1'-104') -*Homo sapiens* IGKC*01, Km3(105'-211')]; dímero (229-229'':232-232'')-bisdisulfuro; conjugado, en una media de 2 a 3 cisteinil, con el dímero de pirrolobenzodiazepina (PBD) SCX, mediante un conector escindible (dipéptido valina-alanina escindible por la catepsina B) de tipo maléimida y comprende un espaciador PEG (n=8)

Para la fracción *tesirina* se puede referir a la Lista 113 de DCI prop., publicada en el *WHO Drug Information*, Vol.29, No.2, 2015.

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada
QVQLVQPGAE VVKPGASVKL SCKTSGYTFT SNWMHWKQA PGQGLEWIGE 50
IDPSDSITYN NQNFQGKAKL TVDKSTSTAY MEVSSLRSDD TAVYYCARGS 100
NPYYYAMDYW GQGTSTVTVSS ASTKGPSVFP LAPSSKSTSG GTAALGCLVK 150
DYFPEPVTVS WNSGALTSGV HTFPAVLQSS GLYSLSSVVT VPSSSLGTQT 200
YICNVNHKPS NTKVDKKVEP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP 250
KDTLMISRTPEVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN 300
STYRVVSVLT VILHQQDLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ 350
VYTLPPSREE MTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTTPV 400
LDSGSGFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHHYT QKSLSLSPG 449

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera
EIVLTQSPAI MSASPGERV MTCSASSGVN YMHWYQQKPG TSPRRWIYDT 50
SKLASGVPAR FSGSGSGTSY SLTISSMEPE DAATYYCHQR GSYTFGGGTK 100
LEIKRTVAAP SVFIFPPSDE QLKSGTASVV CLLNMFYPRE AKVQWKVDNA 150
LQSGNSQESV TEQDSKDSY SLSSLTLSK ADYEKHKVYA CEVTHQGLSS 200
PVTKSFNRGE C 211

Post-translational modifications
Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro
Intra-H (C23-C104) 22-96 147-203 264-324 370-428
22"-96" 147"-203" 264"-324" 370"-428"
Intra-L (C23-C104) 23-87 131-191'
23'''-87''' 131'''-191'''
Inter-H-L (h 5-CL 126) * 223-211' 223"-211"
Inter-H-H (h 11, h 14) * 229-229" 232-232"
*One, two or three of the inter-chain disulfide bridges are not present, an average of 2 to 3 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker.
*Un, deux ou trois des ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, 2 à 3 cystéinyl en moyenne étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif.
*Faltan uno, dos o tres puentes disulfuro inter-catenarios, una media de 2 a 3 cisteinil conjugados con sendos enlaces tioéter, a conectores de principio activo.

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación
H CH2 N84.4:
300, 300"
Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

p.537
-538
tarcocimabum
tarcocimab
tarcocimab
tarcocimab

replace the description by the following one
remplacer la description par la suivante
sustitúyase la descripción por la siguiente

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, VEGF)], humanized monoclonal antibody;
gamma1 heavy chain humanized (1-453) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (75.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, G1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 R120>K (220) (124-221), hinge 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), G1>A (243) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), L123>C (449) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (87.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (232-232":235-235")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO)-K1SV cell line lacking the glutamine synthetase gene (GS-KO), glycoform alfa

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (facteur de croissance A de l'endothélium vasculaire, VEGF-A, VEGF)], anticorps monoclonal humanisé;
chaîne lourde gamma1 humanisée (1-453) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (75.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, G1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 R120>K (220) (124-221), charnière 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241),

G1>A (243) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), L123>C (449) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (87.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (232-232":235-235")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) lignée cellulaire CHO-K1SV ne présentant pas le gène de la glutamine synthétase (GS-KO), glycoforme alfa

immunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (factor de crecimiento A del endotelio vascular, VEGF-A, VEGF)], anticuerpo monoclonal humanizado;
cadena pesada gamma1 humanizada (1-453) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (75.8%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, G1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 R120>K (220) (124-221), bisagra 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), G1>A (243) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), L123>C (449) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (87.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (232-232":235-235")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO) línea celular CHO-K1SV en ausencia del gen glutamina sintetasa (GS-KO), forma glicosilada alfa

Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 126**Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 126****Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Lista 126****(WHO Drug Information, Vol. 35, No. 4, 2021)****p.933 anivovetmabum #**

-935 anivovetmab *replace the description and structure by the following ones*
anivovetmab *remplacer la description et la structure par les suivantes*
anivovetmab *sustitúyase la descripción y la estructura por las siguientes*

immunoglobulin G2-kappa, anti-[canine (*Canis lupus familiaris*) parvovirus major capsid protein VP2]], chimeric monoclonal antibody; gamma2 heavy chain chimeric (1-457) [VH Ratnor/Canlupfam (*Rattus norvegicus* IGHV2-32*01 (92.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%)/*Canis lupus familiaris* IGHV4-1*01 (60.2%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.7.16] (26-33.51-57.96-111)) (1-122) -*Canis lupus familiaris* IGHG2*02 (100%) (CH1 (123-219), hinge 1-19 (220-238), CH2 (239-348), CH3 (349-455), CHS (456-457)) (123-457)], (137-213')-disulfide with kappa light chain chimeric (1'-217') [V-KAPPA Ratnor/Canlupfam (*Rattus norvegicus* IGKV6S10*01 (95.8%) -IGKJ5*01 (100%)/*Canis lupus familiaris* IGKV3-18*01 (65.6%) -IGKJ3*01 (83.3%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Canis lupus familiaris* IGKC*01 (100%) (108'-217')]; dimer (234-234":237-237")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, glycoform alfa

immunoglobuline G2-kappa, anti-[protéine de capside majeure VP2 du parvovirus canin (*Canis lupus familiaris*)], anticorps monoclonal chimérique;
chaîne lourde gamma2 chimérique (1-457) [VH Ratnor/Canlupfam (*Rattus norvegicus* IGHV2-32*01 (92.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%)/*Canis lupus familiaris* IGHV4-1*01 (60.2%) -(IGHD) -IGHJ5*01

(92.9%), CDR-IMGT [8.7.16] (26-33.51-57.96-111)) (1-122) -*Canis lupus familiaris* IGHG2*02 (100%) (CH1 (123-219), charnière 1-19 (220-238), CH2 (239-348), CH3 (349-455), CHS (456-457)) (123-457)], (137-213')-disulfure avec la chaîne légère kappa chimérique (1'-217') [V-KAPPA Ratnor/Canlupfam (*Rattus norvegicus* IGKV6S10*01 (95.8%) -IGKJ5*01 (100%)/*Canis lupus familiaris* IGKV3-18*01 (65.6%) -IGKJ3*01 (83.3%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Canis lupus familiaris* IGKC*01 (100%) (108'-217'))]; dimère (234-234"-237-237")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa

inmunoglobulina G2-kappa, anti-[proteína de cápsida mayor VP2 del parvovirus canino (*Canis lupus familiaris*)], anticuerpo monoclonal quimérico; cadena pesada gamma2 quimérica (1-457) [VH Ratnor/Canlupfam (*Rattus norvegicus* IGHV2-32*01 (92.8%) -(IGHD) -IGHJ3*01 (92.9%)/*Canis lupus familiaris* IGHV4-1*01 (60.2%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.7.16] (26-33.51-57.96-111)) (1-122) -*Canis lupus familiaris* IGHG2*02 (100%) (CH1 (123-219), bisagra 1-19 (220-238), CH2 (239-348), CH3 (349-455), CHS (456-457)) (123-457)], (137-213')-disulfuro con la cadena ligera kappa quimérica (1'-217') [V-KAPPA Ratnor/Canlupfam (*Rattus norvegicus* IGKV6S10*01 (95.8%) -IGKJ5*01 (100%)/*Canis lupus familiaris* IGKV3-18*01 (65.6%) -IGKJ3*01 (83.3%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Canis lupus familiaris* IGKC*01 (100%) (108'-217'))]; dímero (234-234"-237-237")-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, forma glicosilada alfa

Heavy chain:

```

QVQLKESGPG LVAPSQTLSL TCTVSGFSL SYHVHWVRQP PGKGLEWLG 50
MWNDDGDTSYN LALNSRLSIS RDTSKSQVFF KMSSLQTEDT ATYYCARPEL 100
PGLTYGVWFF YWQGTLLTV SAASTTAPSV FPLAPSCGST SGSTVALACL 150
VSGYFPEPVT VSWNSGSLTS GVHTFPSVLQ SSGLYSLSSM VTPSSRWPS 200
ETFTCNVAHP ASKTKVDKPV PKRENGRVRP PDCPKCPAP EMLGGPSVFI 250
FPPPKPKDTLL IARTPEVTCV VVDLDPEDPE VQISWFVDGK QMQTAKTQPR 300
EEQFNQTYRV VSVLPIGHQD WLKKGQFTCK VNNKALPSPI ERTISKARGQ 350
AHQPSVYVLP PSREELSKNT VSLTCLIKDF FPPDIDVEWQ SNGQOEPESK 400
YRTTFPQLDE DGSYFLYSLK SVDKSRWQRG DTFICAVMHE ALHNHYTQES 450
LSHSPGK 457

```

Light chain:

```

DIVMTQSPTS MSISVGDRVT MNCKASQNV DSNVDWYQKT GQSPKLLIYK 50
ASNRNTGVPD RFTGSGSGTD FTLTISNMQA EDLAVYYCMQ STSYPLTFGS 100
GTKLEIKRND AQPAYLFPQ SPDQLHTGSA SVVCLLSFY PKDINVWKVW 150
DGVIQDTGIG ESVTEQDKDS TYSLSSLTLM SSTEYLSHEL YSCETHKSL 200
PSTLIKSFQR SECQRVD 227

```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location

Intra-H (C23-C104)	22-95	149-205	269-329	375-435
	22"-95"	149"-205"	269"-329"	375"-435"
Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-193'		
	23'''-88'''	134'''-193'''		
Inter-H-L (CH1 11-CL 126)	137-213'	137"-213"		
Inter-H-H (h 15, h 19)	234-234"	237-237"		

N-terminal glutaminyl cyclization

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl)
H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites

H CH2 N84.4: 305, 305"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans

C-terminal lysine clipping

H CHS K2: 457, 457"

p.1086 **sovleplenibum**

sovleplenib


sovléplénib

sovleplenib

replace the structure by the following one

remplacer la structure par la suivante

sustitúyase la estructura por la siguiente



p.1088

-1090

tarcocimabum tedromerum #

tarcocimab tedromer

tarcocimab tédomère

tarcocimab tédromero

replace the description and structure by the following ones

remplacer la description et la structure par les suivantes

sustitúyase la descripción y la estructura por las siguientes

immunoglobulin G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, VEGF)], humanized monoclonal antibody, conjugated via a linker to a **nine-armed star polymer** with phosphorylcholine polymer end groups; gamma1 heavy chain humanized (1-453) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (75.8%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, G1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 R120>K (220) (124-221), hinge 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), G1>A (243) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), L123>C (449) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfide with kappa light chain humanized (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (87.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimer (232-232":235-235")-bisdisulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1SV lacking the glutamine synthetase (GS-KO) gene, glycoform alfa, substituted at an average of one S atom of cysteine residues 449 and 449" with the (3RS)-1-[1,1,1-tris({3-[2-(2,2,2-tris({2-(alpha-(bromo / ethoxy / hydro / hydroxy)poly[1-(10,10-dimethyl-6-oxido-6-oxo-2,5,7-trioxa-10-aza-6λ⁵-phosphaundecan-10-ium-1-oyl)-1-methylethane-1,2-diyl]-ω-yl)-2-methylpropanoyl]oxy)methyl]ethoxy}acetamido]propanamido)methyl)-16,32-dioxo-3,6,9,12,19,22,25,28-octa-15,31-diazatetratriacontan-34-yl]-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl] (*tedromer*)

immunoglobuline G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (facteur de croissance A de l'endothélium vasculaire, VEGF-A, VEGF)], anticorps monoclonal humanisé, conjugué via un linker à un **polymère en étoile à neuf branches** avec groupes terminaux de polymère phosphorylcholine; chaîne lourde gamma1 humanisée (1-453) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (75.8%) - (IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)) (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, G1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 R120>K (220) (124-221), charnière 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), G1>A (243) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), L123>C (449) (347-451), CHS (452-453)) (124-453)], (226-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa humanisée (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (87.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dimère (232-232":235-235")-bisdisulfure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1SV ne présentant pas le gène de la glutamine synthétase (GS-KO), glycoforme alfa, substitué à une moyenne d'un atome S des résidus cystéine 449 et 449" par le groupe (3RS)-1-[1,1,1-tris({3-[2-(2,2,2-tris({2-(alpha-(bromo / éthoxy / hydro / hydroxy)poly[1-(10,10-diméthyl-6-oxido-6-oxo-2,5,7-trioxa-10-aza-6λ⁵-phosphaundécane-10-ium-1-oyl)-1-méthyléthane-1,2-diyl]-ω-yl)-2-

méthylpropanoyl]oxy)méthyl]éthoxy)acétamido]propanamido)méthyl]-16,32-dioxo-3,6,9,12,19,22,25,28-octaoxa-15,31-diazatétratriacontan-34-yl]-2,5-dioxopyrrolidin-1-yle (*tédromère*)

inmunoglobulina G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (factor de crecimiento A del endotelio vascular, VEGF-A, VEGF)], anticuerpo monoclonal humanizado, conjugado a través de un enlace a un **polímero estrellado con nueve ramas** con grupos terminales de polímero fosforilcolina ;

cadena pesada gamma1 humanizada (1-453) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-30*02 (75.8%) -IGHD) -IGHJ4*01 (93.3%), CDR-IMGT [8.8.16] (26-33.51-58.97-112)] (1-123) -*Homo sapiens* IGHG1*03v, G1m3>G1m17, nG1m1, G1v14 CH2 A1.3, A1.2 (CH1 R120>K (220) (124-221), bisagra 1-15 (222-236), CH2 L1.3>A (240), L1.2>A (241), G1>A (243) (237-346), CH3 E12 (362), M14 (364), L123>C (449) (347-451), CHS (452-453)] (124-453)], (226-214')-disulfuro con la cadena ligera kappa humanizada (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-16*01 (87.4%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)] (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; dímero (232-232'':235-235'')-bisdisulfuro, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1SV en ausencia del gen glutamina sintetasa (GS-KO), forma glicosilada alfa, sustituido en un promedio de un átomo de S de residuos de cisteína 449 y 449" con el grupo (3RS)-1-[1,1,1-tris({3-(2-(2,2,2-tris({2-(α -(bromo / etoxi / hidro / hidroxil)poli[1-(10,10-dimetil-6-oxido-6-oxo-2,5,7-trioxa-10-aza-6 λ ⁵-fosaundecan-10-ilo-1-oi)-1-metiletano-1,2-diil]-w-il)-2-metilpropanoilo)oxi]metil]etoxi]acetamido]propanamido]metil]-16,32-dioxo-3,6,11,2,19,22,25,28-octaoxa-15,31-diazatetratríacontán-34-il]-2,5-dioxopirrolidin-1-ilo (*tedrómero*)

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

INVLVSEGGG	LVPQGGSLRI	SCAAGSEJDT	HYGMNVRQRA	PGKLGLEWVGW	50
INTVIGTEPY	ADGAKRRFRT	LDTSKSTAYT	LOQMSLRADT	TAIVYACYKAF	100
ITQVGHSHWF	DVMQGGTGLT	VSSATGSKST	VFFLAPLSGS	TSGGTAAALG	150
LKVDYFFPEF	TVSNMGSALG	VSQVFFPAVL	QSSGLXSLYS	TVTPSSSLG	200
PTQYICNVNH	KFSNKTVDKK	VEPKSDKSTL	TCPCPEAEVA	AGAPSVFLF	250
PKFKDILNM	RLPTEVTCVF	VDSDHEVPE	FNHWYDAGEV	HNAKTKPRRE	300
QYNSTRYRVS	LVTLVRLQML	NGKEYCKVVS	NKALPAEESN	TSISKAKQPR	350
EQPVYTLTS	REEMTKNGVS	LTCLVKGVDP	ADVAWESN	QEPNNKYTK	400
PVPLDSDGSF	FLYSKLTVDK	SRWQGGNVFS	CSVMHEALHN	HYTQKSLSCS	450
PGK					453

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQLTQSPSS	LSASVGDVRT	ITCSASQDIS	NYLNWYQQKP	GKAPKVLIIYF	50
TSSLHSGVPS	RFGSGSGSTD	FTLTISSLQP	EDFATYYCQQ	YSTVPWTFGQ	100
GTKVEIKRTV	AAPSVFIFPP	SDEQLKSGTA	SVVCLLNPFY	PREAKVQWKV	150
DNALQSGNSQ	ESVTEQDSKD	STYLSSTLT	LSKADYEKKH	VYACEVTHQG	200
LSSPDKTSFN	RGEC				214

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Disulfide bridge location / Position des ponts disulfure / Ponts				
Intra-H (C23-C104)	22-96	150-206	267-327	373-431

22"-96" 150"-206" 267"-327" 373"-431"

Intra-L (C23-C104)	23'-88'	134'-194'
--------------------	---------	-----------

23^m-88^m 134^m-194

Inter-H-L (h 5-CL 126)	226-214'	226"-214"
------------------------	----------	-----------

Inter-H-H (h 11, h 14) 232-232" 235-235"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH₂ N84.4: 303, 303"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires


complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal

H CHS K2: 453, 453"


Conjugation sites / Sites de conjugación / Posiciones de conjugación:

H CH3 L123>C: 449, 449^m



p.1126 **tedromerum**
tedromer
tédromère
tedrómero

replace the structure by the following one
remplacer la structure par la suivante
sustitúyase la estructura por la siguiente



Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 127
Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 127
Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Lista 127
(WHO Drug Information, Vol. 36, No. 2, 2022)


p.422
-423

delete/supprimer/suprimáse
manusiranum
manusiran
manusiran
manusirán

insert/insérer/insertese
divesiranum
divesiran
divésiran
divesirán

p.486 **tilpisertibum fosmecarbilum**
tilpisertib fosmecarbil
tilpisertib fosmécarbil
tilpisertib fosmecarbil

replace the structure by the following one
remplacer la structure par la suivante
sustitúyase la estructura por la siguiente



p.486 **tobemstomigum #**
 -488 tobemstomig
 tobemstomig
 tobemstomig

replace the description by the following one
remplacer la description par la suivante
sustitúyase la descripción por la siguiente

immunoglobulin G1-kappa with crossed domains, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (programmed cell death 1, PD1, PD-1, CD279)] and anti-[*Homo sapiens* LAG3 (lymphocyte activating 3, lymphocyte-activation 3, CD223)], humanized monoclonal antibody, bispecific;
 gamma1 heavy chain with crossed V-kappa anti-PDCD1 (1-443) [V-KAPPA humanized (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (82.2%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [10.3.9] (27-36.54-56.93-101)) (1-111) -2-mer biseryl linker (112-113) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1, G1v14-49 CH2 A1.3, A1.2, G114, G1v32 CH3 W22 (knob) (CH1 K120 (210) (114-211), hinge 1-15 (212-226), CH2 L1.3>A (230), L1.2>A (231), P114>G (325) (227- 336), CH3 D12 (352), L14 (354), S10>C (350), T22>W (362) (337- 441), CHS (442-443)) (112-443)], (216-227')-disulfide with kappa light chain with crossed VH anti-PDCD1 (1'-227') [VH humanized (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (90.6%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (92.9%)), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1'-120') -*Homo sapiens* IGKC*01 (99.1%), R1.4>A (121), T1.3>S (122), Km3 A45.1 (166), V101 (204) (121'-227')]; gamma1 heavy chain anti-LAG3 (1"-451") [VH humanized (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1"-121") -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1, G1v14-49 CH2 A1.3, A1.2, G114, G1v33 CH3 S22, A24, V86 (hole) (CH1 K26>E (151), K119>E (217), K120 (218) (122"-219"), hinge 1-15 (220"-234"), CH2 L1.3>A (238), L1.2>A (239), P114>G (333) (235"-344"), CH3 D12 (360), L14 (362), Y5>C (353), T22>S (370), L24>A (372), Y86>V (411) (345"-449"), CHS (450"-451'")) (122"-451'')], (224"-214'")-disulfide with kappa light chain anti-LAG3 (1'''-214''') [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1D-39*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (100%)), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97) (1'''-107''') -*Homo sapiens* IGKC*01 (98.1%), E12>R (123), Q13>K (124) (108'''-214''')]; dimer (222-230'':225-233'':350-353'')-trisdissulfide, produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, derived from the cell line CHO-K1, glycoform alfa

immunoglobuline G1-kappa avec domaines croisés, anti-[*Homo sapiens* PDCD1 (protéine 1 de mort cellulaire programmée, PD-1, PD1, CD279)] and anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activateur 3 des lymphocytes, lymphocyte-activation 3, CD223)], anticorps monoclonal humanisé, bispécifique;
 chaîne lourde gamma1 à V-kappa croisé anti-PDCD1 (1-443) [V-KAPPA humanisé (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (82.2%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [10.3.9] (27-36.54-56.93-101)) (1-111) -2-mer biséryl linker (112-113) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1, G1v14-49 CH2 A1.3, A1.2, G114, CH2 G1v32 CH3 W22 (knob) (CH1 K120 (210) (114-211), charnière 1-15 (212-226), CH2 L1.3>A (230), L1.2>A (231), P114>G (325) (227- 336), CH3 D12 (352), L14 (354), S10>C (350), T22>W (362)) (337- 441), CHS (442-443)) (112-443)], (216-227')-disulfure avec la chaîne légère kappa à VH croisé anti-PDCD1 (1'-227') [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (90.6%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1'-120') -*Homo sapiens* IGKC*01 (99.1%), R1.4>A (121), T1.3>S (122), Km3 A45.1 (166), V101 (204) (121'-227')]; chaîne lourde gamma1 anti-LAG3 (1"-451'') [VH humanisé (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1"-121'') -*Homo sapiens*

IGHG1*01, G1m17,1, G1v14-49 CH2 A1.3, A1.2, G114, G1v33 CH3 S22, A24, V86 (hole) (CH1 K26>E (151), K119>E (217), K120 (218) (122"-219"), charnière 1-15 (220"-234"), CH2 L1.3>A (238), L1.2>A (239), P114>G (333) (235"-344"), CH3 D12 (360), L14 (362), Y5>C (353), T22>S (370), L24>A (372), Y86>V (411)] (345"-449"), CHS (450"-451")) (122"-451"))], (224"-214")-disulfure avec la chaîne légère kappa anti-LAG3 (1"-214") [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1D-39*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (100%)), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97) (1"-107") -*Homo sapiens* IGKC*01 (98.1%), E12>R (123), Q13>K (124) (108"-214"))]; dimère (222-230":225-233":350-353")-trisdifure, produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), dérivant de la lignée cellulaire CHO-K1, glycoforme alfa

inmunoglobulina G1-kappa con dominios cruzados, anti-[*Homo sapiens* PDCCD1 (proteína 1 de muerte celular programada, PD-1, PD1, CD279)] y anti-[*Homo sapiens* LAG3 (activador 3 de los linfocitos, linfocito-activación 3, CD223)], anticuerpo monoclonal humanizado, biespecífico; cadena pesada gamma1 con V-kappa cruzada anti-PDCCD1 (1-443) [V-KAPPA humanizado (*Homo sapiens* IGKV4-1*01 (82.2%) -IGKJ1*01 (100%), CDR-IMGT [10.3.9] (27-36.54-56.93-101)) (1-111) -2-mer biserial linker (112-113) -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1, G1v14-49 CH2 A1.3, A1.2, G114, CH2 G1v32 CH3 W22 (knob) (CH1 K120 (210) (114-211), bisagra 1-15 (212-226), CH2 L1.3>A (230), L1.2>A (231), P114>G (325) (227- 336), CH3 D12 (352), L14 (354), S10>C (350), T22>W (362)] (337- 441), CHS (442-443)) (112-443)], (216-227")-disulfuro con la cadena ligera kappa con VH cruzado anti-PDCCD1 (1'-227') [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (90.6%) -(IGHD) -IGHJ5*01 (92.9%), CDR-IMGT [8.8.13] (26-33.51-58.97-109)) (1'-120') -*Homo sapiens* IGKC*01 (99.1%), R1.4>A (121), T1.3>S (122), Km3 A45.1 (166), V101 (204) (121'-227')]; cadena pesada gamma1 anti-LAG3 (1"-451") [VH humanizado (*Homo sapiens* IGHV3-23*01 (86.7%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (100%), CDR-IMGT [8.8.14] (26-33.51-58.97-110)) (1"-121") -*Homo sapiens* IGHG1*01, G1m17,1, G1v14-49 CH2 A1.3, A1.2, G114, G1v33 CH3 S22, A24, V86 (hole) (CH1 K26>E (151), K119>E (217), K120 (218) (122"-219"), bisagra 1-15 (220"-234"), CH2 L1.3>A (238), L1.2>A (239), P114>G (333) (235"-344"), CH3 D12 (360), L14 (362), Y5>C (353), T22>S (370), L24>A (372), Y86>V (411)] (345"-449"), CHS (450"-451")) (122"-451"))], (224"-214")-disulfuro con la cadena ligera kappa anti-LAG3 (1"-214") [*Homo sapiens* V-KAPPA (IGKV1D-39*01 (96.8%) -IGKJ4*01 (100%)), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97) (1"-107") -*Homo sapiens* IGKC*01 (98.1%), E12>R (123), Q13>K (124) (108"-214"))]; dímero (222-230":225-233":350-353")-trisdifure, producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular derivada de CHO-K1, forma glicosilada alfa

p.538 **zifibancimigum #**
-539 zifibancimig
 zifibancimig
 zifibancimig

replace the description by the following one
remplacer la description par la suivante
sustitúyase la descripción por la siguiente

immunoglobulin Fab G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* ANGPT2 (angiopoietin 2, Ang2)] and anti-[*Homo sapiens* VEGFA (vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, VEGF)], monoclonal antibody, bispecific, biparatope monovalent; VH-(CH1-hinge) gamma1 heavy chain (1-223) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-31*07

(74.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (86.7%), CDR-IMGT [7.8.9] (26-32.50-57.96-104)) (1-115) -CH1-hinge (*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17 (CH1 K120 (212) (116-213), hinge 1-10 (214-223)) (116-223)), (218-214')-disulfide with kappa light chain (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-5*01 (72.2%) -IGKJ4*01 (90.9%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-214')]; bispecific, biparatope monovalent: anti-ANG2 paratope (VH CDR1 and CDR3, V-KAPPA CDR2) and anti-VEGFA paratope (V-KAPPA CDR1 and CDR3, VH CDR2), produced in Chinese hamster ovary (CHO) cells, cell line CHO-K1, non-glycosylated

immunoglobuline Fab G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (facteur A de croissance de l'endothélium vasculaire humain) et *Homo sapiens* ANGPT2 (angiopoïétine 2, Ang2)], anticorps monoclonal, bispécifique, biparatope monovalent;
VH-(CH1-charnière) chaîne lourde gamma1 (1-223) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-31*07 (74.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (86.7%), CDR-IMGT [7.8.9] (26-32.50-57.96-104)) (1-115) -CH1-charnière (*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17 (CH1 K120 (212) (116-213), charnière 1-10 (214-223)) (116-223)), (218-214')-disulfure avec la chaîne légère kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-5*01 (72.2%) -IGKJ4*01 (90.9%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-213')]; bispécifique, biparatope monovalent: anti-ANG2 paratope (VH CDR1 et CDR3, V-KAPPA CDR2) et anti-VEGFA paratope (V-KAPPA CDR1 et CDR3, VH CDR2), produit dans des cellules ovariennes de hamster chinois (CHO), lignée cellulaire CHO-K1, non-glycosylé

immunoglobulina Fab G1-kappa, anti-[*Homo sapiens* VEGFA (factor A de crecimiento del endotelio vascular humano) y *Homo sapiens* ANGPT2 (angiopoetina 2, Ang2)], anticuerpo monoclonal, biespecifico, biparatopo monovalente;
VH-(CH1-bisagra) cadena pesada gamma1 (1-223) [VH (*Homo sapiens* IGHV3-31*07 (74.0%) -(IGHD) -IGHJ4*01 (86.7%), CDR-IMGT [7.8.9] (26-32.50-57.96-104)) (1-115) -CH1-bisagra (*Homo sapiens* IGHG1*01 (100%), G1m17 (CH1 K120 (212) (116-213), bisagra 1-10 (214-223)) (116-223)), (218-214')-disulfuro com la cadena ligera kappa (1'-214') [V-KAPPA (*Homo sapiens* IGKV1-5*01 (72.2%) -IGKJ4*01 (90.9%), CDR-IMGT [6.3.9] (27-32.50-52.89-97)) (1'-107') -*Homo sapiens* IGKC*01 (100%), Km3 A45.1 (153), V101 (191) (108'-213')]; biespecifico, biparatopo monovalente: anti-ANG2 paratopo (VH CDR1 et CDR3, V-KAPPA CDR2) y anti-VEGFA paratopo (V-KAPPA CDR1 et CDR3, VH CDR2), producido en las células ováricas de hámster chino (CHO), línea celular CHO-K1, no glicosilado

Proposed International Nonproprietary Names (Prop. INN): List 128

Dénominations communes internationales proposées (DCI Prop.): Liste 128

Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (DCI Prop.): Lista 128

(WHO Drug Information, Vol. 36, No. 4, 2022)

p.982 flurimedrimerum (¹⁸F)

-983 flurimedrimer (¹⁸F)

flurimédrimère (¹⁸F)

flurimedrímero (¹⁸F)


replace the chemical name and structure by the following ones
remplacer le nom chimique et la structure par les suivants
sustitúyase el nombre químico y la estructura por los siguientes

2-({1-[3-(¹⁸F)fluoropropyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methoxy)ethyl ether with about 16 % of hydroxyl end groups of α,α',α''-(ethane-1,2-diyl)dinitrilo)tetrakis(ω-hexadecakis{3-[(2-hydroxyethyl)amino]-3-oxopropyl}-dendro^{G4}-[(3-oxopropane-1,3-

diyl)azanediylethylenenitrilo]), **a** regular 4-dendron poly(amidoamine)-type dendrimer

éther 2-({1-[3-(¹⁸F)fluoropropyl]-1*H*-1,2,3-triazol-4-yl)méthoxy}éthyl)éthylique avec approximativement 16 % de groupes terminaux hydroxyles **d'**α,α',α'',α'''-(éthane-1,2-diyl)dinitrilo)tétrakis(ω-hexadécakis{3-[(2-hydroxyéthyl)amino]-3-oxopropyl}-*dendro*^{G⁴}[(3-oxopropane-1,3-diyl)azanediylethylenenitrilo]), **un** dendrimère régulier de type 4-dendron poly(amidoamine)

éter 2-({1-[3-(¹⁸F)fluoropropyl]-1*H*-1,2,3-triazol-4-il}metoxi)etflico con aproximadamente 16% de los grupos terminados hidroxilos de α,α',α'',α'''-(etano-1,2-diildinitrilo)tetrakis(ω-hexadecakis{3-[(2-hidroxietil)amino]-3-oxopropil}-*dendro*^{G⁴}[(3-oxopropano-1,3-diil)azanodiiletenonitrilo]), **uno** dendrímero regular de tipo 4-dendron poly(amidoamina)



p.985

supprimer
ganféborole

insérer
ganféborole

p.1008

migoprotafibum


migoprotafib
migoprotafib
migoprotafib

replace the chemical name and structure by the following ones
remplacer le nom chimique et la structure par les suivants
sustitúyase el nombre químico y la estructura por los siguientes

(3*R*)-1'-[3-(3,4-dihydro-1,5-naphthyridin-1(2*H*)-yl)-1*H*-pyrazolo[3,4-*b*]pyrazin-6-yl]-**3*H***-spiro[[1]benzofuran-2,4'-piperidin]-3-amine

(3*R*)-1'-[3-(3,4-dihydro-1,5-naphtyridin-1(2*H*)-yl)-1*H*-pyrazolo[3,4-*b*]pyrazin-6-yl]-**3*H***-spiro[[1]benzofuran-2,4'-pipéridin]-3-amine

(3*R*)-1'-[3-(3,4-dihydro-1,5-naftiridin-1(2*H*)-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*b*]pirazin-6-il]-**3*H***-spiro[[1]benzofuran-2,4'-piperidin]-3-amina



p.1009 **monzosertibum**

monzosertib

monzosertib

monzosertib

replace the chemical name by the following one
remplacer le nom chimique par le suivant
sustitúyase el nombre químico por el siguiente

ethyl 5-[(Ξ)-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-3-yl)methylidene]-4-oxo-2-[[4-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazin-1-yl]amino]-4,5-dihydrofuran-3-carboxylate

5-[(Ξ)-(1*H*-pyrrolo[2,3-*b*]pyridin-3-yl)méthylidène]-4-oxo-2-[[4-(2,2,2-trifluoroéthyl)pipérazin-1-yl]amino]-4,5-dihydrofurane-3-carboxylate d'éthyle

5-[(Ξ)-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-3-il)metilideno]-4-oxo-2-[[4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-il]amino]-4,5-dihidrofurano-3-carboxilato de etilo

p.1044 **puxitatugum samrotecanum #**

puxitatug samrotecan

puxitatug samrotécán

puxitatug samrotecán

replace the structure by the following one
remplacer la structure par la suivante
sustitúyase la estructura por la siguiente

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

```
QVQLQQWGAQ LLKPSETLSL ACTVYGGSF S GYYWNWIRQP PGKLEWIGE 50
INHGSGSTEYN PSLKSRVTIS VDTSMNQFSL KLSVTAADT AVYYCARVLY 100
NNNVDWGQCG TLVTSSAST KGPSVFPLAP SSKSTSGGTA ALGCLVKDYF 150
PEPVTWWSNS GALTSGVHTF PAVLQSSGLY SLSSVTVTPS SSLGTQTYIC 200
NVNHHKPSMTR VDRKVEPRSC DKHTCTPCPC APELLGGPSV FLFFPRPKDT 250
LMLSRPEPTV CVVDVDSIED PEKFNWYVD GVEFHNMTK FREQQNGSY 300
RVVSVLTITVL QDWLNKEVYK CKVSNKALPA PIEKTISKAK GQPREPQVYT 350
LPPSREEMTK NQVSLTCLVK GFYPSDIAVE WESNGQPENN YKTPPVLDLS 400
DGSFFLYSKL TVDKSRWQCG NVFSCSVME ALHNHYTQKS LSLSPGK 447
```

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

```
DIQMTQSPSS LSASVGRVT ITCRASQDIR NDVGWYQKRP GKAPKRLIYA 50
ASRLQSGVPS RFGSGSGSTE FTLTISSLQP EDFATYYCLQ HNSYPRTFGQ 100
GTVEIKKTV AAPSVFIFPP SDEQLSGTA SVVCLLNIFY PREAKVQWKV 150
DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYLSSTLT LSKADYEHKH VYACEVTHQG 200
LSPSVTKSFN RGEK 214
```

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104) 22-95 144-200 261-321 367-425
 Intra-L (C23-C104) 22-95* 144-200* 261-321* 367-425*

Intra-L (C23-C104) 23*-88" 134"-194
 23*-88" 134"-194"

Inter-H-L (h 5-CL 126)* 220-214* 220*-214"

Inter-H-H (h 11, h 14)* 226-226* 229-229"

*The inter-chain disulfide bridges are not present, the 8 cysteinyl being conjugated each via a thioether bond to a drug linker.

*Les ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas présents, les 8 cystéinyl étant chacun conjugué via une liaison thioéther à un linker-principe actif.

*Los puentes disulfuro entre cadenas no están presentes, cada uno de los 8 cisteinil está conjugada a través de un enlace tioéter a un linker-principio activo.

N-terminal glutaminy cyclization / Cyclisation du glutaminyle N-terminal / Ciclación del glutaminilo N-terminal

Q > pyroglutamyl (pE, 5-oxopropyl) / pyroglutamyle (pE, 5-oxopropyle) / piroglutamilo (pE, 5-oxoprolilo)
 H VH Q1: 1, 1"

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H VH N57: 52, 52"

Deamidation, no glycosylation / déamidation, pas de glycosylation / desamidación, sin glicosilación

H CH2 N84.4: 297, 297"


Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal

H CHS K2: 447, 447"

Modified residues / Résidus modifiés / Restos modificados

C (214*,214",220,220',226,226',229,229')



p.1045

supprimer
rademikibart

insérer
radémikibart

p.1072

suvemcitugum
suvemcitug
suvemcitug
suvemcitug

replace the structure by the following one
remplacer la structure par la suivante
sustitúyase la estructura por la siguiente

Heavy chain / Chaîne lourde / Cadena pesada

EVQLVESGGG	LVKPGGSLRL	SCAASGFSFS	NNDVMCWVRQ	APGKGLEWIG	50
CIMTTDVVTE	YANWAKSRFT	VSRDSAKNSV	YLMNSLRAE	DTAVYFCARD	100
SVGSPPLMSFD	LWGPGLTVTV	SSASTKGPSV	FPLAPSSKST	SGGTAALGCL	150
VKDYFPEPVT	VSWNSGALTS	GVHTFPAVLQ	SSGLYSLSLV	VTVPSSSLGT	200
QTYICNVNHK	PSNTKVDKKV	EPKSCDKTHT	CPPCPAPELL	GGPSVFLFPP	250
KPKDTLMISR	TPEVTCVVVD	VSHEDPEVKF	NWYVDGVEVH	NAKTKPREEQ	300
YNSTYRVVSV	LTVLHQDWLN	GKEYCKVSN	KALPAPIEKT	ISKAKGQPRE	350
PQVYTLPPSR	DELTKNQVSL	TCLVKGFYPS	DIAVEWESNG	QPENNYKTTT	400
PVLDSGGSFF	LYSKLTVDKS	RWQQGNVFSC	SVMHEALHNN	YTQKSLSLSP	450
GK					452

Light chain / Chaîne légère / Cadena ligera

DIQMTQSPSS	LSASVGDRVT	INCQASQSIY	NNELSWYQQ	KPGKPPKLLI	50
YRASTLASGV	PSRFSGSGSG	TDFTLTISSL	QPEDVATYYC	GGYKSYSDNG	100
NGFGGGTKVE	IKRTVAAPSV	FIFPPSDEQL	KSGTASVCL	LNNFYPREAK	150
VQWKVDNALQ	SGNSQESVTE	QDSKDYSTSL	SSTLTLSKAD	YEKHKVYACE	200
VTHQGLSSPV	TKSFNRGEC				219

Post-translational modifications

Disulfide bridges location / Position des ponts disulfure / Posiciones de los puentes disulfuro

Intra-H (C23-C104)	22-97	149-205	266-326	372-430
	22"-97"	149"-205"	266"-326"	372"-430"
Additional intra-H C40-C55	36-51			
	36"-51"			
Intra-L (C23-C104)	23'-90'	139"-199"		
	23"-90"	139"-199"		
Inter-H-L (h 5-CL 126)	225-219'	225"-219"		
Inter-H-H (h 11, h 14)	231-231'	234-234"		

N-glycosylation sites / Sites de N-glycosylation / Posiciones de N-glicosilación

H CH2 N84.4: 302, 302"

Fucosylated complex bi-antennary CHO-type glycans / glycanes de type CHO bi-antennaires complexes fucosylés / glicanos de tipo CHO biantenarios complejos fucosilados

C-terminal lysine clipping / Coupure de la lysine C-terminale / Recorte de lisina C-terminal

H CHS K2: 452, 452"

p.1102

vididencelum
vididencel
vididencel
vididencel

replace the description by the following one
remplacer la description par la suivante
sustitúyase la descripción por la siguiente

cell-cycle arrested dendritic cells (DCs) derived from the cell line DCOne, which originated from MUTZ-3 cells that arose from mononuclear blasts isolated from a patient with acute myelomonocytic leukaemia. The cells are initially grown in media containing granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), followed by differentiation in the presence of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), tumour necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin 4 (IL-4) and *mitoxantrone*. Finally, the cells are matured in the presence of media containing prostaglandin-E2 (PGE2), TNF-α, and IL-1β. After cryopreservation the cells are irradiated to induce cell-cycle arrest. The final cell suspension contains >70% viable cells, of which >70% HLA-DR/DP/DQ-positive, >70% HLA-ABC-positive, >30% CD1a (DC differentiation marker)-positive, >30% CD83 (DC maturation marker)-positive, and which express co-

stimulatory molecules highly expressed by mature DCs, i.e., CD40 (>60%), CD80 (>50%) and CD86 (>70%). The preparation also stimulates T lymphocytes in a mixed lymphocyte reaction (MLR).

cellules dendritiques (CD) au cycle cellulaire arrêté, dérivées de la lignée cellulaire DCOne, qui provient de cellules MUTZ-3 issues de blastes mononucléaires isolés d'un patient atteint de leucémie myélomonocytaire aiguë. Les cellules sont initialement cultivées dans un milieu contenant le facteur de stimulation des colonies de granulocytes-macrophages (GM-CSF), puis elles sont différenciées en présence du facteur de stimulation des colonies de granulocytes-macrophages (GM-CSF), du facteur de nécrose tumorale alpha (TNF- α), de l'interleukine 4 (IL-4) et de la *mitoxantrone*. Enfin, les cellules sont maturées en présence d'un milieu contenant de la prostaglandine-E2 (PGE2), du TNF- α et de l'IL-1 β . Après la cryoconservation, les cellules sont irradiées pour induire un arrêt du cycle cellulaire. La suspension cellulaire finale contient >70% de cellules viables, dont >70% sont positives au HLA-DR/DP/DQ, > 70% positives au HLA-ABC, >30% positives au CD1a (marqueur de différenciation des CD), >30% positives au CD83 (marqueur de maturation des CD), et qui expriment des molécules de co-stimulation hautement exprimées par ces CD matures, par ex. CD40 (>60%), CD80 (>50%) et CD86 (>70%). La préparation stimule également les lymphocytes T dans une réaction lymphocytaire mixte (MLR).

células dendríticas (DCs) con el ciclo celular detenido derivadas de la línea celular DCOne, que se originaron a partir de células MUTZ-3 que a su vez surgieron de blastos mononucleares aislados de un paciente con leucemia mielomonocítica aguda. Las células se crecen inicialmente en medio que contiene factor estimulador de colonias de monocitos-macrófagos (GM-CSF), seguido de diferenciación en presencia de factor estimulador de colonias de monocitos-macrófagos (GM-CSF), factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), interleuquina 4 (IL-4) y *mitoxantrona*. Finalmente, las células se maduran en presencia de medio que contiene prostaglandina E2 (PGE2), TNF- α e IL-1 β . Después de la criopreservación, las células se someten a radiación para inducir la detención del ciclo celular. La suspensión celular final contiene >70% de células viables, donde >70% son positivas a HLA-DR/DP/DQ, > 70% positivas a HLA-ABC, >30% positivas a CD1a (marcador de diferenciación de DC), >30% positivas a CD83 (marcador de maduración de DC), y qui expresan moléculas de co-stimulación altamente expresadas por estas Dc maduras, por ej. CD40 (>60%), CD80 (>50%) y CD86 (>70%). La preparación también estimula a los linfocitos T en una reacción mixta de linfocitos (MLR)

p.1110 **zenidololum**

zenidolol
zénidolol
zenidolol


replace the CAS registry number by the following one
remplacer le numéro de registre du CAS par le suivant
sustitúyase el número de registro del CAS por el siguiente

72795-26-7

p.1117 **samrotecanum #**

samrotecan
samrotécán
samrotecán

replace the structure by the following one
remplacer la structure par la suivante
sustitúyase la estructura por la siguiente



ANNEX 1

PROCEDURE FOR THE SELECTION OF RECOMMENDED INTERNATIONAL NONPROPRIETARY NAMES FOR PHARMACEUTICAL SUBSTANCES¹

The following procedure shall be followed by the World Health Organization (hereinafter also referred to as "WHO") in the selection of recommended international nonproprietary names for pharmaceutical substances, in accordance with resolution WHA3.11 of the World Health Assembly, and in the substitution of such names.

Article 1 - Proposals for recommended international nonproprietary names and proposals for substitution of such names shall be submitted to WHO on the form provided therefore. The consideration of such proposals shall be subject to the payment of an administrative fee designed only to cover the corresponding costs of the Secretariat of WHO ("the Secretariat"). The amount of this fee shall be determined by the Secretariat and may, from time to time, be adjusted.

Article 2 - Such proposals shall be submitted by the Secretariat to the members of the Expert Advisory Panel on the International Pharmacopoeia and Pharmaceutical Preparations designated for this purpose, such designated members hereinafter referred to as "the INN Expert Group", for consideration in accordance with the "General principles for guidance in devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances", annexed to this procedure². The name used by the person discovering or first developing and marketing a pharmaceutical substance shall be accepted, unless there are compelling reasons to the contrary.

Article 3 - Subsequent to the examination provided for in article 2, the Secretariat shall give notice that a proposed international nonproprietary name is being considered.

a) Such notice shall be given by publication in *WHO Drug Information*³ and by letter to Member States and to national and regional pharmacopoeia commissions or other bodies designated by Member States.

i) Notice shall also be sent to the person who submitted the proposal ("the original applicant") and other persons known to be concerned with a name under consideration.

b) Such notice shall:

i) set forth the name under consideration;

ii) identify the person who submitted the proposal for naming the substance, if so requested by such person;

iii) identify the substance for which a name is being considered;

iv) set forth the time within which comments and objections will be received and the person and place to whom they should be directed;

v) state the authority under which WHO is acting and refer to these rules of procedure.

c) In forwarding the notice, the Secretariat shall request that Member States take such steps as are necessary to prevent the acquisition of proprietary rights in the proposed name during the period it is under consideration by WHO.

Article 4 - Comments on the proposed name may be forwarded by any person to WHO within four months of the date of publication, under article 3, of the name in *WHO Drug Information*.

¹ See Annex 1 in WHO Technical Report Series, No. 581, 1975. The original text was adopted by the Executive Board in resolution EB15.R7 and amended in resolutions EB43.R9 and EB115.R4.

² See Annex 2.

³ Before 1987, lists of international nonproprietary names were published in the *Chronicle of the World Health Organization*.

Article 5 - A formal objection to a proposed name may be filed by any interested person within four months of the date of publication, under article 3, of the name in *WHO Drug Information*.

Such objection shall:

- i) identify the person objecting;
- ii) state his or her interest in the name;
- iii) set forth the reasons for his or her objection to the name proposed.

Article 6 - Where there is a formal objection under article 5, WHO may either reconsider the proposed name or use its good offices to attempt to obtain withdrawal of the objection. Without prejudice to the consideration by WHO of a substitute name or names, a name shall not be selected by WHO as a recommended international nonproprietary name while there exists a formal objection thereto filed under article 5 which has not been withdrawn.

Article 7 - Where no objection has been filed under article 5, or all objections previously filed have been withdrawn, the Secretariat shall give notice in accordance with subsection (a) of article 3 that the name has been selected by WHO as a recommended international nonproprietary name.

Article 8 - In forwarding a recommended international nonproprietary name to Member States under article 7, the Secretariat shall:

- a) request that it be recognized as the nonproprietary name for the substance; and
- b) request that Member States take such steps as are necessary to prevent the acquisition of proprietary rights in the name and to prohibit registration of the name as a trademark or trade name.

Article 9

a) In the extraordinary circumstance that a previously recommended international nonproprietary name gives rise to errors in medication, prescription or distribution, or a demonstrable risk thereof, because of similarity with another name in pharmaceutical and/or prescription practices, and it appears that such errors or potential errors cannot readily be resolved through other interventions than a possible substitution of a previously recommended international nonproprietary name, or in the event that a previously recommended international nonproprietary name differs substantially from the nonproprietary name approved in a significant number of Member States, or in other such extraordinary circumstances that justify a substitution of a recommended international nonproprietary name, proposals to that effect may be filed by any interested person. Such proposals shall be submitted on the form provided therefore and shall:

- i) identify the person making the proposal;
- ii) state his or her interest in the proposed substitution; and
- iii) set forth the reasons for the proposal; and
- iv) describe, and provide documentary evidence regarding the other interventions undertaken in an effort to resolve the situation, and the reasons why these other interventions were inadequate.

Such proposals may include a proposal for a new substitute international nonproprietary name, devised in accordance with the General principles, which takes into account the pharmaceutical substance for which the new substitute international nonproprietary name is being proposed.

The Secretariat shall forward a copy of the proposal, for consideration in accordance with the procedure described in subsection (b) below, to the INN Expert Group and the original applicant or its successor (if different from the person bringing the proposal for substitution and provided that the original applicant or its successor is known or can be found through diligent effort, including contacts with industry associations).

In addition, the Secretariat shall request comments on the proposal from:

i) Member States and national and regional pharmacopoeia commissions or other bodies designated by Member States (by including a notice to that effect in the letter referred to in article 3(a), and

ii) any other persons known to be concerned by the proposed substitution.

The request for comments shall:

i) state the recommended international nonproprietary name that is being proposed for substitution (and the proposed substitute name, if provided);

ii) identify the person who submitted the proposal for substitution (if so requested by such person);

iii) identify the substance to which the proposed substitution relates and reasons put forward for substitution;

iv) set forth the time within which comments will be received and the person and place to whom they should be directed; and

v) state the authority under which WHO is acting and refer to these rules of procedure.

Comments on the proposed substitution may be forwarded by any person to WHO within four months of the date of the request for comments.

b) After the time period for comments referred to above has elapsed, the Secretariat shall forward any comments received to the INN Expert Group, the original applicant or its successor and the person bringing the proposal for substitution. If, after consideration of the proposal for substitution and the comments received, the INN Expert Group, the person bringing the proposal for substitution and the original applicant or its successor all agree that there is a need to substitute the previously recommended international nonproprietary name, the Secretariat shall submit the proposal for substitution to the INN Expert Group for further processing. Notwithstanding the foregoing, the original applicant or its successor shall not be entitled to withhold agreement to a proposal for substitution in the event the original applicant or its successor has no demonstrable continuing interest in the recommended international nonproprietary name proposed for substitution.

In the event that a proposal for substitution shall be submitted to the INN Expert Group for further processing, the INN Expert Group will select a new international nonproprietary name in accordance with the General principles referred to in article 2 and the procedure set forth in articles 3 to 8 inclusive. The notices to be given by the Secretariat under article 3 and article 7, respectively, including to the original applicant or its successor (if not the same as the person proposing the substitution, and provided that the original applicant or its successor is known or can be found through diligent effort, including contacts with industry associations), shall in such event indicate that the new name is a substitute for a previously recommended international nonproprietary name and that Member States may wish to make transitional arrangements in order to accommodate existing products that use the previously recommended international nonproprietary name on their label in accordance with national legislation.

If, after consideration of the proposal for substitution and the comments received in accordance with the procedure described above, the INN Expert Group, the original applicant or its successor and the person bringing the proposal for substitution do not agree that there are compelling reasons for substitution of a previously recommended international nonproprietary name, this name shall be retained (provided always that the original applicant or its successor shall not be entitled to withhold agreement to a proposal for substitution in the event that the original applicant or its successor has no demonstrable continuing interest in the recommended international nonproprietary name proposed to be substituted). In such an event, the Secretariat shall advise the person having proposed the substitution, as well as the original applicant or its

successor (if not the same as the person proposing the substitution, and provided that the original applicant or its successor is known or can be found through diligent effort, including contacts with industry associations), Member States, national and regional pharmacopoeia commissions, other bodies designated by Member States, and any other persons known to be concerned by the proposed substitution that, despite a proposal for substitution, it has been decided to retain the previously recommended international nonproprietary name (with a description of the reason(s) why the proposal for substitution was not considered sufficiently compelling).

ANNEX 2

GENERAL PRINCIPLES FOR GUIDANCE IN DEVISING INTERNATIONAL NONPROPRIETARY NAMES FOR PHARMACEUTICAL SUBSTANCES¹

1. International Nonproprietary Names (INN) should be distinctive in sound and spelling. They should not be inconveniently long and should not be liable to confusion with names in common use.

2. The INN for a substance belonging to a group of pharmacologically related substances should, where appropriate, show this relationship. Names that are likely to convey to a patient an anatomical, physiological, pathological or therapeutic suggestion should be avoided.

These primary principles are to be implemented by using the following secondary principles:

3. In devising the INN of the first substance in a new pharmacological group, consideration should be given to the possibility of devising suitable INN for related substances, belonging to the new group.

4. In devising INN for acids, one-word names are preferred; their salts should be named without modifying the acid name, e.g. "oxacillin" and "oxacillin sodium", "ibufenac" and "ibufenac sodium".

5. INN for substances which are used as salts should in general apply to the active base or the active acid. Names for different salts or esters of the same active substance should differ only in respect of the name of the inactive acid or the inactive base.

For quaternary ammonium substances, the cation and anion should be named appropriately as separate components of a quaternary substance and not in the amine-salt style.

6. The use of an isolated letter or number should be avoided; hyphenated construction is also undesirable.

7. To facilitate the translation and pronunciation of INN, "f" should be used instead of "ph", "t" instead of "th", "e" instead of "ae" or "oe", and "i" instead of "y"; the use of the letters "h" and "k" should be avoided.

8. Provided that the names suggested are in accordance with these principles, names proposed by the person discovering or first developing and marketing a pharmaceutical preparation, or names already officially in use in any country, should receive preferential consideration.

9. Group relationship in INN (see General principle 2) should if possible be shown by using a common stem. The following list contains examples of stems for groups of substances, particularly for new groups. There are many other stems in active use.² Where a stem is shown without any hyphens it may be used anywhere in the name.

¹ In its Twentieth report (WHO Technical Report Series, No. 581, 1975), the WHO Expert committee on Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances reviewed the general principles for devising, and the procedures for selecting, INN in the light of developments in pharmaceutical compounds in recent years. The most significant change has been the extension to the naming of synthetic chemical substances of the practice previously used for substances originating in or derived from natural products. This practice involves the use of a characteristic "stem" indicative of a common property of the members of a group. The reason for, and the implications of, the change are fully discussed.

The guiding principles were updated during the 13th consultation on nonproprietary names for pharmaceutical substances (Geneva, 27-29 April 1983) (PHARM S/NOM 928 13 May 1983, revised 18 August 1983).

² A more extensive listing of stems is contained in the working document WHO/EMP/RHT/TSN/2018.1 which is regularly updated and can be requested from the INN Programme, WHO, Geneva.

Latin	English	
-acum	-ac	anti-inflammatory agents, ibufenac derivatives
-adolum	-adol }	analgesics
-adol-	-adol-}	
-astum	-ast	antiasthmatic, antiallergic substances not acting primarily as antihistaminics
-astinum	-astine	antihistaminics
-azepamum	-azepam	diazepam derivatives
bol	bol	steroids, anabolic
-cain-	-cain-	class I antiarrhythmics, procainamide and lidocaine derivatives
-cainum	-caine	local anaesthetics
cef-	cef-	antibiotics, cephalosporanic acid derivatives
-cillinum	-cillin	antibiotics, 6-aminopenicillanic acid derivatives
-conazolom	-conazole	systemic antifungal agents, miconazole derivatives
cort	cort	corticosteroids, except prednisolone derivatives
-coxibum	-coxib	selective cyclo-oxygenase inhibitors
-entanum	-entan	endothelin receptor antagonists
gab	gab	gabamimetic agents
gado-	gado-	diagnostic agents, gadolinium derivatives
-gatrnum	-gattran	thrombin inhibitors, antithrombotic agents
gest	gest	steroids, progestogens
gli	gli	antihyperglycaemics
io-	io-	iodine-containing contrast media
-metacinum	-metacin	anti-inflammatory, indometacin derivatives
-mycinum	-mycin	antibiotics, produced by <i>Streptomyces</i> strains
-nidazolom	-nidazole	antiprotozoal substances, metronidazole derivatives
-ololum	-olol	β-adrenoreceptor antagonists
-oxacinum	-oxacin	antibacterial agents, nalidixic acid derivatives
-platinum	-platin	antineoplastic agents, platinum derivatives
-poetinum	-poetin	erythropoietin type blood factors
-pril(at)um	-pril(at)	angiotensin-converting enzyme inhibitors
-profenum	-profen	anti-inflammatory substances, ibuprofen derivatives
prost	prost	prostaglandins
-relinum	-relin	pituitary hormone release-stimulating peptides
-sartanum	-sartan	angiotensin II receptor antagonists, antihypertensive (non-peptidic)
-vaptanum	-vaptan	vasopressin receptor antagonists
vin-	vin- }	vinca-type alkaloids
-vin-	-vin-}	

ANNEXE 1

PROCEDURE A SUIVRE EN VUE DU CHOIX DE DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES RECOMMANDEES POUR LES SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES¹

L'Organisation mondiale de la Santé (également désignée ci-après sous l'appellation « OMS ») observe la procédure exposée ci-dessous pour l'attribution de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques, conformément à la résolution WHA3.11 de l'Assemblée mondiale de la Santé, et pour le remplacement de telles dénominations.

Article 1 - Les propositions de dénominations communes internationales recommandées et les propositions de remplacement de telles dénominations sont soumises à l'OMS sur la formule prévue à cet effet. L'examen de telles propositions est soumis au paiement d'une taxe administrative destinée uniquement à couvrir les coûts correspondants assumés par le Secrétariat de l'OMS (« le Secrétariat »). Le montant de cette taxe est déterminé par le Secrétariat et peut être modifié de temps à autre.

¹ Voir annexe 1 dans OMS, Série de Rapports techniques, N° 581, 1975. Le texte original a été adopté par le Conseil exécutif dans sa résolution EB15.R7 et amendé dans ses résolutions EB43.R9 et EB115.R4.

Article 2 - Ces propositions sont soumises par le Secrétariat aux experts désignés à cette fin parmi les personnalités inscrites au Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques, ci-après désignés sous l'appellation « le Groupe d'experts des DCI » ; elles sont examinées par les experts conformément aux « Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques » reproduites ci-après¹. La dénomination acceptée est la dénomination employée par la personne qui découvre ou qui, la première, fabrique et lance sur le marché une substance pharmaceutique, à moins que des raisons majeures n'obligent à s'écarter de cette règle.

Article 3 - Après l'examen prévu à l'article 2, le Secrétariat notifie qu'un projet de dénomination commune internationale est à l'étude.

a) Cette notification est faite par une insertion dans *WHO Drug Information*² et par l'envoi d'une lettre aux Etats Membres et aux commissions nationales et régionales de pharmacopée ou autres organismes désignés par les Etats Membres.

i) Notification est également faite à la personne qui a soumis la proposition (« le demandeur initial ») et à d'autres personnes portant à la dénomination mise à l'étude un intérêt notoire.

b) Cette notification contient les indications suivantes :

i) dénomination mise à l'étude;

ii) nom de l'auteur de la proposition tendant à attribuer une dénomination à la substance, si cette personne le demande ;

iii) définition de la substance dont la dénomination est mise à l'étude ;

iv) délai pendant lequel seront reçues les observations et les objections à l'égard de cette dénomination ; nom et adresse de la personne habilitée à recevoir ces observations et objections ;

v) mention des pouvoirs en vertu desquels agit l'OMS et référence au présent règlement.

c) En envoyant cette notification, le Secrétariat demande aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'acquisition de droits de propriété sur la dénomination proposée pendant la période au cours de laquelle cette dénomination est mise à l'étude par l'OMS.

Article 4 - Des observations sur la dénomination proposée peuvent être adressées à l'OMS par toute personne, dans les quatre mois qui suivent la date de publication de la dénomination dans *WHO Drug Information* (voir l'article 3).

Article 5 - Toute personne intéressée peut formuler une objection formelle contre la dénomination proposée dans les quatre mois qui suivent la date de publication de la dénomination dans *WHO Drug Information* (voir l'article 3).

Cette objection doit s'accompagner des indications suivantes :

i) nom de l'auteur de l'objection ;

ii) intérêt qu'il ou elle porte à la dénomination en cause ;

iii) raisons motivant l'objection contre la dénomination proposée.

Article 6 - Lorsqu'une objection formelle est formulée en vertu de l'article 5, l'OMS peut soit soumettre la dénomination proposée à un nouvel examen, soit intervenir pour tenter d'obtenir le retrait de l'objection. Sans préjudice de l'examen par l'OMS d'une ou de plusieurs appellations de

¹ Voir annexe 2.

² Avant 1987, les listes de dénominations communes internationales étaient publiées dans la *Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé*.

remplacement, l'OMS n'adopte pas d'appellation comme dénomination commune internationale recommandée tant qu'une objection formelle présentée conformément à l'article 5 n'est pas levée.

Article 7 - Lorsqu'il n'est formulé aucune objection en vertu de l'article 5, ou que toutes les objections présentées ont été levées, le Secrétariat fait une notification conformément aux dispositions du paragraphe a) de l'article 3, en indiquant que la dénomination a été choisie par l'OMS en tant que dénomination commune internationale recommandée.

Article 8 - En communiquant aux Etats Membres, conformément à l'article 7, une dénomination commune internationale recommandée, le Secrétariat :

- a) demande que cette dénomination soit reconnue comme dénomination commune de la substance considérée ; et
- b) demande aux Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'acquisition de droits de propriété sur cette dénomination et interdire le dépôt de cette dénomination comme marque ou appellation commerciale.

Article 9 -

a) Dans le cas exceptionnel où une dénomination commune internationale déjà recommandée donne lieu à des erreurs de médication, de prescription ou de distribution ou en comporte un risque démontrable, en raison d'une similitude avec une autre appellation dans la pratique pharmaceutique et/ou de prescription, et où il apparaît que ces erreurs ou ces risques d'erreur ne peuvent être facilement évités par d'autres interventions que le remplacement éventuel d'une dénomination commune internationale déjà recommandée, ou dans le cas où une dénomination commune internationale déjà recommandée diffère sensiblement de la dénomination commune approuvée dans un nombre important d'Etats Membres, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles qui justifient le remplacement d'une dénomination commune internationale recommandée, toute personne intéressée peut formuler une proposition dans ce sens. Cette proposition est présentée sur la formule prévue à cet effet et doit s'accompagner des indications suivantes :

- i) nom de l'auteur de la proposition ;
- ii) intérêt qu'il ou elle porte au remplacement proposé ;
- iii) raisons motivant la proposition ; et
- iv) description, faits à l'appui, des autres interventions entreprises pour tenter de régler le problème et exposé des raisons pour lesquelles ces interventions ont échoué.

Les propositions peuvent comprendre une proposition de nouvelle dénomination commune internationale de remplacement, établie conformément aux Directives générales, compte tenu de la substance pharmaceutique pour laquelle la nouvelle dénomination commune internationale de remplacement est proposée.

Le Secrétariat transmet une copie de la proposition pour examen, conformément à la procédure exposée plus loin au paragraphe b), au Groupe d'experts des DCI et au demandeur initial ou à son successeur (s'il s'agit d'une personne différente de celle qui a formulé la proposition de remplacement et pour autant que le demandeur initial ou son successeur soit connu ou puisse être retrouvé moyennant des efforts diligents, notamment des contacts avec les associations industrielles).

De plus, le Secrétariat demande aux entités et personnes ci-après de formuler des observations sur la proposition :

- i) les Etats Membres et les commissions nationales et régionales de pharmacopée ou d'autres organismes désignés par les Etats Membres (en insérant une note à cet effet dans la lettre mentionnée à l'article 3.a), et
- ii) toutes autres personnes portant au remplacement proposé un intérêt notoire.

La demande d'observations contient les indications suivantes :

- i) dénomination commune internationale recommandée pour laquelle un remplacement est proposé (et la dénomination de remplacement proposée, si elle est fournie) ;
- ii) nom de l'auteur de la proposition de remplacement (si cette personne le demande) ;
- iii) définition de la substance faisant l'objet du remplacement proposé et raisons avancées pour le remplacement ;
- iv) délai pendant lequel seront reçus les commentaires et nom et adresse de la personne habilitée à recevoir ces commentaires ; et
- v) mention des pouvoirs en vertu desquels agit l'OMS et référence au présent règlement.

Des observations sur la proposition de remplacement peuvent être communiquées par toute personne à l'OMS dans les quatre mois qui suivent la date de la demande d'observations.

b) Une fois échu le délai prévu ci-dessus pour la communication d'observations, le Secrétariat transmet les observations reçues au Groupe d'experts des DCI, au demandeur initial ou à son successeur et à l'auteur de la proposition de remplacement. Si, après avoir examiné la proposition de remplacement et les observations reçues, le Groupe d'experts des DCI, l'auteur de la proposition de remplacement et le demandeur initial ou son successeur reconnaissent tous qu'il est nécessaire de remplacer la dénomination commune internationale déjà recommandée, le Secrétariat soumet la proposition de remplacement au Groupe d'experts des DCI pour qu'il y donne suite.

Nonobstant ce qui précède, le demandeur initial ou son successeur n'est pas habilité à refuser son accord à une proposition de remplacement au cas où il ne peut être démontré qu'il porte un intérêt durable à la dénomination commune internationale recommandée qu'il est proposé de remplacer.

Dans le cas où une proposition de remplacement est soumise au Groupe d'experts des DCI pour qu'il y donne suite, le Groupe choisit une nouvelle dénomination commune internationale conformément aux Directives générales mentionnées à l'article 2 et selon la procédure décrite dans les articles 3 à 8 inclus. La notification faite par le Secrétariat en vertu de l'article 3 et de l'article 7, respectivement, y compris au demandeur initial ou à son successeur (si ce n'est pas la même personne que celle qui a proposé le remplacement et pour autant que le demandeur initial ou son successeur soit connu ou puisse être retrouvé moyennant des efforts diligents, notamment des contacts avec les associations industrielles), doit dans un tel cas indiquer que la nouvelle dénomination remplace une dénomination commune internationale déjà recommandée et que les Etats Membres peuvent souhaiter prendre des mesures transitoires pour les produits existants qui utilisent la dénomination commune internationale déjà recommandée sur leur étiquette conformément à la législation nationale.

Si, après examen de la proposition de remplacement et des observations communiquées conformément à la procédure exposée plus haut, le Groupe d'experts des DCI, le demandeur initial ou son successeur et l'auteur de la proposition de remplacement ne s'accordent pas sur le fait qu'il y a des raisons impératives de remplacer une dénomination commune internationale déjà recommandée, cette dernière est conservée (étant entendu toujours que le demandeur initial ou son successeur n'est pas habilité à refuser son accord à une proposition de remplacement au cas où il ne peut être démontré qu'il porte un intérêt durable à la dénomination commune internationale recommandée qu'il est proposé de remplacer). Dans un tel cas, le Secrétariat informe l'auteur de la proposition de remplacement, ainsi que le demandeur initial ou son successeur (s'il s'agit d'une personne différente de celle qui a formulé la proposition de remplacement et pour autant que le demandeur initial ou son successeur soit connu ou puisse être retrouvé moyennant des efforts diligents, notamment des contacts avec les associations industrielles), les Etats Membres, les commissions nationales et régionales de pharmacopée, les autres organismes désignés par les Etats Membres et toutes autres personnes portant un intérêt notoire au remplacement proposé que, malgré une proposition de remplacement, il a été décidé de conserver la dénomination commune internationale déjà recommandée (avec une brève description de la ou des raisons pour lesquelles la proposition de remplacement n'a pas été jugée suffisamment impérative).

ANNEXE 2

**DIRECTIVES GENERALES POUR LA FORMATION DE
DENOMINATIONS COMMUNES INTERNATIONALES APPLICABLES
AUX SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES¹**

1. Les dénominations communes internationales (DCI) devront se distinguer les unes des autres par leur consonance et leur orthographe. Elles ne devront pas être d'une longueur excessive, ni prêter à confusion avec des appellations déjà couramment employées.

2. La DCI de chaque substance devra, si possible, indiquer sa parenté pharmacologique. Les dénominations susceptibles d'évoquer pour les malades des considérations anatomiques, physiologiques, pathologiques ou thérapeutiques devront être évitées dans la mesure du possible.

Outre ces deux principes fondamentaux, on respectera les principes secondaires suivants :

3. Lorsqu'on formera la DCI de la première substance d'un nouveau groupe pharmacologique, on tiendra compte de la possibilité de former ultérieurement d'autres DCI appropriées pour les substances apparentées du même groupe.

4. Pour former des DCI des acides, on utilisera de préférence un seul mot. Leurs sels devront être désignés par un terme qui ne modifie pas le nom de l'acide d'origine : par exemple « oxacilline » et « oxacilline sodique », « ibufénac » et « ibufénac sodique ».

5. Les DCI pour les substances utilisées sous forme de sels devront en général s'appliquer à la base active (ou à l'acide actif). Les dénominations pour différents sels ou esters d'une même substance active ne différeront que par le nom de l'acide inactif (ou de la base inactive). En ce qui concerne les substances à base d'ammonium quaternaire, la dénomination s'appliquera de façon appropriée au cation et à l'anion en tant qu'éléments distincts d'une substance quaternaire. On évitera de choisir une désignation évoquant un sel aminé.

6. On évitera d'ajouter une lettre ou un chiffre isolé ; en outre, on renoncera de préférence au trait d'union.

7. Pour simplifier la traduction et la prononciation des DCI, la lettre « f » sera utilisée à la place de « ph », « t » à la place de « th », « e » à la place de « ae » ou « oe », et « i » à la place de « y » ; l'usage des lettres « h » et « k » sera aussi évité.

8. On retiendra de préférence, pour autant qu'elles respectent les principes énoncés ici, les dénominations proposées par les personnes qui ont découvert ou qui, les premières, ont fabriqué et lancé sur le marché les préparations pharmaceutiques considérées, ou les dénominations déjà officiellement adoptées par un pays.

9. La parenté entre substances d'un même groupe (voir Directive générale 2) sera si possible indiquée dans les DCI par l'emploi de segments-clés communs. La liste ci-après contient des exemples de segments-clés pour des groupes de substances, surtout pour des groupes récents. Il y a beaucoup d'autres segments-clés en utilisation active.² Les segments-clés indiqués sans trait d'union pourront être insérés n'importe où dans une dénomination.

¹ Dans son vingtième rapport (OMS, Série de Rapports techniques, N° 581, 1975), le Comité OMS d'experts des Dénominations communes pour les Substances pharmaceutiques a examiné les directives générales pour la formation des dénominations communes internationales et la procédure à suivre en vue de leur choix, compte tenu de l'évolution du secteur pharmaceutique au cours des dernières années. La modification la plus importante a été l'extension aux substances de synthèse de la pratique normalement suivie pour désigner les substances tirées ou dérivées de produits naturels. Cette pratique consiste à employer des syllabes communes ou groupes de syllabes communes (segments-clés) qui sont caractéristiques et indiquent une propriété commune aux membres du groupe des substances pour lequel ces segments-clés ont été retenus. Les raisons et les conséquences de cette modification ont fait l'objet de discussions approfondies.
Les directives ont été mises à jour lors de la treizième consultation sur les dénominations communes pour les substances pharmaceutiques (Genève, 27-29 avril 1983) (PHARM S/NOM 928, 13 mai 1983, révision en date du 18 août 1983).

² Une liste plus complète de segments-clés est contenue dans le document de travail WHO/EMP/RHT/TSN/2018.1 qui est régulièrement mis à jour et qui peut être demandé auprès du programme des DCI, OMS, Genève

Latin	Français	
-acum	-ac	substances anti-inflammatoires du groupe de l'ibufénac analgésiques
-adolum	-adol	
-adol-	-adol-	
-astum	-ast	antiasthmatiques, antiallergiques n'agissant pas principalement en tant qu'antihistaminiques
-astinum	-astine	antihistaminiques
-azepamum	-azépam	substances du groupe du diazépam
bol	bol	stéroïdes anabolisants
-cain-	-caïn-	antiarythmiques de classe I, dérivés du procaïnamide et de la lidocaïne
-cainum	-caïne	anesthésiques locaux
cef-	céf-	antibiotiques, dérivés de l'acide céphalosporanique
-cillinum	-cilline	antibiotiques, dérivés de l'acide 6-aminopénicillanique
-conazolum	-conazole	agents antifongiques systémiques du groupe du miconazole
cort	cort	corticostéroïdes, autres que les dérivés de la prednisolone
-coxibum	-coxib	inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase
-entanum	-entan	antagonistes du récepteur de l'endothéline
gab	gab	gabamimétiques
-gado-	-gado-	agents diagnostiques, dérivés du gadolinium
-gatranum	-gatran	antithrombines, antithrombotiques
gest	gest	stéroïdes progestogènes
gli	gli	antihyperglycémiant
io-	io-	produits de contraste iodés
-metacinum	-métacine	substances anti-inflammatoires du groupe de l'indométacine
-mycinum	-mycine	antibiotiques produits par des souches de <i>Streptomyces</i>
-nidazolum	-nidazole	substances antiprotozoaires du groupe du métronidazole
-ololum	-olol	antagonistes des récepteurs β -adrénergiques
-oxacinum	-oxacine	substances antibactériennes du groupe de l'acide nalidixique
-platinum	-platine	antinéoplasiques, dérivés du platine
-poetinum	-poétine	facteurs sanguins de type érythropoïétine
-pril(at)um	-pril(ate)	inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
-profenum	-profène	substances anti-inflammatoires du groupe de l'ibuprofène
prost	prost	prostaglandines
-relinum	-réline	peptides stimulant la libération d'hormones hypophysaires
-sartanum	-sartan	antagonistes d'un récepteur de l'angiotensine II, antihypertenseurs (non peptidiques)
-vaptanum	-vaptan	antagonistes du récepteur de la vasopressine
vin-	vin-	alcaloïdes du type vinca
-vin-	-vin-	

ANEXO 1

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DENOMINACIONES
COMUNES INTERNACIONALES RECOMENDADAS PARA
SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS¹**

La Organización Mundial de la Salud (OMS) seguirá el procedimiento que se expone a continuación tanto para seleccionar denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA3.11, como para sustituir esas denominaciones.

Artículo 1 - Las propuestas de denominaciones comunes internacionales recomendadas y las propuestas de sustitución de esas denominaciones se presentarán a la OMS en los formularios que se proporcionen a estos efectos. El estudio de estas propuestas estará sujeto al pago de una tasa destinada a sufragar los costos de administración que ello suponga para la Secretaría de la OMS («la Secretaría»). La Secretaría establecerá la cuantía de esa tasa y podrá ajustarla periódicamente.

Artículo 2 - Estas propuestas serán sometidas por la Secretaría a los miembros del Cuadro de Expertos en Farmacopea Internacional y Preparaciones Farmacéuticas encargados de su estudio, en adelante designados como «el Grupo de Expertos en DCI», para que las examinen de conformidad con los «Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas», anexos a este procedimiento.² A menos que haya poderosas razones en contra, la denominación aceptada será la empleada por la persona que haya descubierto o fabricado y comercializado por primera vez esa sustancia farmacéutica.

Artículo 3 - Tras el examen al que se refiere el artículo 2, la Secretaría notificará que está en estudio un proyecto de denominación internacional.

a) Esa notificación se hará mediante una publicación en *Información Farmacéutica OMS*³ y el envío de una carta a los Estados Miembros y a las comisiones nacionales y regionales de las farmacopeas u otros organismos designados por los Estados Miembros.

i) La notificación será enviada también a la persona que haya presentado la propuesta («el solicitante inicial») y a otras personas que tengan un interés especial en una denominación objeto de estudio.

b) En esa notificación se incluirán los siguientes datos:

i) la denominación sometida a estudio;

ii) la identidad de la persona que ha presentado la propuesta de denominación de la sustancia, si lo pide esa persona;

iii) la identidad de la sustancia cuya denominación está en estudio;

iv) el plazo fijado para recibir observaciones y objeciones, así como el nombre y la dirección de la persona a quien deban dirigirse; y

v) los poderes conferidos para el caso a la OMS y una referencia al presente procedimiento.

¹ Véase el anexo 1 en OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 581, 1975. El texto vigente fue adoptado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB15.R7 y modificado en las resoluciones EB43.R9 y EB115.R4..

² Véase el anexo 2.

³ Hasta 1987 las listas de DCI se publicaban en la *Crónica de la Organización Mundial de la Salud*.

c) Al enviar esa notificación, la Secretaría solicitará de los Estados Miembros la adopción de todas las medidas necesarias para impedir la adquisición de derechos de patente sobre la denominación propuesta, durante el periodo en que la OMS la tenga en estudio.

Artículo 4 - Toda persona puede formular a la OMS observaciones sobre la denominación propuesta dentro de los cuatro meses siguientes a su publicación en *Información Farmacéutica OMS*, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.

Artículo 5 - Toda persona interesada puede presentar una objeción formal a una denominación propuesta dentro de los cuatro meses siguientes a su publicación en *Información Farmacéutica OMS*, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.

Esa objeción deberá acompañarse de los siguientes datos:

- i) la identidad de la persona que formula la objeción;
- ii) las causas que motivan su interés por la denominación; y
- iii) las causas que motivan su objeción a la denominación propuesta.

Artículo 6 - Cuando se haya presentado una objeción formal en la forma prevista en el artículo 5, la OMS podrá reconsiderar el nombre propuesto o utilizar sus buenos oficios para intentar lograr que se retire la objeción. La OMS no seleccionará como denominación común internacional una denominación a la que se haya hecho una objeción formal, presentada según lo previsto en el artículo 5, que no haya sido retirada, todo ello sin perjuicio de que la Organización examine otra denominación o denominaciones sustitutivas.

Artículo 7 - Cuando no se haya formulado ninguna objeción en la forma prevista en el artículo 5, o cuando todas las objeciones presentadas hayan sido retiradas, la Secretaría notificará, conforme a lo dispuesto en el párrafo a) del artículo 3, que la denominación ha sido seleccionada por la OMS como denominación común internacional recomendada.

Artículo 8 - Al comunicar a los Estados Miembros una denominación común internacional, conforme a lo previsto en el artículo 7, la Secretaría:

a) solicitará que esta denominación sea reconocida como denominación común para la sustancia de que se trate; y

b) solicitará a los Estados Miembros que adopten todas las medidas necesarias para impedir la adquisición de derechos de patente sobre la denominación, y prohíban que sea registrada como marca de fábrica o como nombre comercial.

Artículo 9

a) En el caso excepcional de que, debido a su semejanza con otra denominación utilizada en las prácticas farmacéuticas y/o de prescripción, una denominación común internacional recomendada anteriormente ocasione errores de medicación, prescripción o distribución, o suponga un riesgo manifiesto de que esto ocurra, y parezca que tales errores o potenciales errores no sean fácilmente subsanables con otras medidas que no sean la posible sustitución de esa denominación común internacional recomendada anteriormente; en el caso de que una denominación común internacional recomendada anteriormente difiera considerablemente de la denominación común aprobada en un número importante de Estados Miembros, o en otras circunstancias excepcionales que justifiquen el cambio de una denominación común internacional recomendada, cualquier persona interesada puede presentar propuestas en este sentido. Esas propuestas se presentarán en los formularios que se proporcionen a estos efectos e incluirán los siguientes datos:

- i) la identidad de la persona que presenta la propuesta;
- ii) las causas que motivan su interés en la sustitución propuesta;
- iii) las causas que motivan la propuesta; y

iv) una descripción, acompañada de pruebas documentales, de las otras medidas que se hayan adoptado con el fin de resolver la situación y de los motivos por los cuales dichas medidas no han sido suficientes.

Entre esas propuestas podrá figurar una relativa a una nueva denominación común internacional sustitutiva, formulada con arreglo a los Principios generales y que tenga en cuenta la sustancia farmacéutica para la que se proponga la nueva denominación común internacional sustitutiva.

La Secretaría enviará al Grupo de Expertos en DCI y al solicitante inicial o a su sucesor (en el caso de que sea una persona diferente de la que ha presentado la propuesta de sustitución y siempre que el solicitante inicial o su sucesor sean conocidos o puedan ser encontrados mediante esfuerzos diligentes, como el contacto con las asociaciones industriales) una copia de la propuesta, para que sea examinada de conformidad con el procedimiento descrito en el párrafo *b) infra*.

Además, la Secretaría solicitará observaciones sobre la propuesta:

i) a los Estados Miembros y a las comisiones nacionales y regionales de las farmacopeas u otros organismos designados por los Estados Miembros (ello se hará incluyendo una notificación a tal efecto en la carta a la que se refiere el párrafo *a)* del artículo 3), y

ii) a cualquier persona que tenga un interés especial en la sustitución propuesta.

Al solicitar que se formulen estas observaciones se facilitarán los siguientes datos:

i) la denominación común internacional recomendada que se propone sustituir (y la denominación sustitutiva propuesta, si se ha facilitado);

ii) la identidad de la persona que ha presentado la propuesta de sustitución (si lo pide esa persona);

iii) la identidad de la sustancia a la que se refiere la sustitución propuesta y las razones para presentar la propuesta de sustitución;

iv) el plazo fijado para recibir observaciones, así como el nombre y la dirección de la persona a quien deban dirigirse; y

v) los poderes conferidos para el caso a la OMS y una referencia al presente procedimiento.

Toda persona puede formular a la OMS observaciones sobre la sustitución propuesta dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que se realizó la solicitud de observaciones.

b) Una vez agotado el mencionado plazo para la formulación de observaciones, la Secretaría enviará todos los comentarios recibidos al Grupo de Expertos en DCI, al solicitante inicial o a su sucesor, y a la persona que haya presentado la propuesta de sustitución. Si después de examinar la propuesta de sustitución y las observaciones recibidas, el Grupo de Expertos en DCI, la persona que haya presentado la propuesta de sustitución y el solicitante inicial, o su sucesor, están de acuerdo en la necesidad de sustituir la denominación común internacional recomendada anteriormente, la Secretaría remitirá la propuesta de sustitución al Grupo de Expertos en DCI para que la tramite.

No obstante lo anterior, el solicitante inicial o su sucesor no tendrán derecho a impedir el acuerdo sobre una propuesta de sustitución en el caso de que hayan dejado de tener un interés demostrable en la denominación común internacional cuya sustitución se propone.

En caso de que la propuesta de sustitución sea presentada al Grupo de Expertos en DCI para que la tramite, este grupo seleccionará una nueva denominación común internacional de conformidad con los Principios generales a los que se refiere el artículo 2 y al procedimiento establecido en los artículos 3 a 8 inclusive. En ese caso, en las notificaciones que la Secretaría ha de enviar con arreglo a los artículos 3 y 7, respectivamente, incluida la notificación al solicitante

inicial o a su sucesor (en el caso de que no sea la misma persona que propuso la sustitución y siempre que el solicitante inicial o su sucesor sean conocidos o puedan ser encontrados mediante esfuerzos diligentes, como el contacto con las asociaciones industriales), se indicará que la nueva denominación sustituye a una denominación común internacional recomendada anteriormente y que los Estados Miembros podrán, si lo estiman oportuno, adoptar disposiciones transitorias aplicables a los productos existentes en cuya etiqueta se utilice, con arreglo a la legislación nacional, la denominación común internacional recomendada anteriormente que se haya sustituido.

En caso de que, después de haber estudiado la propuesta de sustitución y los comentarios recibidos de conformidad con el procedimiento descrito anteriormente, el Grupo de Expertos en DCI, el solicitante inicial o su sucesor y la persona que haya presentado la propuesta de sustitución no lleguen a un acuerdo sobre la existencia de razones poderosas para sustituir una denominación común internacional recomendada anteriormente, esta denominación se mantendrá (siempre en el entendimiento de que el solicitante inicial o su sucesor no tendrán derecho a impedir el acuerdo sobre una propuesta de sustitución en el caso de que hayan dejado de tener un interés demostrable en la denominación común internacional cuya sustitución se propone). En ese caso, la Secretaría comunicará a la persona que haya propuesto la sustitución, así como al solicitante inicial o a su sucesor (en el caso de que no sea la misma persona que propuso la sustitución y siempre que el solicitante inicial o su sucesor sean conocidos o puedan ser encontrados mediante esfuerzos diligentes, como el contacto con las asociaciones industriales), a los Estados Miembros, a las comisiones nacionales y regionales de las farmacopeas o a otros organismos designados por los Estados Miembros y a cualquier otra persona que tenga interés en la sustitución propuesta, que, pese a la presentación de una propuesta de sustitución, se ha decidido mantener la denominación común internacional recomendada anteriormente (con una descripción de la o las razones por las que se ha considerado que la propuesta de sustitución no estaba respaldada por razones suficientemente poderosas).

ANEXO 2

PRINCIPIOS GENERALES DE ORIENTACIÓN PARA FORMAR DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES PARA SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS¹

1. Las denominaciones comunes internacionales (DCI) deberán diferenciarse tanto fonética como ortográficamente. No deberán ser incómodamente largas, ni dar lugar a confusión con denominaciones de uso común.

2. La DCI de una sustancia que pertenezca a un grupo de sustancias farmacológicamente emparentadas deberá mostrar apropiadamente este parentesco. Deberán evitarse las denominaciones que puedan tener connotaciones anatómicas, fisiológicas, patológicas o terapéuticas para el paciente.

Estos principios primarios se pondrán en práctica utilizando los siguientes principios secundarios:

3. Al idear la DCI de la primera sustancia de un nuevo grupo farmacológico, deberá tenerse en cuenta la posibilidad de poder formar DCI convenientes para las sustancias emparentadas que se agreguen al nuevo grupo.

4. Al idear DCI para ácidos, se preferirán las de una sola palabra; sus sales deberán denominarse sin modificar el nombre del ácido: p. ej. «oxacilina» y «oxacilina sódica», «ibufenaco» y «ibufenaco sódico».

¹ En su 20º informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 581, 1975), el Comité de Expertos de la OMS en Denominaciones Comunes para las Sustancias Farmacéuticas revisó los Principios generales para formar denominaciones comunes internacionales (DCI), y su procedimiento de selección, a la luz de las novedades registradas en los últimos años en materia de compuestos farmacéuticos. El cambio más importante había consistido en hacer extensivo a la denominación de sustancias químicas sintéticas el método utilizado hasta entonces para las sustancias originadas en productos naturales o derivadas de éstos. Dicho método conlleva la utilización de una «partícula» característica que indica una propiedad común a los miembros de un grupo. En el citado informe se examinan en detalle las razones y consecuencias de este cambio.

Los Principios generales de orientación se actualizaron durante la 13ª consulta sobre denominaciones comunes para sustancias farmacéuticas (Ginebra, 27 a 29 de abril de 1983) (PHARM S/NOM 928, 13 de mayo de 1983, revisado el 18 de agosto de 1983).

5. Las DCI para las sustancias que se usan en forma de sal deberán en general aplicarse a la base activa o al ácido activo. Las denominaciones para diferentes sales o ésteres de la misma sustancia activa solamente deberán diferir en el nombre del ácido o de la base inactivos. En los compuestos de amonio cuaternario, el catión y el anión deberán denominarse adecuadamente por separado, como componentes independientes de una sustancia cuaternaria y no como sales de una amina.

6. Deberá evitarse el empleo de letras o números aislados; también es indeseable el empleo de guiones.

7. Para facilitar la traducción y la pronunciación, se emplearán de preferencia las letras «f» en lugar de «ph», «t» en lugar de «th», «e» en lugar de «ae» u «oe», e «i» en lugar de «y»; se deberá evitar el empleo de las letras «h» y «k».

8. Siempre que las denominaciones propuestas estén de acuerdo con estos principios, recibirán una consideración preferente las denominaciones propuestas por la persona que haya descubierto las sustancias, o que fabrique y comercialice por primera vez una sustancia farmacéutica, así como las denominaciones ya adoptadas oficialmente en cualquier país.

9. El parentesco entre sustancias del mismo grupo se pondrá de manifiesto en las DCI (véase el Principio 2) utilizando una partícula común. En la lista que figura a continuación se indican ejemplos de partículas para grupos de sustancias, en particular para grupos nuevos. Existen muchas otras partículas que se usan habitualmente.¹ Cuando una partícula aparece sin guión alguno, puede utilizarse en cualquier lugar de la palabra.

Latin	Español	
-acum	-aco	antiinflamatorios derivados del ibufenaco
-adolum	-adol)	analgésicos
-adol-	-adol-)	
-astum	-ast	antiasmáticos, sustancias antialérgicas cuya acción principal no es la antihistamínica
-astinum	-astina	antihistamínicos
-azepamum	-azepam	derivados del diazepam
bol	bol	esteroides anabolizantes
-cain-	-caína-	antiarrítmicos de clase I, derivados de procainamida y lidocaína
-cainum	-caína-	anestésicos locales
cef-	cef-	antibióticos, derivados del ácido cefalosporánico
-cillinum	-cilina	antibióticos derivados del ácido 6-aminopenicilánico
-conazolum	-conazol	antifúngicos sistémicos derivados del miconazol
cort	cort	corticosteroides, excepto derivados de prednisolona
-coxibum	-coxib	inhibidores selectivos de ciclooxigenasa
-entanum	-entán	antagonistas del receptor de endotelina
gab	gab	gabamiméticos
gado-	gado-	agentes para diagnóstico derivados de gadolinio
-gartranum	-gastrán	inhibidores de la trombina antitrombóticos
gest	gest	esteroides progestágenos
gli	gli	hipoglucemiantes, antihiper glucémicos
io-	io-	medios de contraste iodados
-metacinum	-metacina	antiinflamatorios derivados de indometacina
-mycinum	-micina	antibióticos producidos por cepas de <i>Streptomyces</i>
-nidazolum	-nidazol	antiprotozoarios derivados de metronidazol
-ololum	-olol	antagonistas de receptores β-adrenérgicos

¹ En el documento de trabajo WHO/EMP/RHT/TSN/2018.1, que se actualiza periódicamente y puede solicitarse al Programa sobre Denominaciones Comunes Internacionales, OMS, Ginebra, figura una lista más amplia de partículas.

<i>-oxacinum</i>	<i>-oxacino</i>	antibacterianos derivados del ácido nalidíxico
<i>-platinum</i>	<i>-platino</i>	antineoplásicos derivados del platino
<i>-poetinum</i>	<i>-poetina</i>	factores sanguíneos similares a la eritropoyetina
<i>-pril(at)um</i>	<i>-pril(at)</i>	inhibidores de la enzima conversora de laangiotensina
<i>-profenum</i>	<i>-profeno</i>	antiinflamatorios derivados del ibuprofeno
<i>prost</i>	<i>prost</i>	prostaglandinas
<i>-relinum</i>	<i>-relina</i>	péptidos estimulantes de la liberación de hormonas hipofisarias
<i>-sartanum</i>	<i>-sartán</i>	antihipertensivos (no peptídicos) antagonistas del
<i>-vaptanum</i>	<i>-vaptán</i>	antagonistas del receptor de vasopresina
<i>vin-</i>	<i>vin-)</i>	alcaloides de la vinca
<i>-vin-</i>	<i>-vin-)</i>	