MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Óptica geométrica

Feixes e frentes de onda, reflexão, espelhos, refração, lentes, formação de imagens e instrumentos ópticos (item 6 do edital de Física)

O que este material cobre e como estudar

Pessoal, o edital de Física pede o bloco de **óptica geométrica** inteiro: feixes e frentes de onda, reflexão e refração da luz, espelhos, lentes, formação de imagens, índice de refração e leis da refração e instrumentos ópticos simples. O curso principal só trata de reflexão e refração **do som**, então este complemento fecha a lacuna.

A ordem é a mesma de uma boa aula de óptica:

1. Princípios da óptica, feixes de luz, frentes de onda, sombra e penumbra, câmara escura;
2. Reflexão da luz e espelhos planos;
3. Espelhos esféricos (côncavo e convexo);
4. Refração da luz: índice de refração, lei de Snell, ângulo limite e reflexão total, dioptro plano, lâminas e prismas;
5. Lentes esféricas delgadas;
6. Instrumentos ópticos e o olho humano.

> **Como a AOCP cobra óptica:** a maior parte das questões é **conceitual** ("a imagem é real ou virtual? direita ou invertida? maior ou menor?") ou pede **uma conta curta** com a equação de Gauss, a lei de Snell ou o ângulo limite. Quase nunca exige construção geométrica elaborada. Domine as **tabelas de imagem** e a **convenção de sinais**, que valem mais que qualquer macete.

Convenção de sinais (a de Gauss), que vamos usar o tempo todo

Grandeza	Símbolo	Positivo (+)	Negativo (–)
Posição do objeto	p	objeto **real** (o normal)	objeto virtual (raros casos)
Posição da imagem	p'	imagem **real** (do lado de onde a luz sai)	imagem **virtual**
Distância focal	f	espelho **côncavo**; lente **convergente**	espelho **convexo**; lente **divergente**
Altura do objeto	o	acima do eixo	abaixo do eixo
Altura da imagem	i	imagem **direita** (mesmo sentido do objeto)	imagem **invertida**

Equações que valem para espelhos esféricos **e** lentes delgadas:

- **Equação de Gauss:** $1/f = 1/p + 1/p'$
- **Aumento linear transversal:** $A = i/o = – p'/p$

> **Leitura dos sinais:** $p' > 0$ → imagem real; $p' < 0$ → imagem virtual. $A > 0$ → imagem direita; $A < 0$ → imagem invertida. $|A| > 1$ → ampliada; $|A| < 1$ → reduzida.

1. Princípios da óptica e feixes de luz

1.1 Luz, fontes e meios

A **óptica geométrica** descreve a luz por **raios** (linhas orientadas que indicam a direção e o sentido de propagação) e não leva em conta sua natureza ondulatória. Ela funciona bem quando os objetos e aberturas são muito maiores que o comprimento de onda da luz (da ordem de 400 a 700 nm).

- **Fonte primária (luminosa):** emite luz própria. Ex.: Sol, lâmpada acesa, chama.
- **Fonte secundária (iluminada):** só reenvia a luz que recebe. Ex.: Lua, uma parede, este papel.
- **Fonte puntiforme (pontual):** de dimensões desprezíveis. **Fonte extensa:** de dimensões consideráveis em relação às distâncias do problema.

Meio	Comportamento da luz	Exemplo
Transparente	passa quase toda, e dá para enxergar nitidamente através dele	ar, vidro liso, água limpa
Translúcido	passa, mas espalhada: enxerga-se luz, não a imagem nítida	vidro fosco, papel vegetal
Opaco	não deixa passar a luz (absorve ou reflete)	madeira, metal, parede

A velocidade da luz **no vácuo** é $\mathbf{c \approx 3{,}0 \times 10^8\ m/s}$, o limite máximo de velocidade do universo; em qualquer meio material ela é menor.

1.2 Os três princípios da óptica geométrica

1. **Propagação retilínea:** em um meio **homogêneo e transparente**, a luz se propaga em linha reta.
2. **Independência dos raios luminosos:** quando raios de luz se cruzam, cada um segue como se os outros não existissem (por isso duas lanternas cruzadas não se atrapalham).
3. **Reversibilidade dos raios:** se a luz percorre um caminho num sentido, pode percorrer o mesmo caminho no sentido oposto. Se você vê os olhos de alguém num espelho, essa pessoa também vê os seus.

1.3 Feixes de luz

Um **feixe** é um conjunto de raios. Classifica-se pela forma como os raios se comportam:

Feixe	Como são os raios	Origem típica
Paralelo (cilíndrico)	mantêm distância constante entre si	fonte **muito distante** (Sol, estrelas), laser
Divergente (cônico)	se afastam uns dos outros, partindo de um ponto	fonte puntiforme próxima, lâmpada pequena
Convergente	se aproximam e se encontram em um ponto	luz que sai de uma lente convergente ou espelho côncavo

O ponto de onde os raios divergem (ou para onde convergem) é o **foco** do feixe. Se os raios **realmente** passam por ele, o ponto é **real**; se são só os **prolongamentos** dos raios que passam por ele, o ponto é **virtual**. Essa distinção é a base de toda a discussão de imagens: **imagem real é formada por raios que de fato se cruzam; imagem virtual, pelos prolongamentos.**

1.4 Frentes de onda

Uma **frente de onda** é a superfície que une todos os pontos do meio que são atingidos pela onda **no mesmo instante** (pontos em fase). Ela é **perpendicular aos raios** de luz.

- Fonte **puntiforme**, meio homogêneo: frentes de onda **esféricas**, e os raios saem radialmente

(feixe divergente).

- Fonte **muito distante**: frentes de onda praticamente **planas**, e os raios são paralelos (feixe paralelo).
- Feixe **convergente**: frentes esféricas "fechando" em direção ao ponto de convergência.

> **Macete:** raio é sempre **perpendicular** à frente de onda. Se o enunciado traz frentes de onda planas, os raios são paralelos; se esféricas, os raios são radiais.

1.5 Sombra, penumbra e câmara escura

Como a luz anda em linha reta, um objeto opaco colocado entre a fonte e um anteparo projeta **sombra**.

- **Fonte puntiforme:** só há **sombra** (região escura, sem luz).
- **Fonte extensa:** aparecem **sombra** (nenhum ponto da fonte ilumina) e **penumbra** (alguns pontos da fonte iluminam, outros não).

Por **semelhança de triângulos**, a altura da sombra de um objeto vertical iluminado por uma fonte puntiforme depende das distâncias. Para o Sol, cujos raios chegam paralelos, vale: **H/sombra de H = h/sombra de h** (a razão altura/sombra é a mesma para todos os objetos no mesmo instante).

> **Exemplo 1.** Uma vara de 1,5 m projeta sombra de 2,0 m. No mesmo instante, um prédio projeta sombra de 40 m. Qual a altura do prédio? Altura/sombra = 1,5/2,0 = 0,75. Prédio: 0,75 × 40 = **30 m**.

A **câmara escura de orifício** é uma caixa fechada com um furo pequeno numa face. A luz que entra forma, na face oposta, uma imagem **real, invertida** do objeto. Semelhança de triângulos dá:

- **o / i = p / p'**, em que o = altura do objeto, i = altura da imagem, p = distância do objeto ao orifício, p' = profundidade da câmara.

> **Exemplo 2.** Um objeto de 2,0 m está a 10 m do orifício de uma câmara escura de 20 cm de profundidade. Qual o tamanho da imagem? i = o · p'/p = 2,0 × 0,20 / 10 = **0,04 m = 4 cm** (invertida).

Se o orifício for aumentado, a imagem fica mais **brilhante**, porém menos **nítida**.

2. Reflexão da luz e espelho plano

2.1 Leis da reflexão

Reflexão é o retorno da luz ao meio de origem ao incidir numa superfície. Os ângulos são sempre medidos em relação à **normal** (reta perpendicular à superfície no ponto de incidência), e **não** em relação à superfície.

1. **1ª lei:** o raio incidente, o raio refletido e a normal estão **no mesmo plano**.
2. **2ª lei:** o ângulo de reflexão é **igual** ao ângulo de incidência (**r = i**).

Tipos de reflexão:

- **Especular (regular):** superfície lisa, raios paralelos continuam paralelos; formam-se imagens (espelhos).
- **Difusa:** superfície rugosa, raios saem em todas as direções; é por ela que enxergamos os objetos que não têm luz própria. Cada raio individual ainda obedece às leis da reflexão.

2.2 Espelho plano: formação de imagem

Num espelho plano, a imagem de um objeto real tem as seguintes características:

- é **virtual** (formada pelos prolongamentos dos raios, atrás do espelho);
- é **direita** e do **mesmo tamanho** do objeto (A = +1);
- é **simétrica** ao objeto em relação ao plano do espelho: **p' = – p** (mesma distância, porém do outro lado);
- é **enantiomorfa**: imagem e objeto não se sobrepõem (como a mão direita e a esquerda). Por isso a mão direita da imagem "aparece" como mão esquerda, e as letras ficam invertidas lateralmente (não de cima para baixo).

> **Pegadinha clássica:** o espelho inverte **esquerda-direita**? Na verdade ele inverte **frente-trás** (a imagem "olha" para você). A impressão de inversão lateral vem de nós girarmos para nos comparar com a imagem. Em prova, use a palavra **enantiomorfa** ou "não sobreponível".

Consequências quantitativas (todas decorrem de p' = – p):

- **Distância entre objeto e imagem** = 2d, sendo d a distância do objeto ao espelho.
- Se o objeto se **afasta** do espelho com velocidade v, a imagem se afasta com velocidade v em sentido oposto; a velocidade da imagem **em relação ao objeto** é **2v**.
- Se o **espelho** se desloca d (objeto parado), a imagem se desloca **2d**.
- Se o espelho **gira** um ângulo α (mantendo fixo o raio incidente), o raio refletido gira **2α**.

> **Exemplo 3.** Uma pessoa anda a 1,5 m/s em direção a um espelho plano fixo. Com que velocidade ela se aproxima da própria imagem? A imagem se aproxima do espelho também a 1,5 m/s, em sentido contrário. Velocidade relativa: 1,5 + 1,5 = **3,0 m/s**.
>
> **Exemplo 4.** Um raio incide em um espelho plano. O espelho gira 15° em torno de um eixo no ponto de incidência. De quanto gira o raio refletido? Gira o **dobro**: 2 × 15° = **30°**.

Espelho mínimo para ver o corpo inteiro. Para ver o corpo inteiro, o espelho precisa ter **metade da altura da pessoa**, e a borda inferior deve estar a **metade da altura dos olhos** em relação ao chão. A distância da pessoa ao espelho **não** altera esse tamanho mínimo.

> **Exemplo 5.** Uma pessoa de 1,80 m tem os olhos a 1,70 m do solo. Altura mínima do espelho e posição da borda inferior? Altura mínima: 1,80/2 = **0,90 m**. Borda inferior: 1,70/2 = **0,85 m** do chão (a borda superior fica a 1,75 m, ponto médio entre o olho e o topo da cabeça).

Campo visual: é a região do espaço que um observador consegue ver pelo espelho. Aproximar-se do espelho **aumenta** o campo visual; é por isso que retrovisores são vistos com mais amplitude quando o motorista chega perto.

2.3 Associação de dois espelhos planos

Dois espelhos planos formando um ângulo **θ** entre si, com um objeto entre eles, produzem várias imagens. Se 360°/θ é um número **inteiro**:

- **N = 360°/θ – 1** imagens.

θ	360°/θ	Imagens formadas
120°	3	2
90°	4	3

72°	5	4
60°	6	5
45°	8	7

Em casos extremos: espelhos **paralelos** (θ = 0°) formam **infinitas** imagens (como nos corredores de espelhos de elevadores); com θ = 180° (um espelho só), há uma imagem. A fórmula acima vale quando 360°/θ é inteiro; quando não é, a contagem depende da posição do objeto e a questão normalmente informa.

2.4 Espelhos planos no cotidiano

Periscópio (dois espelhos a 45°), caleidoscópio (espelhos em ângulo), retrovisores e espelhos de maquiagem (estes últimos esféricos). A reflexão em ambulâncias com a palavra "AMBULÂNCIA" escrita "ao contrário" é uma aplicação direta da enantiomorfia: o motorista à frente lê corretamente pelo retrovisor.

3. Espelhos esféricos

3.1 Elementos

Um **espelho esférico** é uma calota esférica com uma das faces refletora. Se a face refletora é a **interna**, o espelho é **côncavo**; se é a **externa**, é **convexo**.

Elemento	O que é
C (centro de curvatura)	centro da esfera da qual a calota faz parte
R (raio de curvatura)	raio da esfera
V (vértice)	centro da calota, ponto do espelho que fica no eixo
Eixo principal	reta que passa por C e V
F (foco principal)	ponto onde convergem (ou de onde parecem divergir) os raios paralelos ao eixo
f (distância focal)	distância de F ao vértice

Relação fundamental: o foco fica no **ponto médio** entre C e V (válido para espelhos de **pequena abertura**, condições de Gauss):

- **f = R / 2**

Em módulo; com a convenção de sinais, f > 0 no côncavo (**foco real**) e f < 0 no convexo (**foco virtual**).

> **Macete dos sinais:** côncavo = "convergente" = **f positivo**. Convexo = "divergente" = **f negativo**.

3.2 Raios notáveis

Para construir a imagem de um ponto, bastam dois destes quatro raios:

1. Raio que **incide paralelo ao eixo** → o refletido **passa pelo foco** (côncavo) ou tem **prolongamento passando pelo foco** (convexo).
2. Raio que **incide passando pelo foco** (ou com prolongamento por ele) → o refletido sai **paralelo ao eixo**.
3. Raio que **incide passando pelo centro C** → volta sobre si mesmo (incidência normal).
4. Raio que **incide no vértice V** → sai simétrico em relação ao eixo (r = i).

3.3 Espelho côncavo: imagem conforme a posição do objeto

Considere o objeto **real** sobre o eixo, a uma distância p do vértice. Lembre-se: **F = f e C = 2f**.

Posição do objeto	Imagem	Natureza	Orientação	Tamanho
p > 2f (além de C)	entre F e C	real	invertida	menor
p = 2f (sobre C)	sobre C	real	invertida	igual
f < p < 2f (entre C e F)	além de C	real	invertida	**maior**
p = f (sobre F)	no infinito (raios saem paralelos)	**imprópria**	–	–
p < f (entre F e V)	atrás do espelho	**virtual**	**direita**	**maior**

Macete: no côncavo, a imagem é **real e invertida** para qualquer objeto **além do foco**, e **virtual, direita e maior** para objeto **entre o foco e o vértice** (o efeito "espelho de barbear" ou de maquiagem).

3.4 Espelho convexo: imagem única

Para qualquer posição do objeto real, a imagem é **virtual, direita e menor**, situada entre o foco e o vértice, atrás do espelho. Por isso o convexo oferece **campo visual amplo**: é usado em retrovisores externos de carros, espelhos de segurança em lojas e em esquinas de garagens. A contrapartida é a distância aparente maior (por isso o aviso "objetos no espelho estão mais próximos do que parecem").

3.5 Exemplos numéricos

Exemplo 6 (côncavo, imagem real). Um espelho côncavo tem raio de curvatura 40 cm. Um objeto de 5 cm de altura é colocado a 30 cm do vértice. Determine posição, natureza e altura da imagem. f = R/2 = **+20 cm**. 1/p' = 1/f – 1/p = 1/20 – 1/30 = 1/60 → **p' = +60 cm** (imagem **real**, na frente do espelho). A = – p'/p = – 60/30 = **–2** → imagem **invertida e ampliada** (2×). Altura: i = A·o = –2 × 5 = **–10 cm** (10 cm, invertida).

Exemplo 7 (côncavo, imagem virtual). Mesmo espelho (f = +20 cm), objeto a 10 cm do vértice. 1/p' = 1/20 – 1/10 = –1/20 → **p' = –20 cm** (**virtual**, 20 cm atrás do espelho). A = –(–20)/10 = **+2** → **direita e ampliada**.

Exemplo 8 (convexo). Espelho convexo de distância focal 15 cm (f = –15 cm). Objeto a 30 cm do vértice. 1/p' = 1/f – 1/p = –1/15 – 1/30 = –3/30 → **p' = –10 cm** (virtual). A = –(–10)/30 = **+1/3** → **direita e reduzida** (um terço do tamanho).

Exemplo 9 (descobrir o espelho pelo aumento). Um espelho forma uma imagem direita e 3 vezes maior que o objeto, que está a 12 cm do vértice. Que espelho é esse e qual sua distância focal? Imagem direita e maior só ocorre no côncavo com p < f. A = +3 = –p'/p → p' = –3p = –36 cm. 1/f = 1/p + 1/p' = 1/12 – 1/36 = 2/36 → **f = +18 cm** (côncavo, e de fato p = 12 < f = 18).

Exemplo 10 (relação com C). Um objeto é colocado sobre o centro de curvatura de um espelho côncavo de raio 30 cm. Onde está a imagem? p = R = 30 cm; f = 15 cm. 1/p' = 1/15 – 1/30 = 1/30 → p' = 30 cm, A = –1. A imagem está **sobre o próprio C**, real, invertida e do mesmo tamanho.

Cuidado com a pegadinha do foco impróprio: quando o objeto está exatamente em F, não há imagem a distância finita (os raios refletidos saem paralelos). Na equação, 1/p' = 0.

4. Refração da luz

4.1 Índice de refração

Refração é a passagem da luz de um meio para outro, com **mudança de velocidade**. O **índice de refração absoluto** de um meio é

- **$n = c / v$**

onde c é a velocidade da luz no vácuo e v a velocidade no meio. Como $v \leq c$, sempre **$n \geq 1$**, e n é **adimensional**. Quanto maior n, mais **refringente** é o meio e menor a velocidade da luz nele.

Meio	n (aproximado)
Vácuo	1,00
Ar	≈ 1,00 (1,0003)
Água	1,33
Vidro comum	1,5
Diamante	2,42

> **Exemplo 11.** Qual a velocidade da luz num vidro de n = 1,5? $v = c/n = 3{,}0 \times 10^8 / 1{,}5 =$ **$2{,}0 \times 10^8$ m/s**.

Na passagem de um meio para outro, o que muda e o que não muda:

Grandeza	Na refração
Frequência (f)	**não muda** (é determinada pela fonte)
Velocidade (v)	muda ($v = c/n$)
Comprimento de onda (λ)	muda ($\lambda = v/f$), diminui ao entrar num meio mais refringente
Direção de propagação	muda, se a incidência for oblíqua

O **índice de refração relativo** do meio 2 em relação ao meio 1 é $n_{2,1} = n_2 / n_1 = v_1 / v_2$.

4.2 Lei de Snell-Descartes

1. **1ª lei:** raio incidente, raio refratado e normal estão **no mesmo plano**.
2. **2ª lei (Snell):**

$n_1 \cdot \text{sen}\,\theta_1 = n_2 \cdot \text{sen}\,\theta_2$

onde θ_1 e θ_2 são os ângulos que os raios formam com a **normal**.

Interpretação rápida:

- Passando de meio **menos** refringente para **mais** refringente ($n_2 > n_1$): o raio **se aproxima da normal** ($\theta_2 < \theta_1$).
- Passando de meio **mais** para **menos** refringente ($n_2 < n_1$): o raio **se afasta da normal** ($\theta_2 > \theta_1$).
- **Incidência normal** ($\theta_1 = 0°$): não há desvio, o raio continua na mesma direção (mas a velocidade e o λ mudam).

> **Macete de memória:** "mais lento, mais perto da normal". Onde a luz anda mais devagar (n maior), o raio fica mais próximo da normal.
>
> **Exemplo 12.** Um raio de luz incide do ar (n = 1,0) em vidro (n = 1,5) com ângulo de 60° em relação à normal. Qual o ângulo de refração? $\text{sen}\,\theta_2 = (1{,}0 \times \text{sen}\,60°)/1{,}5 = 0{,}866/1{,}5 = 0{,}577 \rightarrow \theta_2 \approx$ **35,3°** (menor que 60°, aproximou-se da normal, como previsto).

A refração é sempre acompanhada de uma **reflexão parcial**: parte da luz volta ao meio de origem.

4.3 Ângulo limite e reflexão total

Quando a luz vai de um meio **mais refringente** para um **menos refringente** ($n_1 > n_2$), o raio se afasta da normal. Aumentando θ_1, chega-se a um valor em que $\theta_2 = 90°$ (o raio refratado "rasa" a superfície). Esse valor de θ_1 é o **ângulo limite L**:

- **sen L = n_menor / n_maior** (por exemplo, sen L = n_ar / n_meio)

Para incidência com ângulo **maior que L**, não há raio refratado: toda a luz é refletida. É a **reflexão total** (interna).

Condições para a reflexão total (as duas ao mesmo tempo): 1. a luz deve **ir do meio mais refringente para o menos refringente**; 2. o ângulo de incidência deve ser **maior que o ângulo limite** ($\theta_1 > L$).

> **Pegadinha:** não existe reflexão total quando a luz passa do ar para a água ou para o vidro; só no sentido contrário. E em $\theta_1 = L$ exatamente, o raio refratado é rasante, e ainda não se fala em reflexão total.

Interface	Ângulo limite
Vidro (1,5) → ar	sen L = 1/1,5 → **L ≈ 41,8°**
Água (1,33) → ar	sen L = 1/1,33 → **L ≈ 48,8°**
Diamante (2,42) → ar	sen L = 1/2,42 → **L ≈ 24,4°**

O diamante tem ângulo limite muito pequeno: grande parte da luz que entra sofre reflexão total várias vezes dentro da pedra, e é isso que lhe dá brilho.

Aplicações da reflexão total: - **Fibra óptica:** o núcleo (n maior) é envolto pela casca (n menor); a luz "viaja" por reflexões totais sucessivas, quase sem perda. Usada em telecomunicações e endoscopia. Exemplo: núcleo n = 1,5 e casca n = 1,4 → sen L = 1,4/1,5 → L ≈ 69°. Só ficam guiados os raios que incidem na interface com ângulo maior que 69°. - **Prismas de reflexão total** (binóculos, periscópios): prisma de vidro com ângulos de 45°-45°-90°; como L ≈ 41,8° < 45°, a luz que incide a 45° na hipotenusa sofre reflexão total. - **Miragem:** o ar quente próximo ao asfalto tem n menor, e raios que vêm do céu sofrem refração progressiva e reflexão total, dando a ilusão de "poça d'água". - **Brilho de bolhas, gotas e do "espelho" que se vê ao olhar para cima, debaixo d'água.**

4.4 Dioptro plano

Dioptro plano é um sistema formado por dois meios transparentes separados por uma superfície plana (por exemplo, a superfície da água). Para o observador que olha **quase perpendicularmente**, vale (condições de Gauss):

- **p' / p = n_observador / n_objeto**

onde p = distância real do objeto à superfície, p' = distância aparente da imagem à superfície, n_observador = índice do meio onde está o observador e n_objeto = índice do meio onde está o objeto.

> **Exemplo 13.** Um peixe está a 40 cm de profundidade, visto por um observador no ar, olhando quase na vertical. (n_água = 4/3.) A que profundidade o observador o vê? p' = p · n_obs/n_obj = 40 × (1)/(4/3) = **30 cm**. O peixe parece **mais perto da superfície** do que realmente está. (Por isso piscinas parecem mais rasas do que são.)

Regra geral: quem olha de um meio **menos refringente** para um objeto num meio **mais refringente** vê o objeto **mais próximo** da superfície (p' < p). Inverta e tem o oposto: o peixe, olhando para um pássaro no ar, vê o pássaro mais **longe** que ele realmente está.

4.5 Lâmina de faces paralelas

Uma lâmina de vidro (espessura **e**, índice n, no ar) desloca lateralmente o raio, mas **não altera sua direção**: o raio emergente é **paralelo** ao incidente. O desvio lateral é

- **d = e · sen(i – r) / cos r**

onde i é o ângulo de incidência e r o de refração na primeira face.

> **Exemplo 14.** Uma lâmina de vidro (n = 1,5) tem 6,0 cm de espessura. Um raio incide a 60°. Qual o deslocamento lateral? sen r = sen 60°/1,5 → r = 35,26°. d = 6,0 × sen(60° – 35,26°)/cos 35,26° = 6,0 × 0,4184/0,8165 ≈ **3,1 cm**.

Para incidência normal (i = 0), d = 0. O deslocamento cresce com a espessura e com o ângulo de incidência.

4.6 Prisma óptico

O **prisma** é um meio transparente limitado por duas faces planas que formam um ângulo **A** (ângulo de abertura). A luz sofre duas refrações e **o raio se desvia em direção à base** do prisma (se n_prisma > n_meio).

- **Desvio total: δ = i + i' – A**, sendo i o ângulo de incidência na 1ª face e i' o de emergência na 2ª.
- O desvio é **mínimo** (δ_min) quando o raio atravessa o prisma **simetricamente** (i = i'). Nesse caso: **n = sen[(A + δ_min)/2] / sen(A/2)**.
- **Prisma de pequeno ângulo A** (≲ 10°) com incidência quase normal: **δ ≈ (n – 1)·A**.

> **Exemplo 15.** Prisma de vidro (n = 1,5) com A = 60° no ar, em desvio mínimo. Qual o desvio mínimo? sen[(60° + δ)/2] = 1,5 × sen 30° = 0,75 → (60° + δ)/2 = 48,59° → δ_min = 97,18° – 60° = **≈ 37,2°**.
>
> **Exemplo 16.** Um prisma de pequeno ângulo A = 8° e n = 1,5. Desvio: δ ≈ (1,5 – 1) × 8° = **4°**.

Dispersão da luz branca. O índice de refração depende da cor (do comprimento de onda): é **maior para o violeta** e **menor para o vermelho**. Por isso, ao atravessar um prisma, a luz branca se decompõe nas cores do arco-íris, e o **violeta é o mais desviado, o vermelho o menos desviado**. O arco-íris resulta de refração, reflexão interna e dispersão nas gotas de chuva.

> **Macete:** no vácuo todas as cores têm a mesma velocidade c; **num meio material, o violeta é o mais lento** (maior n) e o vermelho o mais rápido. A frequência não muda na refração; o que muda com a cor é a frequência de origem.

5. Lentes esféricas delgadas

5.1 Tipos e comportamento

Lente é um meio transparente limitado por duas superfícies, ao menos uma esférica. Seis formatos básicos: de **bordas finas** (biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa ou menisco convergente) e de **bordas grossas** (bicôncava, plano-côncava, convexo-côncava ou menisco divergente).

O comportamento depende da **comparação entre o índice da lente (n_L) e o do meio (n_m)**:

Situação	Bordas finas	Bordas grossas
n_L > n_m (ex.: vidro no ar)	**convergente**	**divergente**
n_L < n_m (ex.: bolha de ar na água)	divergente	convergente

> **Pegadinha preferida das bancas:** "lente de bordas finas é convergente" só vale se a lente for **mais refringente** que o meio. Uma bolha de ar (lente biconvexa de ar) dentro da água é **divergente**.

- **Lente convergente:** raios paralelos ao eixo convergem para o **foco imagem F'** (**real**, f > 0).
- **Lente divergente:** raios paralelos ao eixo divergem, como se partissem do foco virtual (f < 0).

Uma lente tem **dois focos** simétricos (objeto e imagem), um de cada lado, cada um a uma distância |f| do centro óptico O. Para a lente **delgada**, trabalha-se com o centro óptico O como referência.

5.2 Raios notáveis

1. Raio **paralelo ao eixo** → refratado passa pelo **foco imagem** F' (convergente) ou tem **prolongamento passando por F'** (divergente).
2. Raio que passa pelo **foco objeto** F (ou com prolongamento por F) → refratado sai **paralelo ao eixo**.
3. Raio que passa pelo **centro óptico O** → **não sofre desvio**.

Os mesmos três raios servem para qualquer lente delgada.

5.3 Lente convergente: imagens

Fazendo A = 2f o ponto "anti-principal" (2 vezes a distância focal):

Posição do objeto	Imagem	Natureza	Orientação	Tamanho
p > 2f	entre f e 2f	real	invertida	menor
p = 2f	em 2f, do outro lado	real	invertida	igual
f < p < 2f	além de 2f	real	invertida	**maior**
p = f	no infinito	imprópria	–	–
p < f	mesmo lado do objeto	**virtual**	**direita**	**maior**

> **Macete:** a lente convergente se comporta como o espelho côncavo (as regras de "real invertida" e "virtual direita ampliada" são as mesmas). A diferença é de lado: **imagem real fica do lado oposto ao objeto** na lente, e do **mesmo lado** no espelho.

Aplicações: lupa (objeto entre F e O), projetor (objeto entre F e 2F), câmera fotográfica e olho (objeto além de 2F).

5.4 Lente divergente: imagem única

Para qualquer objeto real, a imagem é **virtual, direita e menor**, do mesmo lado do objeto, entre o foco e o centro óptico. É a lente usada para corrigir a **miopia** e nos "olhos mágicos" de portas.

5.5 Exemplos numéricos

> **Exemplo 17 (convergente, imagem real).** Lente convergente de f = 10 cm. Objeto de 4 cm a 30 cm da lente. 1/p' = 1/10 – 1/30 = 2/30 → **p' = +15 cm** (real, do outro lado). A = –15/30 = **–0,5** →

invertida e reduzida; i = –2 cm.

Exemplo 18 (convergente como lupa). Mesma lente, objeto a 5 cm. 1/p' = 1/10 – 1/5 = –1/10 → **p' = –10 cm** (virtual, do mesmo lado do objeto). A = –(–10)/5 = **+2** → direita e ampliada 2×.

Exemplo 19 (divergente). Lente divergente de f = –20 cm. Objeto a 20 cm. 1/p' = –1/20 – 1/20 = –1/10 → **p' = –10 cm** (virtual). A = 10/20 = **+0,5** → direita e reduzida.

Exemplo 20 (imagem real do mesmo tamanho). Como obter, com uma lente convergente de f = 12 cm, uma imagem real do mesmo tamanho do objeto? Coloque o objeto em p = 2f = **24 cm**; a imagem surge a p' = 24 cm, com A = –1.

5.6 Vergência (convergência) de uma lente

A **vergência** (ou "grau" da lente) é o inverso da distância focal **em metros**:

- **V = 1 / f** (unidade: **dioptria, di**, 1 di = 1 m^{-1})

Lente convergente: V > 0; divergente: V < 0. Para lentes **justapostas** (coladas), as vergências **somam**: $V = V_1 + V_2$ (e portanto $1/f = 1/f_1 + 1/f_2$).

Exemplo 21. Lente convergente de f = 25 cm: V = 1/0,25 = **+4 di**. Lente divergente de f = –50 cm: V = **–2 di**. Justapondo as duas: V = +4 – 2 = **+2 di** (convergente, f = 50 cm).

Macete dos óculos: "grau" é a vergência em dioptrias. Um "–2,0" é lente divergente com f = –50 cm. Oftalmologistas falam em "graus" para dioptrias.

5.7 Equação dos fabricantes de lentes (Halley)

Para uma lente delgada de índice n_L imersa em meio de índice n_m:

- **$1/f = (n_L / n_m – 1) \cdot (1/R_1 + 1/R_2)$**

Convenção para os raios das faces: **R > 0** para face **convexa**, **R < 0** para face **côncava**, e **1/R = 0** para face **plana** (R → ∞). Resultado com f > 0 é lente convergente; f < 0, divergente.

Exemplo 22. Lente biconvexa de vidro (n = 1,5) com $R_1 = R_2 = 20$ cm, no ar. 1/f = (1,5 – 1)(1/20 + 1/20) = 0,5 × 0,1 = 0,05 → **f = 20 cm** (convergente).

Exemplo 23 (mesma lente imersa em água). n_m = 1,33: n_L/n_m = 1,128; 1/f = 0,128 × 0,1 = 0,0128 → **f ≈ 78 cm**. A lente fica **muito menos convergente** quando mergulhada na água (por isso não enxergamos bem debaixo d'água sem máscara: o olho, imerso, perde grande parte do poder de convergência da córnea).

Exemplo 24 (menisco). Menisco de vidro (n = 1,5) com face convexa $R_1 = 10$ cm e face côncava $R_2 = –20$ cm, no ar. 1/f = 0,5 × (1/10 – 1/20) = 0,5 × 0,05 = 0,025 → f = **+40 cm**: menisco convergente (bordas finas).

Exemplo 25 (plano-convexa). $R_1 = 15$ cm, face plana, n = 1,5: 1/f = 0,5 × 1/15 → **f = 30 cm**.

5.8 Resumo para a prova (espelhos × lentes)

	Espelho côncavo	Espelho convexo	Lente convergente	Lente divergente
Sinal de f	+	–	+	–
Foco	real	virtual	real	virtual
Imagem de objeto real	real/invertida ou virtual/direita	sempre virtual, direita, menor	real/invertida ou virtual/direita	sempre virtual, direita, menor

Lado da imagem real	mesmo lado do objeto	–	lado oposto ao objeto	–
Uso típico	maquiagem, faróis, telescópios	retrovisor, segurança	lupa, câmera, projetor, hipermetropia	miopia, olho mágico

6. Instrumentos ópticos simples e o olho humano

6.1 Câmera escura e câmara fotográfica

A **câmara fotográfica** moderna substitui o orifício por uma **lente convergente** e o anteparo por filme ou **sensor**. A imagem formada é **real, invertida e menor** (objeto além de 2f), e a nitidez é ajustada **variando a distância lente-sensor** (foco). O **diafragma** controla a quantidade de luz que entra; o **obturador**, o tempo de exposição.

6.2 Lupa (microscópio simples)

A **lupa** é uma lente convergente usada com o objeto entre o **foco e o centro óptico** ($p < f$): a imagem é **virtual, direita e ampliada**.

Para especificar a ampliação, usa-se a **distância mínima de visão distinta**, $D \approx$ **25 cm** (ponto próximo do olho normal).

- **Imagem formada no infinito** (olho relaxado): $\mathbf{A = D / f}$.
- **Imagem formada no ponto próximo** (25 cm da lente): $\mathbf{A = 1 + D / f}$ (ampliação máxima).

> **Exemplo 26.** Lupa de f = 5 cm. Com a imagem no ponto próximo, A = 1 + 25/5 = **6**; com a imagem no infinito, A = 25/5 = **5**. Verificação para A = 6: p' = –25 cm; 1/5 = 1/p – 1/25 → p = 25/6 ≈ 4,17 cm; A = 25/4,17 = 6.

Quanto **menor** a distância focal, **maior** o aumento.

6.3 Microscópio composto

Formado por duas lentes convergentes: a **objetiva** (de pequena distância focal, perto do objeto) e a **ocular** (que funciona como lupa). O objeto fica um pouco além do foco da objetiva, que dá uma **imagem real, invertida e ampliada**; essa imagem fica **entre a ocular e seu foco**, e a ocular fornece a **imagem final virtual, ampliada** (invertida em relação ao objeto).

- **Ampliação total: $\mathbf{A = A_{objetiva} \times A_{ocular}}$** (em módulo).

> **Exemplo 27.** Objetiva com f = 1,0 cm e objeto a 1,1 cm: 1/p' = 1/1 – 1/1,1 = 0,0909 → p' = 11 cm, |A_obj| = 11/1,1 = **10**. Ocular de f = 5 cm com imagem final no infinito: A_oc = 25/5 = **5**. Total: 10 × 5 = **50×**.

6.4 Luneta e telescópio

Instrumentos para observar objetos **distantes**, que parecem pequenos pelo pequeno ângulo de visão. A **luneta astronômica** (refratora) tem objetiva e ocular convergentes.

- A objetiva (grande distância focal f_{ob}) forma uma **imagem real, invertida e reduzida** do objeto distante no seu foco.
- Esta imagem fica no foco da ocular (f_{oc}), que a amplia (imagem final virtual no infinito).
- **Aumento angular: $\mathbf{G = f_{ob} / f_{oc}}$.**
- **Comprimento da luneta** (imagem final no infinito): $\mathbf{L = f_{ob} + f_{oc}}$.

> **Exemplo 28.** f_ob = 100 cm e f_oc = 5 cm: G = 100/5 = **20×**; L = 105 cm.

Tipos: **luneta terrestre** (com lentes que endireitam a imagem), **luneta de Galileu** (ocular divergente, imagem direita) e **telescópio refletor** (de Newton), em que a objetiva é um **espelho côncavo**, o que evita defeitos das lentes e permite grandes diâmetros. O poder de captar luz depende do diâmetro da objetiva.

6.5 Projetor

Uma lente convergente com o objeto (slide, filme) **entre F e 2F** produz imagem **real, invertida e ampliada** sobre a tela; por isso o slide é colocado de cabeça para baixo.

6.6 O olho humano

Estrutura	Função
Córnea	superfície externa transparente; é onde ocorre a **maior parte** da convergência do olho
Pupila / íris	a pupila é a abertura; a íris (colorida) regula seu diâmetro, controlando a luz que entra
Cristalino	lente convergente **de foco variável**; muda de curvatura (acomodação) para focalizar
Retina	tela onde se forma a imagem **real, invertida e menor**; tem **cones** (visão em cores, luz intensa) e **bastonetes** (luz fraca, sem cores)
Nervo óptico	leva a informação ao cérebro, que "desinverte" a imagem

O olho normal (emétrope) forma na retina a imagem de objetos distantes com o músculo ciliar **relaxado** (cristalino menos curvo). Para objetos próximos, o músculo ciliar **contrai** e o cristalino fica mais curvo (mais convergente): é a **acomodação visual**.

- **Ponto remoto:** maior distância de visão nítida. No olho normal, o **infinito**.
- **Ponto próximo:** menor distância de visão nítida. No olho normal, **≈ 25 cm**.

6.7 Defeitos da visão e correção

Defeito	O que ocorre	Imagem se forma...	Correção
Miopia	globo ocular "longo" ou cristalino convergente demais; ponto remoto **finito**	**antes** da retina	lente **divergente**
Hipermetropia	globo "curto" ou cristalino fraco; ponto próximo **distante**	**depois** da retina	lente **convergente**
Presbiopia ("vista cansada")	cristalino perde elasticidade com a idade; ponto próximo se afasta	–	lente **convergente** (para perto); lentes bifocais
Astigmatismo	córnea com curvatura irregular (não esférica)	foco diferente em eixos diferentes	lente **cilíndrica**

Cálculo da correção da miopia. A lente deve fornecer, para objetos no infinito, uma imagem **virtual no ponto remoto** do míope. Assim p = ∞, p' = –(ponto remoto), e f = –d_PR.

> **Exemplo 29.** Um míope só enxerga com nitidez até 50 cm. Que lente corrige? (lente colada ao olho) 1/f = 1/∞ + 1/(–0,50) → f = **–0,50 m**, V = **–2,0 di** (divergente).

Cálculo da correção da hipermetropia. A lente deve dar, para um objeto à distância de leitura (25 cm), uma imagem virtual no **ponto próximo** do hipermétrope.

> **Exemplo 30.** O ponto próximo de um hipermétrope é 50 cm. Que lente permite ler a 25 cm? p = 25 cm, p' = –50 cm: 1/f = 1/25 – 1/50 = 1/50 → f = **+50 cm**, V = **+2,0 di** (convergente).
>
> **Macete:** míope **não vê de longe**, usa lente **divergente (grau negativo)**. Hipermetrope e presbíope **não veem de perto**, usam **convergente (grau positivo)**. A lente corretora forma, no ponto que o olho consegue ver, uma **imagem virtual** do objeto que ele quer ver.

6.8 Comparando câmera e olho

Câmera	Olho
lente (objetiva)	córnea + cristalino
diafragma	íris / pupila
sensor ou filme	retina
foco: mover a lente	foco: variar a curvatura do cristalino
imagem real, invertida, menor	imagem real, invertida, menor

7. Pegadinhas e revisão relâmpago

1. **Ângulo de incidência e reflexão** sempre se medem em relação à **normal**, nunca à superfície.
2. Espelho plano: imagem **virtual, direita, igual e enantiomorfa**; distância do objeto ao espelho = distância da imagem ao espelho.
3. Rotação do espelho de α → raio refletido gira **2α**. Imagens em dois espelhos planos: **360°/θ – 1**.
4. **f = R/2**; côncavo f > 0, convexo f < 0. Convexo: imagem **sempre** virtual, direita e menor.
5. Côncavo: objeto **além de F** → imagem real e invertida; **entre F e V** → virtual, direita, maior.
6. **Equação de Gauss:** 1/f = 1/p + 1/p'; **A = –p'/p**. Substitua os sinais **com cuidado**: erro de sinal é a causa nº 1 de erros em prova.
7. Na refração: **frequência constante**; mudam v e λ. n = c/v ≥ 1.
8. **Snell:** n_1 sen θ_1 = n_2 sen θ_2. Meio mais refringente → raio mais próximo da normal.
9. **Reflexão total:** só do meio **mais** para o **menos** refringente **e** com θ > L; **sen L = n_menor/n_maior**.
10. **Dioptro plano:** p'/p = n_obs/n_obj; peixe visto de cima parece mais raso.
11. Lente de **bordas finas** é convergente **se n_lente > n_meio**; invertendo, é divergente.
12. **Vergência V = 1/f** em dioptrias (f em metros); justapostas somam. Miopia → V < 0; hipermetropia → V > 0.
13. Lupa: **A = 1 + 25/f** (imagem a 25 cm). Luneta: **G = f_ob/f_oc**. Microscópio: **A = A_ob · A_oc**.
14. Imagem **real** = raios que se cruzam de fato (pode ser projetada na tela); **virtual** = prolongamentos (não projetável).

Fontes e método.
Conteúdo didático padrão de Física do ensino médio e vestibular (óptica geométrica), elaborado pelo MentorIA com texto, tabelas e exemplos próprios. As convenções de sinais seguem a de Gauss, usada nos livros-texto de ensino médio. Índices de refração e demais constantes são valores usuais de tabela. Todos os exemplos numéricos foram conferidos por cálculo (Python) em 08/10/2026.