

Практическая работа № 3

Валерий Сергеевич Верхотуров БСБО-05-20

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

def multiplicative_method(a = 22_695_47, b = 1, m = 2 ** 64 - 1, x = 0):
    while True:
        if m > 2 ** 32:
            m = m % 2 ** 32
        else:
            break
    assert 0 <= a < m
    assert 0 <= b < m
    assert m >= 2
    assert 0 <= x < m
    while True:
        x = (a * x + b) % m
        yield x / m
```

Задание 1

Создать функцию, описывающую распределение плотности вероятности для нормального закона распределения случайной величины. Построить графики плотности вероятности нормального закона с заданными значениями математического ожидания M и среднеквадратического отклонения σ : $M = 10$ и $\sigma = 2$, $M = 10$ и $\sigma = 1$, $M = 10$ и $\sigma = 0.5$, $M = 12$ и $\sigma = 1$.

```
# def task_1_normal_distribution(x, mean, sigma):
#     return 1 / (sigma * np.sqrt(2 * np.pi)) * np.exp(-0.5 * ((x - mean) / sigma) ** 2)

def task_1_plot_normal_distribution(mean, sigma):
    x = np.linspace(0, 20, 500)
    plt.plot(x, norm.pdf(x, loc = mean, scale = sigma),
             label=f'$M = {mean}$, $\sigma = {sigma}$')
    plt.legend()
    plt.grid(True)
    plt.ylabel('Probably density')


def task_1():
    input_data = [
        (10, 2),
        (10, 1),
        (10, 0.5),
        (12, 1)
```

```

]
for mean, sigma in input_data:
    task_1_plot_normal_distribution(mean, sigma)
plt.show()

task_1()

```



Задание 2

Описать функцию распределения для нормального закона с параметрами $M = 10$ и $\sigma = 2$ и построить ее график на интервале от 0 до 20.

```


def task_2_cdf(mean, sigma, start_x, end_x):
    x = np.linspace(start_x, end_x, 500)
    y = norm.cdf(x, mean, sigma)
    plt.plot(x, y)
    plt.ylabel('Cumulative distribution')
    plt.grid(True)

def task_2():
    mean = 10
    sigma = 2
    start_x = 0
    end_x = 20

```

```
task_2_cdf(mean, sigma, start_x, end_x)
plt.show()
```

task_2()



Задания 3, 4

Для получения функции распределения провести моделирование нормального закона распределения с помощью метода обратной функции. Для моделирования равномерно распределенной величины использовать `multiplicative_method`. Для предоставления обратной функции использовать кусочно-линейную аппроксимацию для 100 равномерных участков в интервале от 0 до 20. Число экспериментов для моделирования принять равным $N = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$.

Построить гистограммы для полученной последовательности случайных чисел на 100 интервалах и для числа экспериментов $N = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$.

```
def task_3():
    mean = 10
    sigma = 2
    start_x = 0
    end_x = 20
    experiments = [10 ** 3, 10 ** 4, 10 ** 5, 10 ** 6]
```

```

multiplicative_generator = multiplicative_method(x=2)
for experiment in experiments:
    y = norm.ppf(
        [next(multiplicative_generator) for _ in range(experiment)],
        mean,
        sigma)

    plt.hist(y, bins=100, density=True, label=f'N = {experiment}')
plt.legend()
plt.ylabel('Percent points')
plt.grid(True)
plt.show()

```

task_3()

