

ASSIGNMENT 1

Valli Devi Bolla

Download all python codes from

<https://github.com/Vallidevibolla/bolla/blob/main/Collinear.py>

and latex-tikz codes from

<https://github.com/Vallidevibolla/bolla/blob/main/main.tex>

1 QUESTION No.14

Find the value of k , if the points $\begin{pmatrix} k \\ 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix}$ and $\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ are collinear.

2 SOLUTION

Let

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} k \\ 3 \end{pmatrix} \quad (2.0.1)$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (2.0.2)$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (2.0.3)$$

As, given that the points are collinear,

$$\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -3 & 4 \\ k & 3 \end{pmatrix} \quad (2.0.4)$$

$$\begin{pmatrix} k-6 & 3-(-2) \\ 6-(-3) & -2-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} k-6 & 5 \\ 9 & -6 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{(R_2 \rightarrow R_1)} \quad (2.0.5)$$

$$\begin{pmatrix} 9 & -6 \\ k-6 & 5 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{(R_1/3)} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ k-6 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 3 \times 5 - (-2 \times (k-6)) \end{pmatrix} \quad (2.0.6)$$

$$\Rightarrow 15 + 2K - 12 = 0 \quad (2.0.7)$$

$$\Rightarrow K = -3/2 \quad (2.0.8)$$

\therefore Finally the value of k is $-\frac{3}{2}$




Fig. 0: collinear