

Clase 06 Análisis de varianza

Curso Introducción al Análisis de datos con R para la
Acuicultura.

Dr. José Gallardo Matus

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

22 July 2022

1.- Introducción


- ▶ ¿Qué es un análisis de varianza?.
- ▶ Modelos lineales en Anova.
- ▶ Hipótesis y supuestos.
- ▶ Interpretar resultados de análisis de varianza con R.

2.- Práctica con R y Rstudio cloud

- ▶ Realizar pruebas de hipótesis: Anova y posteriores.
- ▶ Realizar gráficas avanzadas con ggplot2.
- ▶ Elaborar reporte dinámico en formato html.

¿Qué es el análisis de varianza?


Herramienta básica para analizar el efecto de uno o más factores (cada uno con dos o más niveles) en un experimento.



PROBLEMA DE LAS COMPARACIONES MÚLTIPLES

¿Por qué preferir anova y no múltiples t-test?

Porque con una t-test normal al aumentar el número de comparaciones múltiples se incrementa la tasa de error tipo I.



Fuente[1]: [1]:doi:10.21037/jtd.2017.05.34

ANOVA: MODELOS LINEALES

Una forma muy conveniente de representar una ANOVA es mediante un modelo lineal.

Modelo lineal para ANOVA de una vía

$$y \sim \mu + \alpha + \epsilon$$

Modelo lineal para ANOVA de dos vías

$$y \sim \mu + \alpha + \beta + \epsilon$$

Modelo lineal para ANOVA de dos vías con interacción

$$y \sim \mu + \alpha + \beta + \alpha*\beta + \epsilon$$

ANOVA: HIPÓTESIS

Hipótesis factor 1

$$H_0 : \alpha_{1.1} = \alpha_{1.2} = \alpha_{1.3}$$

Hipótesis factor 2

$$H_0 : \beta_{2.1} = \beta_{2.2} = \beta_{2.3}$$

Hipótesis interacción

$$H_0 : \alpha^*\beta = 0$$

Hipótesis Alternativa

H_A : No todas las medias son iguales


ANOVA PARA COMPARAR MEDIAS

Si el test compara medias ¿Por qué se llama ANOVA?

Por que el estadístico **F** es un cociente de varianzas.

$$F = \frac{\sigma^2_{\text{entregupos}}}{\sigma^2_{\text{dentrogrupos}}}$$

Mientras mayor es el estadístico **F**, más es la diferencia de medias entre grupos.



SUPUESTOS DE UNA ANOVA

1. Independencia de las observaciones.
2. Normalidad.
3. Homocedasticidad: homogeneidad de las varianzas.

TEST POSTERIORES (PRUEBAS A POSTERIORI)

¿Para qué sirven?

Para identificar que pares de niveles de uno o más factores son significativamente distintos entre sí.


¿Cuándo usarlos?

Sólo cuando se rechaza H_0 del ANOVA.

Tukey test

Es uno de los más usados, similar al *t-test*, pero corrige la tasa de error por el número de comparaciones.

ESTUDIO DE CASO: TRUCHA ARCOIRIS



ANOVA DE UNA VÍA

```
res.aov <- lm(Peso ~ Dietas, data = my_data)
anova(res.aov)
```

```
## Analysis of Variance Table
```

```
##
```

```
## Response: Peso
```

```
##           Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
```

```
## Dietas      2   3.7663   1.8832   4.8461 0.01591 *
```

```
## Residuals 27 10.4921   0.3886
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1
```


COMPARACIONES MULTIPLES

```
fit_anova <- aov(res.aov)
tk <- TukeyHSD(fit_anova)
```

Table 1: Prueba de Tukey.

Trat.	Contraste	H0	Diferencia	IC-bajo	IC-alto	p-ajustado
Dietas	trt1-ctrl	0	-0.37	-1.06	0.32	0.39
Dietas	trt2-ctrl	0	0.49	-0.20	1.19	0.20
Dietas	trt2-trt1	0	0.86	0.17	1.56	0.01

ESTUDIO DE CASO: TILAPIA



ANOVA DOS VIAS CON INTERACCIÓN

```
res.aov2 <- lm(Peso ~ Temperatura * Salinidad, data =  
my_data1)  
anova(res.aov2)
```

Analysis of Variance Table

Response: Peso

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)	
Temperatura	2	2426.43	1213.22	92.000	< 2.2e-16	***
Salinidad	1	205.35	205.35	15.572	0.0002312	***
Temperatura:Salinidad	2	108.32	54.16	4.107	0.0218603	*
Residuals	54	712.11	13.19			

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

- ▶ El trabajo práctico se realiza en Rstudio.cloud.

Guía 06 Anova y posteriores

RESUMEN DE LA CLASE

- ▶ **Elaborar hipótesis de anova.**
- ▶ **Realizar análisis de varianza.**
 - ▶ 1 factor.
 - ▶ 2 factores.
 - ▶ pruebas *a posteriori*.
- ▶ **Realizar gráficas avanzadas con ggplot2**