

# Clase 10 - Análisis de sobrevivencia

## Curso Análisis de datos con R para Biociencias

Dr. José A. Gallardo. [jose.gallardo@pucv.cl](mailto:jose.gallardo@pucv.cl) | Pontificia  
Universidad Católica de Valparaíso

28 January 2022

# PLAN DE LA CLASE

## 1.- Introducción


- ▶ Qué son los análisis de sobrevivencia?
- ▶ Método de Kaplan-Meier.
- ▶ Test estadístico.
- ▶ Estudios de caso
- ▶ Interpretación pruebas con R

## 2.- Práctica con R y Rstudio cloud.

- ▶ Realizar análisis de sobrevivencia.
- ▶ Realizar gráficas avanzadas con ggplot2.
- ▶ Elaborar un reporte dinámico en formato PPT.

# ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA

Conjunto de herramientas estadísticas No paramétricas utilizadas para analizar la probabilidad de que un evento (muerte/falla) ocurra en un determinado Tiempo.




# CONCEPTOS RELEVANTES

Variables respuesta: Tiempo de supervivencia y Estado (0 - 1).



# CONCEPTOS RELEVANTES: DATOS SENSORADOS

- ▶ Los organismos pueden entrar en diferentes tiempos al estudio.
- ▶ El evento puede ocurrir después de finalizar el estudio (Sensurar datos).




Ind.	Tiempo	Estado
1	40	1
2		
3		
4	40	0
5		
6		
7		
8		

X = evento

● = Censura

# EJEMPLO SET DE DATOS



<u>Ind.</u>	Tiempo	Estado
1	40	1
2	10	1
3	10	1
4	40	0
5	60	0
6	40	0
7	30	1
8	10	1

X = evento

● = Censura

# MÉTODO DE KAPLAN - MEIER


El método de Kaplan-Meier es un método no paramétrico que estima las probabilidades de supervivencia  $S(t)$  en los instantes en los que ha ocurrido el evento.

$$\hat{S}(t) = \prod_{t < t_1} \frac{n_i - d_i}{n_i}$$

$d_i$ , el número de muertes en el momento  $t_i$

$n_i$ , el número de sujetos en riesgo justo antes de  $t_i$ .

# CALCULAR PROBABILIDAD KM




Tiempo	<u>Prob. sobrevivir</u>	Estimador K-M
0	5/5 = 1	1
10	4/6 = 0,66	0,66
20	5/6 = 0,83	0,54
30	4/5 = 0,80	0,43
40		
50		
60		

$$\hat{S}(t) = \prod_{t_i < t} \frac{n_i - d_i}{n_i}$$




# CALCULAR PROBABILIDAD KM



Tiempo	Prob. sobrevivir	Estimador K-M
0	$5/5 = 1$	1,00
10	$4/6 = 0,66$	0,66
20	$5/6 = 0,83$	0,54
30	$4/5 = 0,80$	0,43
40	$3/4 = 0,75$	0,32
50	$3/3 = 1$	0,32
60	$3/3 = 1$	0,32

# GRÁFICA DE SOBREVIVENCIA.



T	K-M
0	1,00
10	0,66
20	0,54
30	0,43
40	0,32
50	0,32
60	0,32

# PRUEBA ESTADÍSTICA PARA COMPARAR TRATAMIENTOS

Test estadístico no paramétrico Log rank test.

$$G = 2 \sum_i O_i \ln \frac{O_i}{E_i}$$

## Hipótesis

**H<sub>0</sub>**: No existen diferencias entre los grupos en la probabilidad de que ocurra un evento (muerte) en ningún tiempo.

**H<sub>1</sub>**: Existen diferencias entre los grupos en la probabilidad de que ocurra un evento (muerte) en algún tiempo.

	Grupo 1	Grupo 2
Evento	Prob. KM A	Prob. KM C
Sensura	Prob. KM B	Prob. KM D

Fuente: The log rank test

# PRÁCTICA ANÁLISIS DE DATOS

- ▶ Guía de trabajo práctico disponible en drive y Rstudio.cloud.
- ▶ El trabajo práctico se realiza en Rstudio.cloud.

# RESUMEN DE LA CLASE

- ▶ Revisión de análisis de supervivencia y tiempos de vida media o falla.
- ▶ Cálculo de probabilidad mediante método de Kaplan- Meier.
- ▶ Ejecutamos e interpretamos resultados test de supervivencia con R.