

CLASE 02 - VARIABLES ALEATORIAS CUANTITATIVAS

Curso Análisis de Datos con R para Biociencias.

Dr. José Gallardo Matus | <https://genomics.pucv.cl/>

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

12 January 2023

PLAN DE LA CLASE

1. Introducción

- ▶ Diferencia entre variable, variable aleatoria, datos y factores.
- ▶ Clasificación de variables aleatorias.
- ▶ Observar variables cuantitativas continuas y discretas.
- ▶ Importar datos a R: recomendaciones.

2. Práctica con R y Rstudio cloud

- ▶ Elaborar un script de R.
- ▶ Importar datos desde excel.
- ▶ Observar variable aleatoria con distribución Normal, Bernoulli y Binomial.


VARIABLE Y VARIABLE ALEATORIA

1. **Variable:** Características que se pueden medir u observar en un individuo o en un ambiente: peso, temperatura, Sexo, pH, Tipo de bacteria, abundancia, número de alelos, absorvancia.
2. **Variable aleatoria:** es un número que representa el resultado de un experimento aleatorio. Depende entonces de una función matemática o distribución de probabilidad.

DATOS Y FACTORES

- 3. Datos u observaciones:** Son los valores o niveles que puede tomar una variable aleatoria: 25 gramos, 55 mm, 13°C, 7 unidades de pH, 25 bacterias, 2 alelos, 32 semillas, vivo/muerto, macho/hembra, sano/enfermo, leve/moderado/severo.
- 4. Factor:** Usado para identificar tratamientos de un experimento o variables de clasificación. Se usan como *variables independientes o predictoras*, es decir tienen un efecto sobre una *variable respuesta o dependiente*. Ej. Sexo (niveles: macho o hembra) tiene un efecto sobre nivel de hormonas.


CLASIFICACIÓN DE VARIABLES



VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

Definición: Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo (a,b) , (a,Inf) , $(-\text{Inf},b)$, $(-\text{Inf},\text{Inf})$ y la probabilidad que toma cualquier punto es 0, debido a que existe un número infinito de posibilidades.



- ▶ Cantidad de anticuerpos.
- ▶ Diámetro o longitud de un individuo.
- ▶ Biomasa cosechada.



OBSERVAR VARIABLE CONTINUA


Al observar con un histograma notamos que:

1. La frecuencia o probabilidad en un intervalo es distinta de cero.
2. Cuando aumenta el **n** muestral se perfila una distribución llamada **normal**.



BOXPLOT VARIABLE CONTINUA

Las gráficas de cajas y bigotes son muy adecuadas para observar variables aleatorias continuas.



VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS


Las variables aleatorias discretas son aquellas que presentan un número contable de valores; por ejemplo:

- ▶ **Número de mutaciones** (1, 3, 5, 6, etc.).
- ▶ **Número de bacterias.**
- ▶ **Número de nucleótidos similares entre dos secuencias.**
- ▶ **Número de semillas de una fruta.**

BOXPLOT VARIABLE DISCRETA

Propiedades básicas y los box-plots

Cuartil, Rango intercuartílico




VARIABLE DISCRETA: DISTRIBUCIÓN BERNOULLI

Se realiza una prueba aleatoria de COVID-19 en los pasajeros de un avión (160 pasajeros en total) determinando que 8 de ellos son positivos. Sea $X=1$ si la persona tiene PCR+ y $X=0$ en el caso de que el PRC-. ¿Cuál es la distribución de X ? $8/160 = \text{éxito}$, $152/160 = \text{fracaso}$.

	Fracaso	Éxito
x	0	1
$f(x)$	$1-p$	p
$P(X=x)$	0.95	0.05

EJEMPLO DISTRIBUCIÓN BERNOULLI


Representación en un histograma de la frecuencia de recuperados y fallecidos.



VARIABLE DISCRETA: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

- ▶ Cuando se realizan n pruebas de Bernoulli sucesivas e independientes, la variable aleatoria discreta X se denomina variable binomial.
- ▶ $X =$ “número de veces que ocurre el suceso éxito en n pruebas”.
- ▶ La mayoría de las variables discretas muestran distribución binomial.
- ▶ La mejor manera de representarlas una variable discreta es con gráficas de barra **barplot()**.

EJEMPLO DISTRIBUCIÓN BINOMIAL



IDENTIFICA CORRECTAMENTE TU VARIABLE

- ▶ Es importante identificar la naturaleza que tiene nuestra variable en estudio, y así evitar errores en los análisis estadísticos que llevemos a cabo.
- ▶ Usualmente cuando las variables en estudio son conteos, proporciones o binarias (éxito o fracaso, macho o hembra, sano o enfermo) deben ser consideradas como **variables aleatorias discretas**.
- ▶ Según sea la variable aleatoria discreta, ella tendrá una función de distribución de probabilidad asociada que **NO** es normal. Por ejemplo: **Bernoulli, Binomial, Binomial Negativa, Poisson, entre otras**.
- ▶ En gran parte, la *distribución de variables aleatorias discretas* suelen ser **asimétricas a derecha o a izquierda**.

FORMATO CORRECTO PARA IMPORTAR A R

	A	B	C	D	E	F
1	sample_id	Weight	sex			
2	1	17,2	female			
3	2	18,8	female			
4	3	27,8	male			
5	4	20,4	male			
6	5	20,6	male			
7	6	28,6	male			
8	7	22,3	male			
9	8	13,7	female			
10	9	16,6	female			
11	10	17,8	female			
12	11	26,1	female			
13	12	21,8	male			
14	13	22	male			
15	14	20,6	male			
16	15	17,2	female			
17	16	28,9	male			
18	17	22,5	male			
19	18	10,2	female			
20	19	23,5	male			
21	20	17,6	female			
22	21	14,7	female			
23	22	18,9	female			
24	23	14,9	female			
25	24	16,4	female			
26	25	16,9	female			
27	26	11,6	female			

Nombres de
variables

Observaciones
o datos

Figure 1: Formato correcto de archivo excel para que sea importado a R

ERRORES EN FORMATO EXCEL




Figure 2: Errores comunes antes de importar a excel

Importante: No colocar símbolos matemáticos por ejemplo (%,\$,+) como nombres de las (**variables**).

ERRORES EN FORMATO EXCEL 2

sample_id	Weight	sex		sample_id	Weight	sex	Observaciones
1	17,2	female		1	17,2	female	
2	18,8	female		2	18,8	female	
3	27,8	male		3	27,8	male	
4	20,4	male		4	20,4	male	
5	20,6	male		5	20,6	male	
6	28,6	male		6	28,6	male	
7	sin registro	male		7		male	
8	13,7	female		8	13,7	female	
9	16,6	female		9	16,6	female	
10	17,8	female		10	17,8	female	
11	26,1	male		11	26,1	male	
12	21,8	male		12	21,8	male	
13	22	Indeterminado		13	22	NA	Sexo Indeterminado
14	20,6	male		14	20,6	male	
15	17,2	female		15	17,2	female	
16	28,9	male		16	28,9	male	
17	22,5, cola deforme	male		17	22,5	male	cola deforme
18	10,2	female		18	10,2	female	
19	23,5	male		19	23,5	male	

Figure 3: Errores comunes antes de importar a excel

Importante: No colocar comentarios en las celdas de datos. Dejar celdas vacias o usar el simbolo *NA* es preferido cuando hay datos faltantes.

COMO IMPORTAR DATOS A R

```
library(readr)
mouse <- read_csv("datos.csv", col_names = TRUE)

## Rows: 100 Columns: 4

## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (1): Sexo
## dbl (3): Animal, Talla, Peso

##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE`
```

PRÁCTICA VARIABLES ALEATORIAS

Guía de trabajo programación con R en Rstudio.cloud.



0. RUN



1. STUDY



3. SHARE



4. IMPROVE

RESUMEN DE LA CLASE

- ▶ Identificamos y clasificamos variables.
- ▶ Observamos distribución normal de una variable cuantitativa continua usando histograma y boxplot.
- ▶ Reconocemos variables aleatorias discretas y algunas distribuciones de probabilidad asociadas (Bernoulli y Binomial).
- ▶ Importamos datos a R usando diferentes paquetes (utils, readr y readxl) y formatos (txt, csv y excel).