

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №4

З дисципліни

«Методи оптимізації та планування експерименту»

На тему:

**«Проведення трьохфакторного експерименту
при використанні рівняння регресії з урахуванням ефекту
взаємодії»**

ВИКОНАВ:
Студент II курсу ФІОТ
Групи ІО-93
Камінський Є.О. – 9314
Номер в списку: 12

ПЕРЕВІРИВ:
ас. Регіда П.Г.

Київ 2021 р.

Мета:

Провести повний трьохфакторний експеримент. Знайти рівняння регресії адекватне об'єкту.

Варіант завдання:

Варіант	X ₁		X ₂		X ₃	
	min	max	min	max	min	max
312	10	60	-30	45	-30	45

$$X_{\text{cp min}} = (10 - 30 - 30) / 3 = -16.67$$

$$X_{\text{cp max}} = (60 + 45 + 45) / 3 = 50 = 50$$

$$Y_{\text{imin}} = 200 - 16.67 = 183.33$$

$$Y_{\text{imax}} = 200 + 50 = 250$$

Роздруківка коду програми:

```
import random, math
import numpy as np
from scipy.stats import f, t
from functools import partial

m = 3
N = 8
x1min, x2min, x3min = 10, -30, -30
x1max, x2max, x3max = 60, 45, 45

X_max = [x1max, x2max, x3max]
X_min = [x1min, x2min, x3min]

x_av_min = (x1min + x2min + x3min) / 3
x_av_max = (x1max + x2max + x3max) / 3
Y_max = int(round(200 + x_av_max, 0))
Y_min = int(round(200 + x_av_min, 0))
X0 = 1

X_matr = [
    [-1, -1, -1],
    [-1, -1, 1],
    [-1, 1, -1],
    [-1, 1, 1],
    [1, -1, -1],
    [1, -1, 1],
    [1, 1, -1],
    [1, 1, 1]
]

x_for_beta = [
    [1, -1, -1, -1],
    [1, -1, -1, 1],
    [1, -1, 1, -1],
    [1, -1, 1, 1],
    [1, 1, -1, -1],
    [1, 1, -1, 1],
    [1, 1, 1, -1],
    [1, 1, 1, 1]
]

x_12_13_23 = [
    [1, 1, 1],
```

```

        [1, -1, -1],
        [-1, 1, -1],
        [-1, -1, 1],
        [-1, -1, 1],
        [-1, 1, -1],
        [1, -1, -1],
        [1, 1, 1],
    ]
    x_123 = [
        -1,
        1,
        1,
        -1,
        1,
        -1,
        -1,
        1
    ]
    X_matr_natur = [
        [10, -70, 60],
        [10, -70, 70],
        [10, -10, 60],
        [10, -10, 70],
        [60, -70, 60],
        [60, -70, 70],
        [60, -10, 60],
        [60, -10, 70],
    ]
    x_12_13_23_natur = [[X_matr_natur[j][0] * X_matr_natur[j][1], X_matr_natur[j][0] *
X_matr_natur[j][2],
        X_matr_natur[j][1] * X_matr_natur[j][2]] for j in range(N)]
    x_123_natur = [X_matr_natur[j][0] * X_matr_natur[j][1] * X_matr_natur[j][2] for j in
range(N)]

    flag = False
    while not flag:
        Y_matr = [[random.randint((Y_min), (Y_max)) for i in range(m)] for j in range(N)]

        Y_average = [sum(j) / m for j in Y_matr]

        results_nat = [
            sum(Y_average),
            sum([Y_average[j] * X_matr_natur[j][0] for j in range(N)]),
            sum([Y_average[j] * X_matr_natur[j][1] for j in range(N)]),
            sum([Y_average[j] * X_matr_natur[j][2] for j in range(N)]),
            sum([Y_average[j] * x_12_13_23_natur[j][0] for j in range(N)]),
            sum([Y_average[j] * x_12_13_23_natur[j][1] for j in range(N)]),
            sum([Y_average[j] * x_12_13_23_natur[j][2] for j in range(N)]),
            sum([Y_average[j] * x_123_natur[j] for j in range(N)]),
        ]

        mj0 = [N,
            sum([X_matr_natur[j][0] for j in range(N)]),
            sum([X_matr_natur[j][1] for j in range(N)]),
            sum([X_matr_natur[j][2] for j in range(N)]),
            sum([x_12_13_23_natur[j][0] for j in range(N)]),
            sum([x_12_13_23_natur[j][1] for j in range(N)]),
            sum([x_12_13_23_natur[j][2] for j in range(N)]),
            sum([x_123_natur[j] for j in range(N)]),
        ]
        mj1 = [sum([X_matr_natur[j][0] for j in range(N)]),

```

```

sum([X_matr_natur[j][0] ** 2 for j in range(N)]),
sum([x_12_13_23_natur[j][0] for j in range(N)]),
sum([x_12_13_23_natur[j][1] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][0] ** 2) * X_matr_natur[j][1] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][0] ** 2) * X_matr_natur[j][2] for j in range(N)]),
sum([x_123_natur[j] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][0] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][2] for j in
range(N)]),
]
mj2 = [sum([X_matr_natur[j][1] for j in range(N)]),
sum([x_12_13_23_natur[j][0] for j in range(N)]),
sum([X_matr_natur[j][1] ** 2 for j in range(N)]),
sum([x_12_13_23_natur[j][2] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][1] ** 2) * X_matr_natur[j][0] for j in range(N)]),
sum([x_123_natur[j] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][1] ** 2) * X_matr_natur[j][2] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][1] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][1] for j in
range(N)]),
]
mj3 = [sum([X_matr_natur[j][2] for j in range(N)]),
sum([x_12_13_23_natur[j][1] for j in range(N)]),
sum([x_12_13_23_natur[j][2] for j in range(N)]),
sum([X_matr_natur[j][2] ** 2 for j in range(N)]),
sum([x_123_natur[j] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][2] ** 2) * X_matr_natur[j][0] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][2] ** 2) * X_matr_natur[j][1] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][2] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][0] for j in
range(N)]),
]
mj4 = [sum([x_12_13_23_natur[j][0] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][0] ** 2) * X_matr_natur[j][1] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][1] ** 2) * X_matr_natur[j][0] for j in range(N)]),
sum([x_123_natur[j] for j in range(N)]),
sum([x_12_13_23_natur[j][0] ** 2 for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][0] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][2] for j in
range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][1] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][1] for j in
range(N)]),
sum([(x_12_13_23_natur[j][0] ** 2) * X_matr_natur[j][2] for j in
range(N)]),
]
mj5 = [sum([x_12_13_23_natur[j][1] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][0] ** 2) * X_matr_natur[j][2] for j in range(N)]),
sum([x_123_natur[j] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][2] ** 2) * X_matr_natur[j][0] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][0] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][2] for j in
range(N)]),
sum([x_12_13_23_natur[j][1] ** 2 for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][2] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][0] for j in
range(N)]),
sum([(x_12_13_23_natur[j][1] ** 2) * X_matr_natur[j][1] for j in
range(N)]),
]
mj6 = [sum([x_12_13_23_natur[j][2] for j in range(N)]),
sum([x_123_natur[j] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][1] ** 2) * X_matr_natur[j][2] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][2] ** 2) * X_matr_natur[j][1] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][1] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][1] for j in
range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][2] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][0] for j in
range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][2] ** 2) * X_matr_natur[j][1] for j in range(N)]),

```

```

        sum([(x_12_13_23_natur[j][2] ** 2) * X_matr_natur[j][0] for j in
range(N)]),
    ]
    mj7 = [sum([x_123_natur[j] for j in range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][0] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][2] for j in
range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][1] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][1] for j in
range(N)]),
sum([(X_matr_natur[j][2] ** 2) * x_12_13_23_natur[j][0] for j in
range(N)]),
sum([(x_12_13_23_natur[j][0] ** 2) * X_matr_natur[j][2] for j in
range(N)]),
sum([(x_12_13_23_natur[j][1] ** 2) * X_matr_natur[j][1] for j in
range(N)]),
sum([(x_12_13_23_natur[j][2] ** 2) * X_matr_natur[j][0] for j in
range(N)]),
sum([x_123_natur[j] ** 2 for j in range(N)])
    ]

    B_nat1 = np.linalg.solve([mj0, mj1, mj2, mj3, mj4, mj5, mj6, mj7], results_nat)
# list of B's
    B_nat = list(B_nat1)

    B_norm = [
        sum(Y_average) / N,
        sum([Y_average[j] * X_matr[j][0] for j in range(N)]) / N,
        sum([Y_average[j] * X_matr[j][1] for j in range(N)]) / N,
        sum([Y_average[j] * X_matr[j][2] for j in range(N)]) / N,
        sum([Y_average[j] * x_12_13_23[j][0] for j in range(N)]) / N,
        sum([Y_average[j] * x_12_13_23[j][1] for j in range(N)]) / N,
        sum([Y_average[j] * x_12_13_23[j][2] for j in range(N)]) / N,
        sum([Y_average[j] * x_123[j] for j in range(N)]) / N,
    ]

    print("Матриця планування експерименту:")
    print("N " + "x1 " + "x2 " + "x3 " + "Y1" + " " * 8 + "Y2" + " " * 8 +
"Y3")
    for i in range(N):
        print("{0:=d} {1:=4d} {2:=3d} {3:=3d} {4:=9.5f} {5:=9.5f} {6:=9.5f}".format(i
+ 1,
X_matr[i][0],
X_matr[i][1],
X_matr[i][2],
Y_matr[i][0],
Y_matr[i][1],
Y_matr[i][2]))
        print('##' * 40, '\n')

    def criterion_of_Student(value, criterion, check):
        if check < criterion:
            return 0
        else:
            return value

    y1_nat = B_nat[0] + B_nat[1] * X_matr_natur[0][0] + B_nat[2] * X_matr_natur[0][1]

```

```

+ B_nat[3] * X_matr_natur[0][2] + \
    B_nat[4] * x_12_13_23_natur[0][0] + B_nat[5] * x_12_13_23_natur[0][1] +
B_nat[6] * x_12_13_23_natur[0][2] + \
    B_nat[7] * x_123_natur[0]
y1_norm = B_norm[0] + B_norm[1] * X_matr[0][0] + B_norm[2] * X_matr[0][1] +
B_norm[3] * X_matr[0][2] + B_norm[4] * \
    x_12_13_23[0][0] + B_norm[5] * x_12_13_23[0][1] + B_norm[6] *
x_12_13_23[0][2] + B_norm[7] * x_123[0]

dx = [(X_max[i] - X_min[i]) / 2) for i in range(3)]
A = [sum(Y_average) / len(Y_average), B_nat[0] * dx[0], B_nat[1] * dx[1],
B_nat[2] * dx[2]]

S_kv = [(sum([(Y_matr[i][j] - Y_average[i]) ** 2) for j in range(m)]) / m) for i
in range(N)]

Gp = max(S_kv) / sum(S_kv)

f1 = m - 1
f2 = N
p = .95
q = 1 - p
# for N=8
Gt_dict = {2: 5157, 3: 4377, 4: 3910, 5: 3595, 6: 3362, 7: 3185, 8: 3043, 9:
2926, 10: 2829, 16: 2462}

def kohren(f1=f1, f2=f2, q=0.05):
    q1 = q / f1
    fisher_value = f.ppf(q=1 - q1, dfn=f2, dfd=(f1 - 1) * f2)
    return fisher_value / (fisher_value + f1 - 1)

Gt = kohren()

if Gp < Gt:
    print('Дисперсії однорідні')

    flag = False
else:
    print('Дисперсії неоднорідні')
    m += 1
S_average = sum(S_kv) / N

S2_beta_s = S_average / (N * m)

S_beta_s = S2_beta_s ** .5

beta = [(sum([x_for_beta[j][i] * Y_average[j] for j in range(N)]) / N) for i in
range(4)]
ts = [(math.fabs(beta[i]) / S_beta_s) for i in range(4)]
tabl_Stud = [
    12.71,
    4.303,
    3.182,
    2.776,
    2.571,
    2.447,
    2.365,
    2.306,
    2.262,
    2.228,

```

```

        2.201,
        2.179
    ]
    f3 = f1 * f2

    student = partial(t.ppf, q=1 - 0.025)
    criterion_of_St = student(df=f3)

    result_2 = [criterion_of_Student(B_nat[0], criterion_of_St, ts[0]) +
                 criterion_of_Student(B_nat[1], criterion_of_St, ts[1]) *
X_matr_natur[i][0] +
                 criterion_of_Student(B_nat[2], criterion_of_St, ts[2]) *
X_matr_natur[i][1] +
                 criterion_of_Student(B_nat[3], criterion_of_St, ts[3]) *
X_matr_natur[i][2] for i in range(N)]

    znach_koef = []
    for i in ts:
        if i > criterion_of_St:
            znach_koef.append(i)
        else:
            pass

    d = len(znach_koef)
    f4 = N - d
    f3 = (m - 1) * N

    deviation_of_adequacy = (m / (N - d)) * sum([(result_2[i] - Y_average[i]) ** 2
for i in range(N)])

    Fp = deviation_of_adequacy / S2_beta_s

    fisher = partial(f.ppf, q=1 - 0.05)
    Ft = fisher(dfn=f4, dfd=f3)

    print("Значення після критерія Стюдента:")
    print("Y1 = {0:.3f}; Y2 = {1:.3f}; Y3 = {2:.3f}; Y4 =
{3:.3f}.".format(result_2[0],
result_2[1],
result_2[2],
result_2[3]))
    print("Y1a = {0:.3f}; Y2a = {1:.3f}; Y3a = {2:.3f}; Y4a =
{3:.3f}.".format(Y_average[0],
Y_average[1],
Y_average[2],
Y_average[3]))

    if Fp > Ft:
        print('Fp = {} > Ft = {}'.format(round(Fp, 3), Ft))
        print('Рівняння регресії неадекватно оригіналу при рівні значимості
{}'.format(round(q, 2)))
    else:
        print('Fp = {} < Ft = {}'.format(round(Fp, 3), Ft))
        print('Рівняння регресії адекватно оригіналу при рівні значимості
{}'.format(round(q, 2)))
        flag = True

```

Скріншоти результату виконання роботи::

```
Дисперсії однорідні
Значення після критерія Стюдента:
Y1 = 112.894;   Y2 = 112.894;   Y3 = 112.894;   Y4 = 112.894.
Y1a = 199.667;  Y2a = 228.000;  Y3a = 219.333;  Y4a = 221.667.
Fp = 3377.958 > Ft = 2.6571966002210865
Рівняння регресії неадекватно оригіналу при рівні значимості 0.05
Матриця планування експерименту:
N   x1  x2  x3   Y1      Y2      Y3
1 -  1 -  1 -  1 230.00000 207.00000 192.00000
2 -  1 -  1   1 200.00000 244.00000 226.00000
3 -  1   1 -  1 237.00000 204.00000 194.00000
4 -  1   1   1 197.00000 240.00000 237.00000
5   1 -  1 -  1 240.00000 203.00000 191.00000
6   1 -  1   1 242.00000 215.00000 218.00000
7   1   1 -  1 209.00000 233.00000 200.00000
8   1   1   1 221.00000 229.00000 241.00000
#####

Дисперсії однорідні
Значення після критерія Стюдента:
Y1 = 211.066;   Y2 = 224.067;   Y3 = 211.066;   Y4 = 224.067.
Y1a = 209.667;  Y2a = 223.333;  Y3a = 211.667;  Y4a = 224.667.
Fp = 2.34 < Ft = 2.741310828338778
Рівняння регресії адекватно оригіналу при рівні значимості 0.05
```

Висновок:

В даній лабораторній роботі я провів повний трьохфакторний експеримент з трьома статистичними.