

Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра общей математики

Васильченко Дмитрий Дмитриевич

Об интегральном представлении производных
решения задачи для уравнения Лапласа с
интегральным граничным условием.

Научный руководитель:
д.ф.-м.н., профессор
Капустин Н. Ю.

Москва, 2025

Постановка задачи

Рассматривается задача Трикоми для уравнения
Лавертьева-Бицадзе

$$\operatorname{sgn}(y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0 \quad (1)$$

в области $D = D^+ \cup D^-$, где

$$D^+ = \{(x, y) : 0 < x < \pi, 0 < y < +\infty\},$$

$D^- = \{(x, y) : -y < x < y + \pi, -\pi/2 < y < 0\}$ в классе функций
 $u(x, y) \in C^2(D^+) \cap C^2(D^-) \cap C(\overline{D^+ \cup D^-})$ с граничными условиями


$$u(0, y) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, y) = 0, \quad 0 < y < +\infty, \quad (2)$$

$$u(x, -x) = f(x), \quad 0 \leq x \leq \pi/2, \quad f(0) = 0, \quad (3)$$

$$u(x, y) \rightrightarrows 0, \quad y \rightarrow +\infty \quad (4)$$

и условием непрерывности градиента

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, +0) = \frac{\partial u}{\partial y}(x, -0), \quad 0 < x < \pi. \quad (5)$$



Основные результаты

Теорема 1. Решение задачи (1) - (5) единственно.

Используя известную формулу общего решения задачи (1) - (5) в области D^-

$$u(x, y) = F(x + y) + f\left(\frac{x - y}{2}\right) - F(0).$$

Продифференцируем это равенство и получим следующее соотношение

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, 0 + 0) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, 0 + 0) = -f'\left(\frac{x}{2}\right), \quad 0 < x < \pi.$$

Постановка вспомогательной задачи в D^+

Получим в области D^+ вспомогательную задачу для оператора Лапласа

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0 \quad (6)$$

с граничными условиями

$$u(0, y) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, y) = 0, \quad 0 < y < +\infty, \quad (7)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}(x, 0+0) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, 0+0) = -f'\left(\frac{x}{2}\right), \quad (8)$$

$$u(x, y) \Rightarrow 0, \quad y \rightarrow +\infty \quad (9)$$

Постановка вспомогательной задачи в D^+

Рассматривается уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0 \quad (10)$$

в области $D^+ = \{(x, y) : 0 < x < \pi, 0 < y < +\infty\}$ в классе функций $u(x, y) \in C^2(D^+) \cap C^1(\overline{D^+} \cap \{y > 0\}) \cap C(\overline{D^+})$ с граничными условиями

$$u(0, y) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(\pi, y) = 0, \quad 0 < y < +\infty, \quad (11)$$

$$\lim_{y \rightarrow 0+0} \int_0^\pi \left[\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + \varphi(x) \right]^2 dx = 0, \quad \varphi(x) \in L_2(0, \pi) \quad (12)$$

$$u(x, y) \rightrightarrows 0, \quad y \rightarrow +\infty \quad (13)$$

y

$u(x, y) \Rightarrow 0$

$\Delta u = 0$

$u(0, y) = 0$

$\frac{\partial u}{\partial x}(\pi, y) = 0$

x

0

π

$\int_0^\pi \left[\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + \varphi(x) \right]^2 dx \rightarrow 0$

Существование и единственность решения вспомогательной задачи

Теорема 2. Решение задачи (10) - (13) существует, причём его можно представить в виде ряда

$$u(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{-\left(n + \frac{1}{2}\right)y} \sin \left[\left(n + \frac{1}{2}\right)x \right], \quad (14)$$

где коэффициенты A_n , $n = 0, 1, 2, \dots$ находятся из разложения

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n \left(n + \frac{1}{2}\right) \sin \left[\left(n + \frac{1}{2}\right)x + \frac{\pi}{4} \right] = \frac{\varphi(x)}{\sqrt{2}} \quad (15)$$

Теорема 3. Решение задачи (10) - (13) единственно.

Интегральное представление производных решения

Теорема 4. Пусть $u(x, y)$ - решение задачи (10) – (13), тогда в D^+ u_x, u_y представимы в виде

$$u_y(x, y) = -Im \frac{\sqrt{1 - e^{i2z}}}{\pi} e^{\frac{iz}{2}} \int_0^\pi \frac{\sqrt{\sin t}}{(1 - e^{i(z+t)}) (1 - e^{i(z-t)})} \varphi(t) dt \quad (16)$$

$$u_x(x, y) = Re \frac{\sqrt{1 - e^{i2z}}}{\pi} e^{\frac{iz}{2}} \int_0^\pi \frac{\sqrt{\sin t}}{(1 - e^{i(z+t)}) (1 - e^{i(z-t)})} \varphi(t) dt, \quad (17)$$

где $z = x + iy$.

Список литературы



Бицадзе А.В. Некоторые классы уравнений в частных производных. М.:Наука, 1981. – 448 с.



Моисеев Е.И., Моисеев Т.Е., Вафадорова Г.О. Об интегральном представлении задачи Неймана-Трикоми для уравнения Лаврентьева-Бицадзе // Дифференциальные уравнения. 2015. Т. 51 №8. С. 1070-1075.



Моисеев Е.И. О базисности одной системы синусов // Дифференциальные уравнения. 1987. Т. 23 №1. С. 177-189.



Капустин Н.Ю., Васильченко Д.Д. Краевая задача для уравнения Лапласа со смешанными граничными условиями в полуполосе // Дифференциальные уравнения. 2024. Т. 60 №12. С. 1713-1718.



Моисеев Т.Е. Об интегральном представлении решения уравнения Лапласа со смешанными краевыми условиями // Дифференциальные уравнения. 2011. Т. 47 №10. С. 1446-1451.