

с длиной волны λ определяется групповой скоростью $u=d\omega/dk$. Групповая скорость и может быть найдена по формуле Эйлера: $u=v-\lambda\frac{dv}{d\lambda}$. Учитывая, что $v=\omega/k$, из закона дисперсии находим зависимость фазовой скорости от частоты:

$$v = \frac{g}{\omega}$$

Из формулы Эйлера для групповой скорости получаем

$$u = v - \lambda \frac{dv}{d\lambda} = \frac{1}{2}v = \frac{g}{2\omega}$$

Если расстояние до места падения метеорита L, а регистрация волн началась через время τ после падения метеорита, то время прихода групп волн с частотой $\omega=2\pi/T$ равна $t'=t+\tau$, т.е.

$$rac{L}{u}=rac{L}{g/(2\omega)}=t+ au,$$
 или $\omega=rac{g(t+ au)}{2L}$

Получается, что частота ω линейно растет со временем, причем угловой коэффициент прямой $\omega(t)$ равен A=g/(2L). Построим график зависимости $\omega=\omega(t)$, соответствующий таблице 2.




Рис. 1: my caption of the figure

График, приведенный на рисунке, хорошо описывается прямой $\omega(t) = At + B$ с угловым коэффициентом

$$A = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = 0.06 \text{ c}^{-1}/\text{ч}.$$

Отсюда находим расстояние до места падения спутника на землю:

$$L = \frac{g}{2A} \approx 300$$
км.

Метеорит упал за $\tau=B/A=18,5$ ч до начала наблюдений. Учитывая, что наблюдения за волнением начались в 12:00, момент падения метеорита соответствует времени 17:30 предшествующих дню наблюдения суток.

НАМ ПИШУТ

Глиняные гири

Не секрет, что математика — вовсе не сухая и скучная наука. В ней много интересных задач, и бывает, что впечатление от решения красивой задачи запоминается на всю жизнь. О таком ярком моменте из своих школьных лет написал нам наш читатель из города Пересвет Московской области Данил Владимирович Поташников, ветеран Великой отечественной войны. Вот несколько его строк о себе:

«В 1961 году закончил МАИ очно. В 1999 году заочно освоил пятигодичный курс Открытого университета Израиля. Не пропустил ни одну лекцию из цикла «Академиятелеканала «Культура».

А вот выдержка из его письма о запомнившейся задаче: «Когда я учился в пятом классе (а это было в городе Каменка Черкасской области на Украине в 1936 году), учитель математики записал на доске домашнее задание и попросил дополнительно решить головоломку.

На Украине в XIX веке гири для рычажных весов изготавливались и самодельные — из глины. Самая большая была пудовая (40 фунтов). По дороге на ярмарку пудовая гиря упала с воза и разбилась на четыре части. Оказалось, что этими частями можно взвесить на рычажных весах любые покупки весом от одного до сорока фунтов. Суть задания: найти вес каждой части.

Никогда не забуду ту бессонную ночь!

Когда я назвал вес каждой части: 1, 3, 9, 27, учитель попросил выйти к доске и пояснить ответ.

Один фунт – нелогично использовать две части для определения одного фунта.

Три фунта – «1» и «3» позволят взвесить 1, 2, 3 и 4 фунта.

Девять фунтов – сможем взвесить от 5 до 13 фунтов.

Двадцать семь фунтов – сможем взвесить от 14 до 40 фунтов. На одной из последних встреч с учениками 6-го класса я попросил решить эту головоломку. Я сообщил детям свой телефон и обещал подарок тому, кто первый найдет решение.

Увы!»

Предлагаем нашим читателям справиться с таким обобщением этой головоломки, ставшим классической олимпиадной задачей: Докажите, что с помощью п гирь массами $1,3,9,\dots,3^{n-1}$ кг можно взвесить на чашечных весах любой предмет массой $M \leq \frac{3^n-1}{2}$ кг (М - целое число, гири можно класть на обе чаши весов).

В завершение приведем еще одну цитату из письма Д.В.Поташникова:

«В этом году по просьбе детей и внуков я написал свои воспоминания, которые закончил словами «Я живу, пока познаю».

