Dans la suite (X, \mathcal{B}, μ) est un espace mesuré.

Théorême de convergence dominée

On se donne une suite $f_n \in \mathcal{M}(X)$ qui converge simplement vers f. On suppose qu'il existe g intégrable telle que $\forall n \in \mathbb{N}$; $|f_n| \leq g$. Alors on a:

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est intégrable car par croissance de l'intégrale $\int |f_n| d\mu \leq \int g d\mu < \infty$
- Par passage à la limite, $|f| \leq g$ et donc f est intégrable par le même raisonnement.

Montrons maintenant qu'on peut faire l'interversion limite/intégrale, on définit les suites (de fonctions) suivantes:

$$\begin{cases} u_n := |f_n - f| \\ v_n := \sup\{u_k ; k > n\} \\ w_n := 2g - v_n \end{cases}$$

Soit $x \in X$, étudions tout d'abord la suite (v_n) , on peut montrer les deux propriétés suivantes:

- Elle est décroissante: En effet si n < m, on a $\{u_k(x) ; k > m\} \subseteq \{u_k(x) ; k > n\}$ en passant à la borne supérieure on a $v_m(x) > v_n(x)$
- Elle tends vers 0, en effet (u_n) converge simplement vers 0 et on a:

$$\lim_{n \to +\infty} v_n(x) = \lim_{n \to +\infty} \sup \{u_k(x) ; k > n\} = \lim \sup u_n(x) = \lim_{n \to +\infty} u_n(x) = 0$$

On déduis donc de ces résultats que la suite w_n est une suite **croissante de fonctions mesurables**, en effet si n > n', on a:

$$-v_n(x) > -v_n'(x)$$

Et donc:

$$2g(x) - v_n(x) > 2g(x) - v'_n(x)$$

En outre cette suite est positive à partir d'un certain rang car v_n tends vers 0 et g est positive (donc $|v_n| < 2g$ à partir d'un certain rang). On peut donc appliquer le théorème de convergence monotone et on obtient que:

$$\lim_{n \to +\infty} \int 2g - v_n \, \mathrm{d}\mu = \int 2g \, \mathrm{d}\mu$$

En appliquant la linéarité dans l'intégrale de gauche et en calculant la limite de cette manière on obtient alors que:

$$\lim_{n \to +\infty} \int v_n \, \mathrm{d}\mu = 0$$

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a que:

$$|f_n - f| \le \sup\{|f_n - f| \; ; \; k > n\} = v_n$$

Donc en intégrant ces fonctions et en passant à la limite, on trouve:

$$\int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \le \int v_n \, \mathrm{d}\mu \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

Et par inégalité triangulaire, on a:

$$\left| \int f_n \, \mathrm{d}\mu - \int f \, \mathrm{d}\mu \right| \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$$

Donc:

$$\int f_n \, \mathrm{d}\mu \xrightarrow[n \to \infty]{} \int f \, \mathrm{d}\mu$$