## Actividad 2

Determina la solución de las siguientes evaciones diferentiales:

$$\begin{vmatrix}
y' &= \frac{x^2}{y'} \\
 &> \frac{dy}{dx} \\
 &= \frac{x^2}{y'}
\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
y' &= \frac{x^2}{y'} \\
 &> \frac{dy}{dx} \\
 &= \frac{x^2}{y'}
\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
y' &= \frac{x^2}{y'} \\
 &> \frac{dy}{dx} \\
 &= \frac{x^2}{y'}
\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
y' &= \frac{x^2}{y'} \\
 &> \frac{dy}{dx} \\
 &= \frac{x^2}{y'}
\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
y' &= \frac{x^2}{y'} \\
 &> \frac{dy}{dx} \\
 &= \frac{x^2}{y'}
\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
y' &= \frac{x^2}{y'} \\
 &> \frac{dy}{dx} \\
 &= \frac{x^2}{y'}
\end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}
y' &= \frac{x^2}{y'} \\
 &= \frac{x^2}{y$$

Determina la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales nomogéneas:  $\frac{dy}{dx} = -\frac{4x + 3y}{2x + y}$ Primero se comprueba que son homogéneas:  $\frac{dy}{dx} = -\frac{4x + 3y}{2x + y}$ Primero se comprueba que son homogéneas:  $\frac{dy}{dx} = -\frac{4x + 3y}{2x + y}$ Primero se comprueba que son homogéneas:  $V = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow y = V \times \Rightarrow \frac{dy}{dx} = V + X \frac{dv}{dx}$  $V + \times \frac{dv}{dx} = -\frac{4 + 3v}{2 + v} \rightarrow$  $-)\left(-\frac{2+v}{(4+5v+v^2)}\right)dv = \frac{dx}{x} \rightarrow -\frac{2+v}{(2+5v+4)}dv = \frac{6}{x}\frac{dx}{x}$ 0 Para ( 2+V dv - ( 2+V dv - A B V+4) (V+1) (V+1) dv - A B 2+V = A(V+1)+B(V+4) 0 V=-1 → 2-1= A(-1+1)+B(-1+4) → (=0+3B) = B @V=-4 >2-4=A(-4+1)+B(-4+4) -2=-3A-0->===A-7A== Entonces: P 2+4 dy = P 2+4 dy - (2 pdv + 3 5 dx) --== n/v+11-=== n/v+1) Regresando a (1) tenemos: - 3 - 2+V dv - 3 dx - 3 - 2 10 1 v + 41 - 1 10 1 v + 11 = 10 1x 1+C > Regreson do a la variable original:  $-\frac{2}{3}\ln \left| \frac{y}{x} + 4 \right| - \frac{1}{3}\ln \left| \frac{y}{x} + 1 \right| = \ln x + c$  Sol, grat.

27/01/23  $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{x} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{x}{x} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - 1 \quad \text{i. Es homogénea}$ Sustituimas.  $v = \frac{y}{x} \rightarrow y = vx \rightarrow \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$  $V + X \frac{dv}{dx} = V - 1 \rightarrow X \frac{dv}{dx} = -1 \rightarrow dv = -\frac{1}{X} dx$ Integramos:  $3dv = -3 \frac{dx}{x} \rightarrow \frac{1^2}{2} = -\ln x + c$  Sol. gral  $\frac{3}{3} > \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{2y - x}{2x - y} \rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{2 \times - x}{2 \times - y} \rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{2 \times - 1}{2 - \frac{y}{x}}$  of Es homogéneous Sustitutions: V= X > Y=VX > BY = V+ BY  $V + \times \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{2V - 1}{2 - V} \longrightarrow \times \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{2V - 1}{2 - V} \longrightarrow \times \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{2V - 1 - 2V + V^2}{2 - V}$  $\frac{x}{\partial x} = \left(-\frac{1}{1} + \sqrt{2}\right) \rightarrow \frac{2-v}{1+v^2} dv = \frac{dx}{x} \rightarrow \frac{2-v}{1+v^2} dv = \frac{2dx}{x}$ Para: 3-1+v2 dv = 3 (V-1)(V+1) V1 B > 2-V=A(V+1)+B(V-1)  $V = -1 \rightarrow 2 + 1 = A(1 + 1) + B(-1 - 1) \rightarrow 3 = -2B$   $V = 1 \rightarrow 2 + 1 = A(1 + 1) + B(1 - 1) \rightarrow 3 = -2B$   $V = 1 \rightarrow 2 - 1 = A(1 + 1) + B(1 - 1) \rightarrow 1 = 2A$   $A = \frac{1}{2} \ln |V - 1| - \frac{3}{2} \ln |V + 1|$ Entences:  $(\frac{2-v}{-1+v^2})dv = \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2}|n|v-1| - \frac{3}{2}|n|v+1| = |n|x| + c$ Regresando a la variable original: = 1 | x-1 | -3 | n | x+1 = 1 n | x+c | Sol. gral.

THE STATE OF THE STATE OF STATES STAT

9. 91. 91. 61. Ch. Ch.

	)X	X	ti	y					34	7			.24	V -	: V)
		X		X		gx		-	YX						
V -> >	du =	1+V-	-V		V	du	Fr.	1.W			2	d×	2	1+	X
	OX	1-V		/	^	dx		V	1-1	1					
JV2+1	4-3	X						-							
					di	= V	2+1	f.		4			T (		
100-1			7								N	V	1		
1	2 1710	Tages & S		JA03	V		5								-
- V dv	= ( )	5													
								9							
11/1/41	ton	V	Manager -	ml	X	+6				-					
	51-V dv 2+1 dv 2+1 dv 2+1	51-V dv = 5 5 v dv 5 v dv = 5 dx	51-V dv - 50x 5v2+1 dv - 50x 5v2+1 dv - 50x - 2 0 v2+1	51-V dv - 50x 5v2+1 dv - 50x 5v2+1 dv - 50x - 1 dv - 2 rov - 1 - 1	$\frac{\int -v}{\int v^2 + 1} dv - \frac{\int dx}{\int x}$ $\frac{\int v}{\int v^2 + 1} dv - \frac{\int dx}{\int x}$ $\frac{\partial v}{\partial v} = \frac{1}{2} \left[ \frac{\partial v}{\partial v} + \frac{\partial v}{\partial v} \right]$ $\frac{\partial v}{\partial v} = \frac{1}{2} \left[ \frac{\partial v}{\partial v} + \frac{\partial v}{\partial v} \right]$	$\begin{array}{c} V \\ V \\ V \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} V \\ V \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} V \\ V \\ V \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} \partial V \\ \partial X \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} V \\ V \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} $	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} $	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c} V \longrightarrow \lambda \frac{\partial V}{\partial x} = 1 +$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$