



Sample Presentation

III International School in Mathematical Finance

John Smith, Jane McCartney

Vega Institute Foundation

August 21 – 28, 2022



Text example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



List example

Bullets

Popular models:

- Cox-Ross-Rubinstein;
- Bachilier;
- Black-Sholes;
- Black;
- CEV.¹

¹Local volatility model, see Dupire.



List example

Enum

Popular models:

1. Cox-Ross-Rubinstein;
2. Bachilier;
3. Black-Sholes;
4. Black;
5. CEV.²

²Local volatility model, see Dupire.



Block and equation example

Theorem 1 (И. Гирсанов)

Если $\lambda_T = (\lambda_t(\omega))_{t \leq T}$ таков, что

$$\mathbb{E} e^{\int_0^T \lambda_t dB_t - \frac{1}{2} \int_0^T \lambda_t^2 dt} = 1, \quad dP_T^\lambda = e^{\int_0^T \lambda_t dB_t - \frac{1}{2} \int_0^T \lambda_t^2 dt} dP_T, \quad (1)$$

то процесс

$$B_t^\lambda = B_t - \int_0^t \lambda_s(\omega) ds, \quad t \leq T \quad (2)$$

является P_T^λ -броуновским движением.

Уравнение (2) работает не всегда, а теорема 1 всегда верна.

