

# 1. Исследовать функцию на условный экстремум

1)

$$U = 3 - 8x + 6y, \quad \text{если} \quad x^2 + y^2 = 36$$

$$L(\lambda_1, x, y) = 3 - 8x + 6y + \lambda_1 \cdot (x^2 + y^2 - 36)$$

$$\begin{cases} L'_x = -8 + 2\lambda_1 x \\ L'_y = 6 + 2\lambda_1 y \\ L'_{\lambda_1} = x^2 + y^2 - 36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{\lambda_1} \\ y = \frac{-3}{\lambda_1} \\ \frac{16}{\lambda_1^2} + \frac{9}{\lambda_1^2} = 36 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{4}{\lambda_1} \\ y = \frac{-3}{\lambda_1} \\ \lambda_1^2 = 25/36 \end{cases}$$

$$\left(\frac{5}{6}; 4,8; -3,6\right), \left(-\frac{5}{6}; -4,8; 3,6\right)$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & 2\lambda_1 & 0 \\ 2y & 0 & 2\lambda_1 \end{vmatrix} = 0 \begin{vmatrix} 2\lambda_1 & 0 \\ 0 & 2\lambda_1 \end{vmatrix} - 2x \begin{vmatrix} 2x & 0 \\ 2y & 2\lambda_1 \end{vmatrix} + 2y \begin{vmatrix} 2x & 2\lambda_1 \\ 2y & 0 \end{vmatrix} \\ = -8\lambda_1(x^2 + y^2)$$

Тогда получается, что в точке  $M_1 = \left(\frac{5}{6}; 4,8; -3,6\right) : H = -240$ , следовательно в этой точке – минимум.

В точке  $M_1 = \left(-\frac{5}{6}; -4,8; 3,6\right) : H = 240$ , следовательно в этой точке – максимум.

2)

$$U = 2x^2 + 12xy + 32y^2 + 15, \quad \text{если} \quad x^2 + 16y^2 = 64$$

$$L(\lambda_1, x, y) = 2x^2 + 12xy + 32y^2 + 15 + \lambda_1 \cdot (x^2 + 16y^2 - 64)$$

$$\begin{cases} L'_x = 4x + 12y + 2\lambda_1 x \\ L'_y = 64y + 12x + 32\lambda_1 y \\ L'_{\lambda_1} = x^2 + 16y^2 - 64 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{-6y}{2 + \lambda_1} \\ y = \frac{-3x}{16 + 8\lambda_1} \\ x^2 + 16y^2 - 64 = 0 \end{cases}$$

Пусть  $t = \frac{-3}{2+\lambda_1}$ , тогда два первых уравнения превращаются в систему:

$$\begin{cases} x = 2ty \\ y = \frac{xt}{8} \end{cases}$$

Подставляя первое выражение во второе, получаем:

$$y = \frac{t^2 y}{4}$$

$$t^2 = 4$$

Подставляем значение  $t$  и решаем:

$$\frac{9}{(2 + \lambda_1)^2} = 4$$

$$4\lambda^2 + 16\lambda + 7 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = -3.5 \\ \lambda_2 = -0.5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_1 = 2 \\ t_2 = -2 \end{cases}$$

Тогда получается, что  $\begin{cases} x = 4y \\ x = -4y \end{cases}$

Подставляя эти уравнения в третье из первой системы, получаем:

$$16y^2 + 16y^2 - 64 = 0$$

$$y^2 = 2$$

$$\begin{cases} y_1 = -\sqrt{2} \\ y_2 = \sqrt{2} \end{cases}$$

Тогда:

$$\begin{cases} x_1 = -4\sqrt{2} \\ x_2 = 4\sqrt{2} \end{cases}$$

При проверке оказалось, что  $\lambda_2$  выбрасывается, а как так получилось, не могу понять, если нашли ошибку, можете мне написать?

$$(-3,5; -4\sqrt{2}; -\sqrt{2}), (-3,5; 4\sqrt{2}; \sqrt{2})$$

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 0 & 2x & 32y \\ 2x & 4 + 2\lambda_1 & 12 \\ 32y & 12 & 64 + 32\lambda_1 \end{vmatrix} \\ &= 0 \begin{vmatrix} 4 + 2\lambda_1 & 12 \\ 12 & 64 + 32\lambda_1 \end{vmatrix} - 2x \begin{vmatrix} 2x & 12 \\ 32y & 64 + 32\lambda_1 \end{vmatrix} \\ &+ 32y \begin{vmatrix} 2x & 4 + 2\lambda_1 \\ 32y & 12 \end{vmatrix} \\ &= -256x^2 - 4096y^2 - 128\lambda_1(x^2 + 16y^2) + 1536yx \end{aligned}$$

В имеющихся точках значение детерминанта равно примерно 28315, что больше нуля, значит обе точки – максимумы.

2. Найти производную функцию  $U = x^2 + y^2 + z^2$  по направлению вектора  $\vec{c}(-9, 8, -12)$  в точку  $M(8, -12, 9)$

$$|\vec{c}| = \sqrt{81 + 64 + 144} = 17$$

$$\vec{c}_0 = \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} = \left( \frac{-9}{17}, \frac{8}{17}, \frac{-12}{17} \right)$$

$$\begin{cases} U_x = 2x \\ U_y = 2y \\ U_z = 2z \end{cases}$$

$$\text{grad } U|_{(8, -12, 9)} = (16, -24, 18)$$

$$U_{\vec{c}}|_{(8, -12, 9)} = \frac{-9}{17} * 16 + \frac{8}{17} * (-24) - \frac{12}{17} * 18 = \frac{552}{17} \approx 32.47$$

3. Найти производную функцию  $U = e^{x^2+y^2+z^2}$  по направлению вектора  $\vec{d}(4, -13, -16)$  в точку  $L(-16, 4, -13)$

$$|\vec{d}| = \sqrt{16 + 169 + 256} = 21$$

$$\vec{d}_0 = \frac{\vec{d}}{|\vec{d}|} = \left( \frac{4}{21}, \frac{-13}{21}, \frac{-16}{21} \right)$$

$$\begin{cases} U_x = 2xe^{x^2+y^2+z^2} \\ U_y = 2ye^{x^2+y^2+z^2} \\ U_z = 2ze^{x^2+y^2+z^2} \end{cases}$$

$$\text{grad } U|_{(-16, 4, -13)} = (-10^{193}, 2.7 * 10^{192}, -8.7 * 10^{192})$$

$$U_{\vec{d}}|_{(-16, 4, -13)} \approx 3 * 10^{192}$$