

Лекция 2

План лекции:

1. Две группы методов распознавания образов.
2. Понятие разделяющей функции.
3. Линейные разделяющие функции для N классов.

2.1 Методы распознавания образов

В настоящее время существует большое множество методов классификации и распознавания образов. Однако все методы распознавания можно разделить на две группы. Первая основана на понятии пространства признаков и их обработки в этом пространстве. Вторая – на исследовании конструкции рассматриваемых образов (синтаксическое распознавание).

Для первой группы методов в качестве основополагающей принята гипотеза о возможности представления образа в виде вектора, принадлежащего множеству V . Множество образов представляется в виде множества векторов, состоящего из N подмножеств таких, что каждый вектор, отнесенный в результате классификации к j -ому классу, принадлежит подмножеству E_j .

Свойства множества V могут быть записаны в виде:

$$\bigcup_{i=1}^N E_i = V, E_i \cap E_j = \emptyset (\forall i \neq j).$$

Если подмножества образуют разделение $P(V)$ множества V , то его называют полностью сепарабельным. Для пространства признаков на практике такое разделение бывает крайне редко. Чаще пространство признаков представляется кусочно-сепарабельным. Задача классификации состоит в отыскании функции f , обеспечивающей разделение пространства V на требуемые классы

$$f: V \rightarrow P(V).$$

Процедура классификации состоит в том, чтобы для каждой области R_i найти решающую функцию $g_i(x)$, такую, что если

$$g_i(\bar{x}) > g_j(\bar{x}), \text{ то } \bar{x} \in R_i \quad \forall j = 1, 2, \dots, N, \text{ где } N - \text{общее количество областей.}$$

2.2 Разделяющая функция

Разделяющую функцию часто представляют в виде линейной суммы:

$g(\bar{x}) = \omega_0 + \omega_1 x_1 + \omega_2 x_2 + \dots + \omega_n x_n$, где ω_i – весовые коэффициенты, каждый из которых относится к определенной составляющей. Для удобства записи вводится весовой коэффициент с нулевым индексом ω_0 . Это позволяет записать решающую функцию в более компактной форме:

$g(\bar{x}_a) = \bar{\omega} \bar{x}_a$, где $\bar{x}_a = \{1, x_1, x_2 \dots x_n\}$ – вектор, в число составляющих которого входит дополнительно одна вещественная константа. Ее величину обычно принимают равной единице. Решающее правило d для их разделения можно записать в виде:

$$d = \begin{cases} c_1, \text{если } g(\bar{x}) \geq 0, \\ c_2, \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Для случая N сепарабельных классов ($N > 2$) решение о принадлежности объекта к определенному классу будет:

$$d = \begin{cases} c_i, \text{если } g_i(\bar{x}) = \bar{\omega}_i \bar{x}_a \geq 0, \\ \bar{c}_i, \text{если } g_i(\bar{x}) < 0 \end{cases},$$

где C – множество, состоящее из N классов. $C = \{c_1, c_2, \dots, c_N\}$, $c_i + \bar{c}_i = C$.

В процессе построения разделяющей функции основная задача заключается в том, чтобы найти весовые коэффициенты вида $\bar{\omega}_i = \{\omega_{0i}, \omega_{1i} \dots\}$ для каждого конкретного применения.

Одной из важных операций в процессе решения задачи распознавания образов является операция выявления общих характеристик предъявляемых объектов. Отнесение их к одному классу может рассматриваться как обобщение исходных данных. Для этой операции характерны два связанных действия – объединение подобных и отделение отличающихся объектов. Понятия подобия и сходства должны быть по возможности формализованы. Для этого используется понятие “расстояние”. Чем меньше расстояние между объектами x и y , тем больше между ними сходство.

В процессе классификации необходимо решать вопросы о качестве получаемого группирования. Для оценки его характеристик можно использовать показатель среднеквадратичного отклонения такого вида:

$$J = \sum_{j=1}^N \sum_{x \in E_j} \left\| \bar{x} - \bar{m}_j \right\|^2,$$

где N – число рассматриваемых областей. E_j – множество значений, принадлежащих области j , \bar{m}_j – средний вектор множества j .

$$\bar{m}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{x \in E_j} \bar{x}, \quad N_j - \text{число значений в } E_j.$$

Иногда может получиться так, что формируются группы, состоящие либо из разрозненных элементов, либо из не имеющих семантического смысла, т.е. внутренне не связанные друг с другом. Это хорошо видно из сопоставления рисунков 1 и 2. На рис. 1 показаны две области N_1 и N_2 , полученные методом группирования точек. Их совокупность в каждой группе дает возможность составить по ним представление об исходной фигуре. И наоборот, если

исходные данные сгруппированы в пять областей, как показано на рис. 2, то по ним невозможно составить представления о предъявляемых фигурах. Даже если внутри каждой области перебрать все возможные варианты построения всех отрезков, попарно соединяющих все имеющиеся точки.




Рис. 1 – Группирование точек




Рис. 2 – Группирование точек

2.3 Линейные разделяющие функции для N классов

Рассмотрим случаи применения линейных разделяющих функций для разбиения объектов более чем на два класса.

Случай 1. Каждый класс отделяется от всех остальных одной разделяющей поверхностью. Тогда существует M решающих правил, обладающих свойством

$$d_i(x) = w_i x \begin{cases} > 0, \text{ если } x \in \omega_i, \\ < 0, \text{ если } x \notin \omega_i \end{cases}, i = 1, 2, \dots, M.$$

На рис. 3 приведен пример, иллюстрирующий *случай 1*. Здесь каждый класс можно отделить от всех остальных с помощью одной разделяющей границы. Так, например, если некоторый образ x принадлежит классу ω_1 , на основании геометрических соображений заключаем, что $d_1(x) > 0$, $d_2(x) < 0$, $d_3(x) < 0$. Граница, отделяющая класс ω_1 от остальных, определяется значениями x , при которых $d_1(x) = 0$.




Рис. 3 – Случай 1 разделения на несколько классов

Рассмотрим численную иллюстрацию этого случая. Пусть решающие правила, соответствующие рис. 2.4, имеют вид:

$d_1(x) = -x_1 + x_2$, $d_2(x) = x_1 + x_2 - 5$, $d_3(x) = -x_2 + 1$. Следовательно, три разделяющие границы определяются уравнениями: $-x_1 + x_2 = 0$, $x_1 + x_2 - 5 = 0$, $-x_2 + 1 = 0$.

Следовательно, область, соответствующая классу ω_1 , включает область с той стороны от прямой $d_1(x) = -x_1 + x_2 = 0$, где $d_1(x)$ положительна, и область отрицательных значений функций $d_2(x)$ и $d_3(x)$, ограниченную прямыми $d_2(x) = x_1 + x_2 - 5 = 0$, и $d_3(x) = -x_2 + 1 = 0$. Эта область отмечена на рис. 4, и сопоставление его с рис. 2.5 показывает, что класс ω_1 , занимающий небольшой участок, в действительности – безграничен. Области, соответствующие классам ω_2 и ω_3 , также показаны на рис. 4.




Рис. 4 – Иллюстрация к случаю 1 разделения на несколько классов

Если функция $d_i(x)$ больше нуля при более чем одном значении i , рассматриваемая схема классификации не позволяет найти решение. Это справедливо и при $d_i(x) < 0$ для всех i . На рис. 4 существуют четыре области неопределенности, соответствующие одной из этих ситуаций.

Отнесение неклассифицированного объекта к одному из трех классов, определяемых рассмотренными решающими функциями, выполняется следующим образом. Пусть требуется классифицировать образ $x = (6, 5)$. Подстановка его признаков в три решающие функции дает следующее:

$d_1(x) = -1$, $d_2(x) = 6$, $d_3(x) = -4$. Так как $d_2(x) > 0$ при $d_1(x) < 0$ и $d_3(x) < 0$, образ зачисляется в класс ω_2 .

Случай 2. Каждый класс отделяется от любого другого класса «индивидуальной» разделяющей поверхностью, т.е. классы попарно разделимы. В этом случае существует $M(M-1)/2$ (число сочетаний из M классов по два) разделяющих поверхностей. Решающие функции имеют вид $d_{ij}(x) = w_{ij}x$ и обладают тем свойством, что если образ x принадлежит классу ω_i , то $d_{ij}(x) > 0$ для всех $i \neq j$; кроме того, $d_{ij}(x) = -d_{ji}(x)$.

На рис. 5 представлены три класса образов, разделенных согласно случаю 2. Очевидно, что ни один класс нельзя отделить от всех остальных с помощью единственной разделяющей поверхности. Каждая из приведенных на рис. 3 границ обеспечивает разделение двух классов. Так, например, хотя граница $d_{12}(x)=0$ проходит через класс ω_3 , она дает эффективное разделение только для классов ω_1 и ω_2 .




Рис. 5 – Случай 2 разделения на несколько классов

Пусть решающие функции имеют следующий вид:

$$d_{12}(x) = -x_1 - x_2 + 5, d_{13}(x) = -x_1 + 3, d_{23}(x) = -x_1 + x_2.$$

Разделяющие границы получим, приравнявая решающие функции нулю. Здесь области решений могут содержать несколько зон, где соответствующие функции положительны. Область, относящаяся к классу ω_1 , определяется значениями образа x , при которых $d_{12}(x) > 0$ и $d_{13}(x) > 0$. Значение решающей функции $d_{23}(x)$ в этой области не существенно, поскольку данная решающая функция никак не связана с классом ω_1 .

Области, определяемые тремя указанными решающими функциями, представлены на рис. 6. Для выделения областей, соответствующих разным классам, использовано условие $d_{ij}(x) = -d_{ji}(x)$. Поэтому поскольку $d_{12}(x) = -x_1 - x_2 + 5$, $d_{21}(x) = x_1 + x_2 - 5$, то зона положительности функции $d_{12}(x)$ совпадает с зоной отрицательности функции $d_{21}(x)$. Как и в случае 1, области решения безграничны и существуют области неопределенности, в которых условия случая 2 не выполняются.




Рис. 6 – Иллюстрация к случаю 2 разделения на несколько классов

Рассмотрим классификацию объекта, заданного вектором $x=(4, 3)$. Подстановка его признаков в выбранные решающие функции дает следующее: $d_{12}(x) = -2$, $d_{13}(x) = -1$, $d_{23}(x) = -1$.

Следовательно, $d_{21}(x) = 2$, $d_{31}(x) = 1$, $d_{32}(x) = 1$. Поскольку $d_{3j}(x) > 0$ для $j=1, 2$ и значения функций не попадают в область неопределенности, то рассматриваемый образ зачисляется в класс ω_3 .

Случай 3. Существует M решающих функций $d_k(x) = w_k x$, $k=1, 2, \dots, M$, таких, что если образ x принадлежит классу ω_i , то $d_i(x) > d_j(x)$ для всех $j \neq i$. Эта ситуация является разновидностью случая 2, т.к. можно положить $d_{ij}(x) = d_i(x) - d_j(x) = (w_i - w_j)x = w_{ij}x$, $w_{ij} = w_i - w_j$.

Очевидно, что если $d_i(x) > d_j(x)$ для всех $j \neq i$, т.е. если классы разделимы, как в случае 3, то они автоматически разделимы и как в случае 2.

Граница между классами ω_i и ω_j определяется теми значениями вектора x , при которых имеет место равенство $d_i(x) = d_j(x)$. Поэтому при выводе уравнения разделяющей границы для классов ω_i и ω_j значения решающих функций $d_i(x)$ и $d_j(x)$ используются совместно.

Пример случая 3 приведен на рис. 7. Для образов, принадлежащих классу ω_1 , должны выполняться условия $d_1(x) > d_2(x)$, $d_1(x) > d_3(x)$. В общем случае требуется, чтобы входящие в класс ω_i образы располагались в положительных зонах поверхностей $d_i(x) - d_j(x) = 0$, $j=1, 2, \dots, M$, $i \neq j$.

Положительная зона границы $d_i(x) - d_j(x) = 0$ совпадает с отрицательной зоной границы $d_j(x) - d_i(x) = 0$.




Рис. 7 – Случай 3 разделения на несколько классов

Пусть в качестве решающих функций выбраны следующие:

$d_1(x) = -x_1 + x_2$, $d_2(x) = x_1 + x_2 - 1$, $d_3(x) = -x_2$. Разделяющие границы для трех классов выглядят при этом так:

$$d_1(x) - d_2(x) = -2x_1 + 1 = 0,$$

$$d_1(x) - d_3(x) = -x_1 + 2x_2 = 0,$$

$$d_2(x) - d_3(x) = x_1 + 2x_2 - 1 = 0.$$

Для того чтобы определить область решений, соответствующую классу ω_1 , необходимо выделить область, в которой выполняются неравенства $d_1(x) > d_2(x)$, $d_1(x) > d_3(x)$. Эта область совпадает с положительными зонами для прямых $-2x_1 + 1 = 0$ и $-x_1 + 2x_2 = 0$. Область принятия решения о принадлежности образа классу ω_2 совпадает с положительными зонами для прямых $2x_1 - 1 = 0$ и $x_1 + 2x_2 - 1 = 0$. Область, отвечающая классу ω_3 , определяется положительными зонами для прямых $x_1 - 2x_2 = 0$ и $-x_1 - 2x_2 + 1 = 0$. Иллюстрация случая 3 приведена на рис. 8.

В случае 3 области неопределенности как таковые отсутствуют, за исключением самих разделяющих границ.




Рис. 8 – Иллюстрация к случаю 3 разделения на несколько классов

В качестве примера классификации рассмотрим обработку образа $x=(1,1)$. Подстановка признаков образа в выбранные решающие функции дает следующие значения:

$d_1(x)=0$, $d_2(x)=1$, $d_3(x)=-1$. Поскольку $d_2(x) > d_j(x)$, $j=1,3$, образ относится к классу ω_2 .

Если какой-либо из рассмотренных вариантов линейной решающей функции обеспечивает классификацию в некоторой заданной ситуации, то соответствующие классы называются *линейно разделимыми*. Основная проблема, возникающая после определения набора решающих функций, заключается в отыскании коэффициентов. Для их определения обычно используется доступная выборка образов. После того как коэффициенты всех решающих функций определены, можно приступить к построению системы распознавания.