
Communication enrichment vs. uniform ligand−receptor baseline
Median ratio across patients (1 = expected from abundance/topology)
Sender
Receiver
NK 0.64 0.81 0.74 0.58 0.56 0.50 0.50 0.50 0.62 0.70 0.44
Neutrophils 1.08 1.59 1.21 0.71 0.82 1.02 0.89 0.82 1.16 1.27 0.74
Monocytes 1.01 1.42 1.10 1.00 0.98 0.92 0.93 0.77 0.95 1.10 0.69
Mac M2 0.61 0.72 0.77 0.51 0.56 0.58 0.54 0.51 0.62 0.64 0.48
Mac M1 0.69 0.84 0.82 0.58 0.57 0.66 0.63 0.56 0.71 0.77 0.48
DC 0.74 0.99 1.00 0.59 0.64 0.86 0.71 0.68 0.72 0.73 0.58
CD8 T 0.88 1.16 0.85 0.47 0.56 0.91 0.76 0.73 0.95 0.96 0.70
Treg 0.34 0.52 0.42 0.31 0.41 0.49 0.37 0.42 0.52 0.52 0.37
CD4 Tconv 0.95 1.65 0.90 0.63 0.76 1.06 0.90 1.00 1.21 1.32 0.85
Cancer/non−immune 1.30 2.19 1.58 0.68 1.25 1.27 1.09 0.99 1.43 1.51 0.91
B 0.95 1.34 0.87 0.41 0.91 0.87 0.90 0.75 1.04 1.14 0.68
B
Cancer/non−immune
CD4 Tconv
Treg
CD8 T
DC
Mac M1
Mac M2
Monocytes
Neutrophils
NK
log2 median enrichment
1
0
−1