



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BUDIDAYA CABAI BESAR
(*Capsicum annum* L.)

KABUPATEN LUMAJANG



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Ir. Dydik Rudy Prasetya, M.MA.

Penanggung Jawab :

Ir. Irita Rahayu Aryati, MMA.

Tim Penyusun :

1. Anik Yudiastuti, S.P., M.Agr.
2. Sri Lestari, S.TP.
3. M. Agung Wibisono
4. Ghufroon Wahyu Priyo Cahyono, S.P.
5. Maya Anggraeni Nugroho, S.TP.
6. Ir. Baswarsiati, M.S

Kontributor :

1. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang
2. Petugas POPT Kecamatan Pronojiwo
3. Petugas PSBPTH Kabupaten Lumajang
4. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
5. Petani Anggota Poktan Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang

KATA PENGANTAR

Mutu produk tanaman sayur merupakan bagian integral dari subsistem produksi tanaman sayuran yang tidak dapat dipisahkan. Produk tanaman sayur dapat menjadi komoditi agribisnis penting apabila dalam sistem produksinya menerapkan standar mutu dan jaminan mutu terhadap konsumen.

Sistem perdagangan saat ini telah menempatkan mekanisme standar mutu dan jaminan mutu tanaman sayur sebagai persyaratan pokok yang wajib dipenuhi oleh seluruh produsen tanaman sayur tak terkecuali untuk komoditas cabai besar.

Produk komoditas cabai besar beresiko terhadap penurunan mutu akibat proses produksi, panen, maupun pasca panen. Oleh karena itu, penerapan sistem jaminan mutu yang baik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya dampak buruk pada mutu komoditas cabai besar. Terlebih lagi cabai besar merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi baik di tingkat regional maupun nasional.


Salah satu upaya untuk menghasilkan produk komoditas cabai besar sesuai keinginan konsumen dan kebutuhan pasar dapat dilakukan dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya cabai besar. SOP budidaya cabai besar Kabupaten Lumajang ini memuat kaidah-kaidah budidaya cabai besar yang baik dan benar mulai dari aspek pra budidaya, budidaya, panen, dan penanganan pasca panen.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, PPL dan Mantri tani Kecamatan xx yang mendampingi kegiatan, Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, dan Kabupaten Lumajang, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Petugas

UPT. Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH) Provinsi Jawa Timur, Petugas UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) Provinsi Jawa Timur yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan SOP budidaya cabai besar ini.

Kami menyadari sepenuhnya SOP ini jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan untuk perbaikan SOP budidaya cabai besar ini. Semoga buku SOP ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan mutu hasil dan kuantitas produksi komoditas cabai besar di Kabupaten Lumajang.

Surabaya, Juli 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur



Ir. DYDIK RUDY PRASETYA, M.MA.
NIP. 19690308 199403 1 003

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	2
3. Target	2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	
BUDIDAYA CABAI BESAR (<i>Capsicum annuum</i> L.).....	1
I. PEMILIHAN LOKASI	1
II. PEMILIHAN DAN PENYIAPAN BENIH	3
III. PEMBERSIHAN LAHAN	7
IV. PENANAMAN JAGUNG PADA PEMATANG.....	9
V. PENGOLAHAN LAHAN.....	11
VI. PEMASANGAN MULSA, PEMBUATAN LUBANG TANAM DAN JARAK TANAM SERTA PEMUPUKAN DASAR	13
VII. PEMBERIAN TRICHODERMA DAN PGPR SEBELUM TANAM	16
VIII. PENANAMAN.....	18
IX. PENANAMAN JAGUNG SUSULAN.....	20
X. PEMUPUKAN SUSULAN FASE VEGETATIF	22
XI. PEMELIHARAAN TANAMAN PADA FASE VEGETATIF DAN GENERATIF	24
XII. PEMUPUKAN SUSULAN FASE GENERATIF	27
XIII. PENGENDALIAN OPT	29
XIV. PENENTUAN WAKTU PEMANENAN	48
XV. PANEN	50
LAMPIRAN	52

DAFTAR GAMBAR

1. Proses Penyemaian Benih Cabai Besar dan Semaian yang ditutup Rain Shelter	6
2. Pemberian Kapur dan Lahan yang telah diolah	12
3. Mulsa yang telah Dipasang dan diberi Lubang Tanam	15
4. Penanaman Benih Cabai Besar	19
5. Pemasangan Ajir pada Tanaman Cabai Besar	26
6. Pengendalian Menggunakan Agensia Pengendali Hayati (APH)	32
7. Hama Thrips parvispinus Karny.	33
8. Kutu Kebul pada anaman Cabai Besar	35
9. Gejala Serangan Tungau di Lapang	36
10. Lalat Buah dan Gejala Serangan di Lapangan.	37
11. Ulat Grayak dan Gambar Perangkap Ngengat.	38
12. Serangan Ulat Tanah.	39
13. Serangan Layu Fusarium.	40
14. Antraknose pada Cabai Besar	42
15. Gejala serangan <i>Cercospora capsici</i>	44
16. Gejala Busuk Daun.....	45
17. Gejala Virus Kuning.....	46
18. Gejala Layu Bakteri.....	47
19. Cabai Besar yang siap Dipanen.....	49



I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Cabai besar termasuk dalam komoditas hortikultura strategis nasional. Pengembangan Kawasan Cabai besar menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan pengembangan kawasan cabai besar yang menyeluruh, fokus dan berkelanjutan dengan melakukan perbaikan teknologi budidaya tanaman, perlindungan tanaman, manajemen sarana dan prasarana budidaya tanaman, manajemen pasar serta pemberdayaan manusia (SDM) baik petani maupun petugas pertanian, lembaga-lembaga lain yang berkompeten.

Dalam perbaikan sistem budidaya dan sistem perlindungan tanaman untuk menjadikan tanaman tumbuh sehat dan produksi pada taraf tinggi, saat ini yang telah dianggap berhasil oleh pemerintah adalah dengan penerapan konsep dan prinsip Budidaya yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practice/GAP) dan pengendalian hama terpadu (PHT). Dimana secara politik dan hukum Budidaya yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices /GAP) Pengendalian/ Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia yang tertera di UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Perlu diketahui juga bahwa pada era globalisasi ekonomi, GAP dan PHT memperoleh dukungan kuat dari komunitas internasional dan pasar global. Untuk itu dalam budidaya dan perlindungan tanaman perlu penanganan yang serius dan fokus dalam memasyarakatkan GAP dan PHT, agar produk pertanian kita dapat diterima dan bersaing dipasaran.

Provinsi Jawa Timur termasuk kedalam daerah sentra produksi komoditas cabai besar di Indonesia. Pada tahun 2023 kontribusi produksi cabai besar provinsi Jawa Timur terhadap

nasional menempati peringkat kedua dengan produksi sebesar 85.444 ton atau sebesar 21,74% terhadap produksi nasional dengan luas panen mencapai 8.412 ha. Sentra produksi komoditas cabai besar di Provinsi Jawa Timur tersebar di beberapa wilayah diantaranya Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jember.

Komoditas cabai besar di Kabupaten Lumajang saat ini termasuk kedalam daerah penyangga daerah sentra. Perkembangan komoditas cabai besar di Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 mencapai 5.236 ton dengan luas area panen mencapai 383 Ha. Pengembangan Komoditas cabai besar dilakukan di Kabupaten Lumajang karena dinilai memiliki kondisi alam yang sesuai dengan syarat tumbuh komoditas cabai besar agar pertumbuhannya optimum seperti dengan ketinggian 300 mdpl dengan suhu udara 29 - 32°C, lahan tidak ternaungi dan tersedia sumber air.

Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Budidaya Cabai Besar di Kabupaten Lumajang ini diharapkan dapat menjadi acuan budidaya cabai besar yang baik dan benar spesifik lokasi sehingga dapat meningkatkan mutu dan produksi tanaman cabai besar.

2. Tujuan

Menyediakan acuan teknis teknologi budidaya cabai besar yang baik dan benar dalam rangka menghasilkan cabai besar yang bermutu sesuai standard yang telah ditetapkan

3. Target

Target yang akan dicapai melalui penerapan SOP budidaya Cabai Besar di Kabupaten Lumajang adalah:

1. Produktivitas buah cabai besar sebesar 12 ton/ha

2. Kualitas yang diterima pasar 30% kelas Super, sedangkan 50% Kelas Super Tanggung dan 20% Kelas Tanggung



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

BUDIDAYA CABAI BESAR (*Capsicum annuum L.*)

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemilihan Lokasi"	Halaman 1/2	Revisi 	Disahkan Tim Penyusun

I. PEMILIHAN LOKASI

A. Definisi

Memilih lokasi tanam yang sesuai dengan persyaratan tumbuh Cabai Besar untuk mencegah kegagalan proses produksi, serta dapat menghasilkan Cabai Besar sesuai dengan target yang ditetapkan.

B. Tujuan

Agar diperoleh lahan yang sesuai dengan persyaratan tumbuh untuk budidaya Cabai Besar.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT, PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemilihan Lokasi"	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Data klimatologi untuk mengetahui curah hujan dan suhu udara.
2. pH meter untuk mengukur kemasaman tanah.
3. Data topografi daerah untuk mengetahui ketinggian tempat.
4. Alat tulis dan blanko isian untuk mencatat semua kegiatan.

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Mencari data klimatologi di Kabupaten Lumajang
2. Mengukur pH tanah dengan pH meter.
3. Mencari data topografi di Kecamatan Pronojiwo
4. Melakukan pencatatan semua kegiatan

F. Sasaran

Terpilihnya lokasi pertanian yang sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman cabai besar dengan kriteria sebagai berikut :

1. Dataran tinggi 650 - 750 mdpl.
2. pH tanah 5,5 – 6 serta berdrainase baik.
3. Suhu berkisar 20 – 30 °C.
4. Lahan yang digunakan bukan bekas lahan tanaman lain yang masih termasuk *solanaceae* atau keluarga terong-terongan seperti kentang, tomat, dan terung.
5. Lahan tidak ternaungi
6. Tersedia sumber air

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemilihan dan Penyiapan Benih"	Halaman 1/4	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

II. PEMILIHAN DAN PENYIAPAN BENIH

A. Definisi

Menyiapkan benih yang sehat, bermutu, bersertifikat, dan berlabel sebagai bahan benih dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu.

B. Tujuan

Mendapatkan benih yang sehat dan bermutu/berkualitas sebagai bahan benih dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu (memiliki keseragaman dan kekuatan tumbuh yang tinggi serta sehat dan benar pemilihan varietas).

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Benih bermutu dan berlabel (hologram) sebanyak 12 pack/ha
2. ZPT
3. Rumah Kasa/Sungkup Plastik

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemilihan dan Penyiapan Benih"	Halaman 2/4	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

4. Media pembenihan berupa Tanah, Humus dan Bokashi.
5. Kantong plastik (diameter 5 cm) untuk penyemaian di kantong plastik
6. Agens hayati PGPR (5 - 6 cc/10 liter), Trichoderma (5 - 6 cc/10 liter)
7. Insektisida bahan aktif abamectin (1-2 cc/liter) diberikan ketika populasi hama diatas ambang kendali
8. Plastik krodong UV transparan (untuk rain selter)
9. Bambu
10. Likat kuning dan likat biru
11. Bayam Duri.
12. Alat Tulis dan Blanko pengisian untuk melakukan pencatatan.

E. Prosedur Pelaksanaan

Siapkan benih Cabai Besar bersamaan dengan pengolahan tanah, sehingga ketika lahan sudah siap, benih sudah memungkinkan untuk ditanam.

1. Sterilisasi Rumah Kasa
 - a. Semprot insektisida spirotetramat + imidokloprid (1,0 ml/liter.
 - b. Kemudian pasang perangkat kuning untuk memantau *Bemisia tabaci* sampai populasi nol

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemilihan dan Penyiapan Benih"	Halaman 3/4	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

2. Persiapan Media Pembenihan

- a. Lakukan persiapan media pembenihan dengan campuran tanah dan Bokashi dengan perbandingan 1:1, media pembenihan harus terbebas dari segala macam sumber penyakit, karena itu harus steril.
- b. Aplikasi Trichoderma dan PGPR pada media semai (Trichoderma dan PGPR 5-6 cc/10 liter setiap hari)

3. Proses Pembenihan

- a. Sebelum disemai, benih cabai direndam dahulu dalam air hangat 50 °C selama 30 menit atau larutan PGPR/Trichoderma (20-30 ml/liter) selama maksimal 30 menit lalu dengan larutan ZPT selama 15 menit, lalu ditiriskan dan langsung disemai, dan direndam
- b. Apabila Teknis Pembenihan menggunakan babybag, maka benih harus di tanam satu persatu ke dalam babybag yang telah berisi media tanam.
- c. Aplikasi Agens Hayati PGPR dan Trichoderma setiap 1 hari sekali dosis 5-6 cc/10 liter setiap sore untuk mengurangi serangan OPT di persemaian.
- d. Ketika persemaian berumur 2-3 minggu (3 daun sejati) dilakukan imunisasi dengan menggunakan inducer daun bayam berduri.
- e. Lakukan pemeliharaan saat proses pembenihan, terutama gulma, serangan hama dan penyakit serta penyiraman.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemilihan dan Penyiapan Benih"	Halaman 4/4	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

- f. Lakukan pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida kimia jika populasi diatas ambang kendali
- g. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang digunakan.

F. SASARAN

Disiapkannya benih bermutu dari varietas unggul



Gambar 1. Proses Penyemaian Benih Cabai Besar dan Semaian yang ditutup Rain Shelter

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pembersihan Lahan"	Halaman 1/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

III. PEMBERSIHAN LAHAN

A. Definisi

Membersihkan lahan dari dari bebatuan, gulma, dan sisa tanaman lain sampai lahan siap untuk ditanami.

B. Tujuan

Mendapatkan lahan yang terbebas dari bebatuan, gulma, dan sisa tanaman lain serta sesuai untuk pertanaman cabai besar.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Sabit untuk memotong dan membersihkan semak yang dapat menghalangi pertumbuhan tanaman muda.
2. Cangkul untuk membersihkan tanah dari rumput dan sisa-sisa tanaman yang tertinggal serta untuk mengolah tanah.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pembersihan Lahan"	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

3. Cultivator untuk mencacah tanah
4. Untuk mengendalikan rumput/tanaman pengganggu dapat digunakan herbisida.
5. Alat tulis dan Blanko pengisian untuk melakukan pencatatan

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Bersihkan lahan dari batu-batuan, gulma, semak yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dengan menggunakan cangkul
2. Sisa-sisa tanaman dibersihkan atau dibakar
3. Batu-batuan dikumpulkan dan dibuang pada tempat tertentu yang aman di luar areal tanam.
4. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang digunakan

F. Sasaran

Tersedianya lahan untuk pertanaman cabai besar yang bersih dari bebatuan, gulma dan sisa-sisa tanaman lain sehingga pertumbuhan optimal.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Penanaman Jagung Pada Pematang"	Halaman 1/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

IV. PENANAMAN JAGUNG PADA PEMATANG

A. Definisi

Menanam tanaman jagung untuk membuat habitat musuh alami sehingga musuh alami populasinya meningkat.

B. Tujuan

Mengendalikan serangga hama yang migrasi dari sisa tanaman yang telah terolah dan meningkatkan keanekaragaman hayati.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Benih jagung
2. Tugal untuk membuat lubang tanam guna menebar benih jagung


Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Penanaman Jagung Pada Pematang"	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Semaikan benih jagung sebelum ditanam di pematang sawah
2. Siapkan tugal dan benih jagung
3. Pematang/galengan ditugal dengan jarak 20x20 cm kemudian benih jagung dimasukkan lubang tanam sampai semua pematang ditanami jagung

F. Sasaran

Semua pematang telah ditanami jagung



Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengolahan Lahan"	Halaman 1/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

V. PENGOLAHAN LAHAN

A. Definisi

Membuat lahan pertanian dengan cara mengolah tanah hingga gembur dan membuat bedengan sesuai dengan kondisi lapang.

B. Tujuan

Agar diperoleh lahan pertanian yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Pupuk organik 10 – 15 ton/ha
2. Kapur Pertanian 1 ton/ha untuk meningkatkan pH sebesar 0,5
3. Cultivator untuk mengolah tanah
4. Cangkul untuk membuat bedengan

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengolahan Lahan"	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

5. Meteran sebagai alat ukur menentukan ukuran calon bedengan dan parit.
6. Tali dan patok kayu untuk meluruskan bedengan
7. Alat tulis dan blanko isian

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Mengolah lahan sampai tanah menjadi gembur dengan menggunakan cultivator dan dipetak petak dengan sebelumnya diberi Pupuk Organik (pupuk kandang dan kompos) 10 - 15 ton/ha, trichoderma cair 2 liter/ton.
2. Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 100 cm (lebar mulsa 120 cm) dan panjang menyesuaikan lahan.
3. Tinggi bedengan pada musim kemarau 20 – 25 cm, pada musim hujan 30 – 35 cm.
4. Pengolahan lahan dilakukan 25 - 30 hari sebelum tanam untuk memperbaiki keadaan tata udara dan aerasi tanah serta menghilangkan gas-gas beracun dan panas hasil dekomposisi sisa-sisa tanaman.
5. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang digunakan

F. Sasaran

Tersedianya bedengan untuk pertanaman Cabai Besar



Gambar 2. Pemberian Kapur dan Lahan yang telah diolah

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemasangan Mulsa, Pembuatan Lubang Tanam dan Jarak Tanam Serta Pemupukan Dasar"	Halaman 1/3	Revisi 	Disahkan Tim Penyusun

VI. PEMASANGAN MULSA, PEMBUATAN LUBANG TANAM DAN JARAK TANAM SERTA PEMUPUKAN DASAR

A. Definisi

Memasang mulsa plastik hitam perak dan membuat lubang tanam dengan jarak yang sesuai musimnya dan menambah nutrisi tanaman.

B. Tujuan

Agar diperoleh pemasangan mulsa yang baik dan lubang tanam dengan jarak yang sesuai rencana tanam serta menambah nutrisi tanaman.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
" Pemasangan Mulsa, Pembuatan Lubang Tanam dan Jarak Tanam Serta Pemupukan Dasar"	Halaman 2/3	Revisi 	Disahkan Tim Penyusun

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Pupuk Organik (pupuk kandang dan kompos) 10 - 15 ton/ha, trichoderma cair 2 liter /ton, NPK 15-15-15 150-200 kg/ha, SP36 150 - 200 kg/ha atau pupuk dengan kandungan phospat (P) 20% 150 – 200 kg/ha
2. Mulsa Plastik
3. Pasak penjepit bambu untuk menjepit mulsa hitam perak
4. Meteran/alat ukur
5. Besi dengan diameter 10 cm untuk membuat lubang tanam
6. Tugal untuk membuat lubang tanam
7. Alat Tulis dan Blanko pengisian untuk melakukan pencatatan

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Saat bedengan selesai 70 % lakukan pemupukan NPK 150-200 kg/ ha dan SP36 150 - 200 kg/ha atau pupuk dengan kandungan phospat (P) 20% 150 – 200 kg/ha, kemudian lahan dicangkul agar pupuk menyatu dengan tanah bedengan.
2. Pasang mulsa saat cuaca panas atau antara pukul 09.00 – 14.00 WIB, sebab dalam kondisi panas mulsa mudah mengembang bila ditarik kencang.
3. Kaitkan mulsa dengan pasak penjepit mulsa pada ujung-ujung bedengan kemudian rapikan sisi-sisi bedengan.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
" Pemasangan Mulsa, Pembuatan Lubang Tanam dan Jarak Tanam Serta Pemupukan Dasar"	Halaman 3/3	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

4. Sehari menjelang penanaman buat lubang tanam dengan menggunakan besi diameter 10 cm.
5. Buat jarak tanam sistem zig zag dengan ukuran 70 x 60 cm untuk musim penghujan dan sistem berhadapan dengan ukuran 60 x 50 cm untuk musim kemarau.
6. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang ditentukan

F. Sasaran Tersedianya lubang tanam dengan ukuran sesuai musim tanam



Gambar 3. Mulsa yang telah Dipasang dan diberi Lubang Tanam

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemberian Trichoderma dan PGPR Sebelum Tanam"	Halaman 1/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

VII. PEMBERIAN TRICHODERMA DAN PGPR SEBELUM TANAM

- A. Definisi
Memberi trichoderma dan PGPR ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan.
- B. Tujuan
Untuk mengoptimalkan pertumbuhan Cabai Besar.
- C. Validasi
 1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
 2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
 3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
 4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
 5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
 6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
 7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- D. Bahan, Alat dan Fungsi
 1. Trichoderma 20 – 30 cc/lt
 2. PGPR/Mol akar 20 - 30cc/liter
 3. Ember untuk membawa trichoderma dan PGPR

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
" Pemberian Trichoderma dan PGPR Sebelum Tanam"	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Larutkan trichoderma dan PGPR/mol akar pada air
2. Kocor larutan PGPR/mol akar dan Trichoderma pada lahan.

F. Sasaran

Semua lubang tanam sudah diberi larutan trichoderma dan PGPR/mol akar



Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Penanaman "	Halaman 1/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

VIII. PENANAMAN

A. Definisi

Membenamkan benih Cabai Besar kedalam lubang tanam yang telah disiapkan.

B. Tujuan

Mendapatkan lahan yang sudah ditanami benih cabai besar sesuai dengan jarak tanam yang ditentukan.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat Dan Fungsi

1. Benih Cabai Besar yang telah berdaun 4 - 5 helai sebagai calon tanaman.
2. Kebutuhan benih sebanyak 12.000-13.000 benih/ha
3. Wadah/nampan untuk benih (widig)
4. Alat Tulis dan Blanko pengisian untuk melakukan pencatatan

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Penanaman "	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Basahi bedengan pembenihan kemudian lakukan pencabutan benih secara hati-hati agar akar tanaman tidak rusak
2. Tanam benih satu persatu kedalam lubang yang tersedia
3. Dalam satu petak penanam harus seragam sehingga pertumbuhan dan produktivitasnya relatif seragam
4. Lakukan penyulaman segera pada tanaman yang mati pada minggu pertama atau minggu kedua, apabila lebih dari minggu ketiga perbedaan pertumbuhannya akan mencolok.
5. Penanaman dilakukan setelah umur benih 25 - 30 hari setelah semai
6. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang digunakan.

F. Sasaran

Benih cabai besar tertanam pada lokasi yang telah ditentukan.



Gambar 4. Penanaman Benih Cabai Besar

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Penanaman Jagung Susulan"	Halaman 1/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

IX. PENANAMAN JAGUNG SUSULAN

A. Definisi

Membuat habitat musuh alami sehingga musuh alami populasinya meningkat.

B. Tujuan

Meningkatkan keanekaragaman hayati.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat Dan Fungsi

1. Benih Jagung
2. Tugal untuk membuat lubang tanam guna menebar benih Jagung


Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Penanaman Jagung Susulan"	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Siapkan tugal dan benih jagung.
2. Pematang/galengan ditugal dengan jarak 20x20 cm kemudian benih jagung dimasukkan lubang tanam sampai semua pematang ditanami jagung (tanam jagung ke 2 setelah jagung pertama ber umur 60-75 hst)
3. Disarankan menanam border sebanyak 3x

F. Sasaran

Semua pematang telah ditanami Jagung berbagai umur



Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemupukan Susulan Fase Vegetatif"	Halaman 1/ 2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

X. PEMUPUKAN SUSULAN FASE VEGETATIF

A. Definisi

Menambah unsur hara di dalam tanah untuk memperbaiki kesuburan tanah. Penambahan bahan anorganik (Pupuk Kimia) dan pupuk organik cair pada fase Vegetatif.

B. Tujuan

Menyediakan unsur hara berupa pupuk anorganik dan pupuk organik cair yang dapat diserap untuk pertumbuhan tanaman.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. NPK (15-15-15) sebanyak 100-150kg/Ha , KNO₃ Merah sebanyak 10kg/Ha;
NPK (15-15-15) sebanyak 25kg/Ha untuk ramah lingkungan, KCl 110 kg/Ha, Asam Humat 10 kg/Ha;
2. PGPR/Mol Akar 160 liter/Ha

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemupukan Susulan Fase Vegetatif "	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

3. Jakaba 160 liter/Ha
 4. Drum Plastik 200 Liter sebagai tempat pupuk dan menggangkut pupuk ke lahan;
 5. Alat tulis dan blanko isian
- E. Prosedur Pelaksanaan
1. Pupuk KNO₃ merah dilarutkan sebanyak 2 kg/200 liter, kemudian di kocorkan ke akar sebanyak 200 cc/tanaman setelah umur 10 -30 hst setiap 10 hari
 2. Pupuk NPK dilarutkan sebanyak 2 kg/200 liter, kemudian di kocorkan ke lubang khusus nutrisi sebanyak 200 cc/lubang setelah umur 10 -40 hst setiap 10 hari
 3. Untuk pemupukan ramah lingkungan : NPK 1kg, asam humat 20gr, PGPR 5 liter, Jakaba 5 liter, di larutkan bersama dalam 200 liter air dan di berikan ke lubang nutrisi sebanyak 200cc, di berikan setiap 7 hari sekali dimulai umur 15 hst – 40 hst
 4. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang digunakan
- F. Sasaran
- Pupuk telah diaplikasikan di lokasi pertanaman secara tepat (waktu, dosis, cara dan jenis)

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemeliharaan Tanaman Pada Fase Vegetatif dan Generatif"	Halaman 1/3	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

XI. PEMELIHARAAN TANAMAN PADA FASE VEGETATIF DAN GENERATIF

A. Definisi

Melakukan pemeliharaan serta membersihkan gulma pada pangkal pohon, pada selokan lahan pertanian dan melakukan perempelan/membersihkan tunas air, daun, bunga, buah atau bagian tanaman lain yang rusak /berpenyakit dan pemasangan ajir.

B. Tujuan

Agar kebersihan lahan tetap terjaga, sinar matahari bisa masuk ke lahan sehingga dapat mengurangi kelembaban udara dilahan dan dengan pemasangan ajir maka tanaman tidak mudah roboh sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman optimal

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemeliharaan Tanaman Pada Fase Vegetatif dan Generatif"	Halaman 2/3	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Cangkul untuk memperbaiki bedengan
2. Ajir setinggi 1,5 m (25 cm ditancapkan dalam tanah)
3. Tali rafia digunakan untuk pengikatan tanaman cabai dengan ajir dan menopang batang tanaman agar tidak patah
4. Alat Tulis dan Blanko pencatatan untuk melakukan pencatatan.

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Persiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeliharaan yang meliputi penyiangan diselokan.
2. Bersihkan gulma yang tumbuh disekitar lubang tanam
3. Lakukan Pewiwilan setelah umur tanaman 20-30 hari kemudian dilakukan pewiwilan kembali pada umur 40-45 hari
4. Bakar daun yang busuk/mati terkena penyakit agar tidak menular pada tanaman yang sehat.
5. Lakukan pemasangan ajir dengan sistem tegak, dengan panjang mengikuti tinggi tanaman
6. Setelah ajir terpasang dan agar tanaman tidak mudah roboh, maka ikat tanaman cabai dengan tali rafia yang dihubungkan dengan ajir.
7. Lakukan terus pengikatan ini mengikuti pertumbuhan tinggi tanaman cabai
8. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang digunakan

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
" Pemeliharaan Tanaman Pada Fase Vegetatif dan Generatif"	Halaman 3/3	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

F. Sasaran
Memberi kesempatan pada tanaman Cabai Besar
berkembang dengan optimal



Gambar 5. Pemasangan Ajir pada Tanaman Cabai Besar

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemupukan Susulan Fase Generatif"	Halaman 1/ 2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

XII.PEMUPUKAN SUSULAN FASE GENERATIF

A. Definisi

Menambah unsur hara di dalam tanah untuk memperbaiki kesuburan tanah. Penambahan nutrisi tanaman pada fase Generatif.

B. Tujuan

Menyediakan unsur hara yang dapat diserap untuk pembentukan bunga dan buah.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. NPK (15-15-15) sebanyak 300 kg/Ha, KCL 100 kg/Ha, KNO3 putih 20 kg/Ha
Pemupukan ramah lingkungan : NPK (15-15-15) sebanyak 25kg/Ha, KCl 220 kg/Ha, Asam Humat 10 kg/Ha, Jakaba 15 Liter, PGPR 10 Liter;

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pemupukan Susulan Fase Generatif"	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

2. Mono Kalium Phosphate 1 kg / Ha
3. Drum Plastik 200 Liter sebagai tempat pupuk dan menggangkut pupuk ke lahan
4. Alat tulis dan blanko isian

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Pupuk KNO₃ merah dilarutkan sebanyak 2 kg/200 liter, kemudian di kocorkan ke akar sebanyak 200 cc/tanaman setelah umur 10 -30 hst setiap 10 hari
2. Pupuk NPK dilarutkan sebanyak 2 kg/200 liter, kemudian di kocorkan ke lubang khusus nutrisi sebanyak 200 cc/lubang setelah umur 10 -40 hst setiap 10 hari
3. MKP disemprotkan dengan sprayer 16 Liter dengan spray halus, mulai dari umur 50-80 hst setiap 10 hari sekali
4. Untuk pemupukan ramah lingkungan : NPK 1kg, asam humat 20gr, PGPR 5 liter, Jakaba 5 liter, di larutkan bersama dalam 200 liter air dan di berikan ke lubang nutrisi sebanyak 200cc, di berikan setiap 7 hari sekali dimulai umur 15 hst – 40 hst

F. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang digunakan

G. Sasaran

Pupuk telah diaplikasikan di lokasi pertanaman secara tepat (waktu, dosis, cara dan jenis)

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 1/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

XIII. PENGENDALIAN OPT

A. Definisi

Tindakan yang dilakukan untuk menekan kerugian pada budidaya tanaman cabai besar yang diakibatkan oleh OPT dengan cara memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan.

B. Tujuan

Mengurangi resiko kehilangan hasil dan meningkatkan mutu serta menjaga kelestarian lingkungan.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Bahan pengendali OPT (PGPR 20 – 30 cc/liter, Trichoderma 20 – 30 cc/liter, pestisida nabati (minyak sereh) 1 – 2 cc/liter, dan APH 20 – 30 cc/liter) untuk mengendalikan OPT.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 2/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

2. Pestisida kimia (Abamektin untuk kutu-kutuan, imidakloprid, dan mankozeb) sebanyak 1 – 2 ml/liter
3. Air untuk pelarut dan pencampur pestisida nabati dan pestisida kimia.
4. Ember untuk tempat mencampur pestisida nabati dan pestisida kimia dengan air.
5. Pengaduk untuk mengaduk pestisida nabati dan pestisida kimia supaya larut dalam air.
6. Sprayer untuk menyemprot pestisida nabati dan pestisida kimia ke tanaman.
7. Sarung tangan untuk melindungi tangan dari pestisida.
8. Topi untuk melindungi kepala dari pestisida.
9. Masker untuk melindungi alat pernafasan dari pestisida.
10. Kacamata untuk melindungi mata dari pestisida.
11. Alat tulis dan blangko isian untuk mencatat semua kegiatan.

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Melakukan pengamatan secara rutin (seminggu sekali) dan mengutamakan pengendalian secara fisik/mekanis dan kultur teknis (tanaman yang terserang dicabut, dibuang, dikubur atau dibakar sejauh mungkin dari lokasi kebun).
2. Mengendalikan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) dengan Agensi Hayati atau pestisida Nabati serta pestisida kimia merupakan alternatif terakhir secara selektif dan bijaksana. Pestisida nabati dan pestisida kimia tidak boleh dicampur saat pengaplikasian.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 3/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

3. Penyemprotan harus dihentikan minimal 2 minggu sebelum panen.
4. Bila menggunakan pestisida waktu pencampuran dengan air dilakukan secara hati-hati dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. (5 Tepat : Tepat Jenis, Tepat Dosis, Tepat Konsentrasi, Tepat Alat, Tepat Waktu, Tepat Cara Pengendalian)
5. Memusnahkan botol atau kaleng bekas wadah pestisida di tempat pembuangan limbah atau dikubur dalam tanah yang jauh dari sumber air.
6. Mencuci peralatan yang telah digunakan dan limbah pencucian dibuang ke dalam bak peresapan, jangan sampai mencemari sumber air.
7. Pekerja yang melakukan penyemprotan sebaiknya mendapatkan pelatihan mengenai tata cara penggunaan alat semprot atau sudah berpengalaman.
8. Pekerja yang melakukan penyemprotan dilengkapi peralatan pelindung tubuh seperti masker, kacamata, sarung tangan, topi, sepatu boot dan pakaian panjang.
9. Membersihkan seluruh badan dengan sabun dan air bersih setelah selesai melakukan penyemprotan.
10. Tidak Makan, minum atau merokok saat penyemprotan pestisida
11. Lakukan pencatatan semua kegiatan sesuai dengan format yang sudah disediakan.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 4/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

F. Sasaran

Mengurangi resiko kehilangan hasil dan meningkatkan mutu serta menjaga kelestarian lingkungan.



Gambar 6. Pengendalian Menggunakan Agenia Pengendali Hayati (APH)

HAMA TANAMAN CABAI BESAR

1. Kutu Thrips (*Thrips parvispinus* Karny.)

Ordo : Thysanoptera

Famili : Thripidae

a. Tanaman inang

Aneka cabai, mentimun, terong, labu, tomat, tembakau, blewah dan semangka

b. Gejala serangan

1. Adanya noda keperakan yang tidak beraturan pada daun muda;
2. Noda keperakan akan berubah menjadi coklat tembaga dan daun mengeriting ke atas;
3. Penyebarannya dibantu oleh angin;

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 5/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

Gambar hama trips terlihat pada **Gambar 1.**



Gambar 7. Hama Thrips parvispinus Karny.

c. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan kultur teknis sebagai berikut

- Tanam serentak dengan selisih waktu kurang dari dua minggu antar blok untuk menghindari serangan trips terus menerus agar tanaman muda tidak rusak parah;
- Menggunakan pestisida nabati/agen hayati (*Beauveria* sp.) sebagai pengendalian untuk serangan dengan skala kecil;
- Apabila serangan telah mencapai 10% dapat dilakukan penyemprotan dengan pestisida efektif sesuai dosis anjuran, yaitu penyemprotan insektisida secara bergilir khusus untuk mengendalikan hama trips berbahan aktif Merkapto dimetur (Mesurol 50 WP) 1-2 gr/L, fipronil (regent 50 SC 1-1,5 ml/L), Abamektin (Agrimex 18 EC 0,5 cc/l), Protiofos (Tokuthion 500 EC 1 cc/l), Imidakloprid;

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 6/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

2. Kutu Kebul (*Bemisia tabaci*)

a. Gejala Serangan

Gejala kerusakan berupa bercak nekrotik pada daun akibat rusaknya sel-sel dan jaringan daun. Ekskresi kutu kebul menghasilkan madu sehingga merupakan media baik untuk tumbuhnya embun-jelaga pada permukaan daun.

b. Pengendalian

- Kultur teknis
 - Pengaturan jarak tanam
 - Sanitasi kebun dengan cara penyiangan gulma
 - Dengan penanaman tanaman pinggiran sebagai penghalang atau barrier (tanaman bunga matahari, kenikir), menanam tanaman jagung/ kacang-kacangan.
- Mekanis
 - Eradikasi tanaman yang sakit dan tanaman sumber serangan secara selektif dicabut dan dimusnahkan
 - Untuk mengurangi populasi *Bemisia* bisa dibuat *yellowtrap* (perangkap kuning)
- Pestisida
 - Aplikasi pestisida nabati dilakukan sebelum terjadi serangan
 - Menggunakan agens hayati (*Vertisilium sp*)
 - Pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia dengan dosis sesuai anjuran Kementerian Pertanian bila diperlukan

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 7/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun



Gambar 8. Kutu Kebul pada anaman Cabai Besar

3. Tungau (*Polyphagotarsonemus latus* Banks)

a. Gejala Serangan

Hama ini mengisap cairan tanaman sehingga menyebabkan perubahan bentuk pada tanaman menjadi abnormal, daun menebal, terpuntir ke bawah, daun menjadi , bunga gugur, warna daun berubah menjadi tembaga/ kecoklatan.

b. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan mengaplikasikan pestisida dengan teknis sebagai berikut:

- Aplikasi pestisida nabati bila perlu gunakan insektisida anjuran
- Akarisida dengan bahan aktif propagit

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 8/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun



Gambar 9. Gejala Serangan Tungau di Lapangan

4. Lalat Buah (*Bactrocera spp*)

a. Gejala Serangan

Pada bagian pangkal buah terdapat titik hitam bekas tusukan tempat lalat buah dewasa meletakkan telur. Pada umumnya lalat buah meletakkan telur pada buah yang tersembunyi, buah yang masih lunak dan agak kasar. Setelah telur menetas menjadi larva memakan daging buah bagian dalam sehingga buah menjadi busuk dan akhirnya jatuh.

b. Pengendalian

- Mekanis
 - Pengumpulan buah terserang dan pembenaman tanaman sakit kedalam tanah
 - Penggunaan perangkat petrogenol sejak mulai tanam

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 9/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

- Pestisida
 - Penyemprotan pestisida nabati, biopestisida atau pestisida kimia sesuai anjuran



Gambar 10. Lalat Buah dan Gejala Serangan di Lapangan.

5. Ulat Grayak (*Spodophptera litura*)

a. Gejala Serangan

Larva yang masih kecil makan daun sehingga tinggal sisa-sisa epidermisnya/transparan atau daun berlubang kecil-kecil sehingga tinggal tulang daunnya saja. Larva yang besar selain memakan daun juga memakan buah hingga berlubang.

b. Pengendalian

- Mekanis
 - Pengumpulan kelompok telur ulat secara langsung
- Pestisida
 - Penyemprotan pestisida nabati, biopestisida atau pestisida kimia sesuai anjuran

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 10/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun



Gambar 11. Ulat Grayak dan Gambar Perangkap Ngengat.

6. Ulat Tanah (*Agrotis epsilon*)

a. Gejala Serangan

Tanaman yang masih muda/lunak terpotong dekat pangkal batang, potongan ini ditarik ke dalam tanah.

b. Pengendalian

- Mekanis
 - Pengumpulan kelompok telur ulat secara langsung
- Pestisida
 - Penyemprotan pestisida nabati, biopestisida atau pestisida kimia sesuai anjuran

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 11/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun



Gambar 12. Serangan Ulat Tanah.

PENYAKIT TANAMAN CABAI BESAR

1. Layu Fusarium (*Fusarium oxysporum* Hanz)

a. Tanaman inang

Fusarium sp., mempunyai kisaran inang: cabai, tomat, kentang, terung, kacang panjang, labu siam, kangkung, singkong, kedelai, kacang tanah, jahe, kencur, temulawak, temu kunci, tapak dara, melati, krisa, palm, jambu biji, duku, mangga, jeruk, rambutan, kenaf dan rosella;

b. Gejala serangan

Sasaran serangan adalah bagian dalam pembuluh kayu tanaman cabai. Infeksi awal terjadi di bagian pangkal leher batang tanaman yang berdekatan dengan tanah. Bagian tersebut membusuk dan berwarna coklat, serta akan menjalar

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 12/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

terus keperakaran dan menyebabkan akar membusuk. Pangkal leher batang akan membusuk kering, warna berubah menjadi putih keabu-abuan dan terbentuk spora cendawan yang aktif. Gejala yang ditunjukkan adalah layu dari tajuk kanopi tanaman bawah terus menjalar keatas termasuk ranting muda, warna berubah coklat dan mati. Seluruh tanaman menjadi layu dalam selang waktu 14 – 90 hari.

Cendawan ini mampu bertahan dan tumbuh berkembang baik pada temperatur sekitar 24-27°C, bahkan mampu bertahan sampai 37°C. Penyakit layu fusarium lebih banyak berkembang di dataran rendah di tanah yang berdrainase buruk.



Gambar 13. Serangan Layu Fusarium.

c. Pengendalian

1. Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang bukan inangnya atau tingkat keinangannya rendah (tanaman palawija).

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 13/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

1. Menggunakan pupuk organik dengan penambahan agens hayati *Trichoderma* pada setiap lubang tanam
2. Drainase dijaga sebaik mungkin
3. Memberi perlakuan benih dengan cara perendaman yang diberi Agen Hayati (PGPR) 20 – 30 cc/liter. Menjaga tanaman jangan sampai terluka akibat perlakuan sewaktu pemeliharaan maupun panen
4. Pada saat tanaman terkena serangan layu fusarium dilakukan eradikasi tanaman dengan cara dicabut, dibakar, dan dibuang jauh dari lahan

2. Antraknosa (*Collectotrichum gloeosporioides*)

a. Penyebab

Colletotrichum capsici Sydow dan *Colletotrichum gloeosporioides* Pens.

b. Gejala Serangan

Penyakit ini bisa menyerang buah cabai. Terdapat bercak kehitaman pada buah yang kemudian meluas menjadi busuk kering. Serangan berat menyebabkan buah mengering dan keriput seperti jerami akibat infeksi. *Gloesporium piperatum* menyerang tanaman cabai mulai buah masih berwarna hijau dan menyebabkan *die back* (mati ujung). Pada kondisi lembab cendawan membentuk badan buah dalam lingkaran-lingkaran memusat berwarna Besar jambu.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 14/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

c. Pengendalian

1. Membakar semua buah cabai yang terserang dipanen setiap hari.
2. Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman bukan inang (tanaman palawija) pada musim tanam selanjutnya
3. Melakukan sanitasi dan pemusnahan tanaman sakit
4. Memberikan perlakuan benih sebelum ditanam yaitu dengan cara perendaman yang diberi Agen Hayati (PGPR dan Trichoderma) 20 – 30 cc/liter.
5. Aplikasi dengan Pestisida nabati dari bahan minyak sereh 1 – 2 cc/liter.
6. Perbaikan saluran drainase
7. Apabila masih ditemukan gejala serangan dapat dilakukan penyemprotan dengan fungisida efektif yang dianjurkan Mankozep (Dhitane M-45 80 WP) dosis 3 Sendok makan/17 L air, Klorotalonil (Daconil 75 WP) Dosis 3 Sendok makan/17 L air.



Gambar 14. Antraknose pada Cabai Besar

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 15/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

3. Cacar daun (*Cercospora capsici*)

a. Gejala

Gejala serangan pada daun berupa bercak kecil berbentuk bulat dan kering. Bercak nekrosis sampai diameter $\pm 0,5$ cm. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Bercak yang tua dapat menyebabkan lubang.

Apabila terdapat banyak bercak maka daun cepat menguning dan gugur atau gugur tanpa menguning terlebih dahulu. Bercak sering terdapat pada batang, tangkai daun, tangkai buah dan kadang-kadang dapat dijumpai menyerang di persemaian.

b. Pengendalian

- Kultur Teknis
 - Pengaturan jarak tanam
 - Sanitasi kebun
- Mekanis
 - Memusnahkan daun yang terserang
- Pestisida
 - Penyemprotan pestisida nabati, biopestisida atau pestisida kimia yang terdaftar dan dianjurkan oleh kementerian pertanian.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 16/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun



Gambar 15. Gejala serangan *Cercospora capsici*.

4. Busuk Daun (*Phytophthora capsici*)

a. Gejala

Gejala awal pada daun terdapat bercak putih tidak beraturan dan seperti tersiram air panas. Bercak kemudian melebar, mengering seperti kertas dan akhirnya memutih, kadang-kadang diliputi masa spora. Serangan pada buah mengakibatkan buah berwarna hijau tua dan busuk basah. Buah yang terserang secara keseluruhan akan mengering dan keriput.

b. Pengendalian

- Kultur teknis
 - Menghindari tanah terlalu becek
 - Pengurangan unsur N

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 17/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

- Mekanis
 - Memotong bagian tanam yang terserang
 - Apabila tidak bisa harus dilakukan eradikasi selektif
- Pestisida



Gambar 16. Gejala Busuk Daun

5. Virus Kuning (*Gemini virus*)

a. Gejala

Penyebab virus Gemini virus dari kelompok Begomo virus yang memiliki banyak kemiripan dengan tyleu dengan tomato *yellow leaf curl*. Gejala yang terlihat Helai daun mengalami *vein clearing* dimulai dari daun-daun pucuk, kemudian berkembang menjadi warna kuning. Tulang-tulang daun menebal dan daun menggulung ke atas, infeksi lanjut menyebabkan daun-daun mengecil dan berwarna kuning terang, tanaman kerdil dan tidak berbuah.

b. Pengendalian

- Kultur Teknis
 - Penggunaan bibit sehat
 - Rotasi tanaman

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 18/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

- Penggunaan paranet pada persemaian
- Tanaman perangkap diluar tanaman pokok
- Pengendalian serangga vektor (kutu kebul)
- Mekanis
 - Eradikasi(pemusnahan) tanaman terserang dan sumber serangan sampai umur tanaman 2 bulan
 - Pengendalian hama perantara/vektor (kutu kebul)
 - Penyemprotan Verticillium



Gambar 17. Gejala Virus Kuning

6. Layu Bakteri (*Pseudomonas solanacearum*)


a. Gejala

Tanaman layu dimulai dari pucuk (daun muda) menjalar ke daun bagian bawah sampai seluruh daun layu dan tanaman mati. Pada stadium lebih lanjut, bila batang dipotong akan keluar lendir bakteri berwarna putih susu. Lendir ini dapat dipakai untuk membedakan penyakit layu bakteri dengan layu Fusarium. Serangan pada buah menyebabkan warna buah menjadi kekuningan dan busuk. Infeksi terjadi melalui lenti sel dan akan lebih cepat berkembang bila ada luka mekanis (oleh gigitanhama dll). Penyakit berkembang dengan cepat pada musim hujan.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Pengendalian OPT"	Halaman 19/19	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

b. Pengendalian

- Kultur Teknis
 - Mengurangi penggunaan unsur N yang terlalu tinggi
 - Rotasi tanaman
- Mekanis
 - Eradikasi tanaman yang terserang



Gambar 18. Gejala Layu Bakteri.

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Penentuan Waktu Panen"	Halaman 1/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

XIV. PENENTUAN WAKTU PEMANENAN

A. Definisi

Memantau/melihat keadaan fisik tanaman untuk menentukan saat panen yang tepat

B. Tujuan

Mendapatkan mutu produksi buah cabai besar yang optimal.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT. Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT. PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Catatan waktu cabai besar untuk mengetahui umur tanaman dan menentukan saat panen.
2. Alat tulis dan blanko isian

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
" Penentuan Waktu Panen "	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Lakukan pengamatan secara periodik terhadap perkembangan fisik tanaman (terutama buah) maupun dokumentasi/catatan kebun lainnya.
2. Panen biasanya dilakukan setelah tanaman berumur 90 HST. Dengan ciri warna buah sudah merah mengkilat, kulit buah mulus, bentuk buah normal.
3. Panen dilakukan pada pagi hari dan ditampung dalam ember kemudian dimasukkan dalam karung, lalu dijual.
4. Melakukan panen cabai besar (buah sehat dan buah sakit), kemudian dilakukan penyortiran dan pemusnahan buah yang sakit.
5. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang digunakan

F. Sasaran

Tersedianya informasi saat panen



Gambar 19. Cabai Besar yang siap Dipanen

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Panen"	Halaman 1/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

XV.PANEN

A. Definisi

Proses pemetikkan buah Cabai Besar yang sudah menunjukkan ciri (sifat khusus) untuk dipanen (masak panen optimal).

B. Tujuan

Untuk memetik buah cabai merah yang siap panen.

C. Validasi

1. Kelompok tani Tlaten Tani, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang,
2. PPL dan Koordinator BPP Kecamatan Pronojiwo,
3. Petugas UPT, Proteksi TPH Jawa Timur,
4. Petugas UPT, PSB PTH Jawa Timur,
5. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang,
6. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur,
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

D. Bahan, Alat dan Fungsi

1. Sak/karung digunakan untuk tempat cabai yang sehat dan yang berpenyakit/rusak harus dipisah.
2. Timba/ember digunakan untuk wadah saat panen.
3. Tali untuk mengikat sak/karung.
4. Terpal untuk mengumpulkan hasil panen

Standar Operasional Prosedur	Prosedur Nomor: SOP CBR.LMJ	Tanggal 19-06-24	Dibuat Tim Penyusun
"Panen"	Halaman 2/2	Revisi	Disahkan Tim Penyusun

5. Alat tulis dan blanko pencatatan untuk melakukan pencatatan

E. Prosedur Pelaksanaan

1. Persiapkan peralatan panen seperti karung/sak, tali, dll.
2. Lakukan pemanenan buah cabai pada pagi hari setelah ada sinar matahari, sehingga embun yang menempel buah cabai sudah hilang.
3. Lakukan pemetikkan dengan mengikutsertakan tangkai buahnya dan dijaga tidak merusak ranting dan percabangan tanaman cabai.
4. Pilih buah yang dipanen masak optimal, tandanya buah berwarna merah atau merah tua,
5. Lakukan sortasi untuk buah yang sehat atau yang terkena hama penyakit.
6. Kematangan cabai sesuaikan dengan permintaan, lamanya penyimpanan dan lamanya transportasi kepasar
7. Lakukan pencatatan sebagaimana format yang digunakan

F. Sasaran

Terpanennya buah cabai besar



CONTOH FORM-FORM CATATAN KEGIATAN

Untuk memudahkan pelacakan dan konfirmasi kegiatan, maka dalam pembuatan form isian sebaiknya dilakukan berdasarkan blok. Bentuk form/tabel isian catatan kegiatan dapat dirubah dan disesuaikan dengan kondisi serta informasi yang dibutuhkan. Berikut disajikan contoh dari form/tabel isian yang dapat digunakan dalam pencatatan kegiatan.

1. Pemilihan Lokasi

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Kondisi Lahan		Riwayat Penggunaan	Ket
			Uraian	Satuan		
			- Ketinggian	 m dpl	Jenis tanaman Hama Penyakit	
			- Curah hujan tahunan	 mm/thn		
			- Suhu udara	 °C		
			- pH tanah			

2. Pemilihan dan Penyiapan Benih

Form A : Kegiatan Pemilihan Benih

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Informasi Tentang Benih	Perlakuan Tentang Benih	Ket
			Tgl beli/panen : Varietas : Jumlah : Sumber :	1. 2. 3.	

Form B : Kegiatan Penyiapan Benih

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Cara Penyiapan Benih	Perlakuan	Ket
			Tgl Penyiapan : Tgl Penyemaian :	- Jenis pengatur tumbuh : - Dosis pengatur tumbuh:	

3. Penyiapan Lahan

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Cara Penyiapan Lahan	Perlakuan Lahan	Ket
			- Alat pengolahan tanah - Ukuran bedengan/guludan - Jarak antar baris - Jarak antar tanaman	- Jenis Pupuk - Dosis - Waktu	

4. Penanaman

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Alat	Cara	Waktu Penanaman	Ket

5. Penyulaman

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Alat	Cara	Waktu Penyulaman	Ket

6. Penyiangan

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Alat	Cara	Waktu Penyiangan	Ket

7. Pemupukan dan Pembumbunan

Form A : Kegiatan Pemupukan

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Nama Pupuk	Dosis	Cara	Cuaca	Ket

Form B : Kegiatan Pembumbunan

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Fase Pertumbuhan	Alat	Cara	Waktu Pembedaan	Ket

8. Pengendalian OPT

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Disesuaikan dengan tabel PHT (checklist mingguan)

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Umur Tanaman	Jenis OPT	Intensitas Serangan	Pengendalian (Jenis dan Cara)	Ket.

9. Pemanenan

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Cara	Cuaca dan Waktu	Jumlah Hasil Panen	Ket

10. Pasca Panen

Nama Pemilik :

Alamat Lahan :

Tanggal	Petak	Luas (Ha)	Jumlah (kg)	Lokasi Pengeringan	Cara Pengeringan	Lama Pengeringan	Ket.



