



Calcolo integrale — Scheda di esercizi n. 7  
12 Maggio 2023 — Compito n. 00038

**Istruzioni:** le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella “**C**” serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data. Per selezionare una casella, annerirla completamente: ☐ (non ☐ o ☐).

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

Matricola:

--	--	--	--	--	--	--

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1A) L'equazione differenziale

$$y'(t) = 6t + 5t^2$$

è del secondo ordine.

1B) L'equazione differenziale

$$5y'(t)y''(t) + 6[y(t)]^3 = 0$$

è del secondo ordine.

1C) L'equazione differenziale

$$[\sin(5y'(t))]' = 0$$

è del secondo ordine.

1D) L'equazione differenziale

$$2ty^{(1)}(t) + 3t^2y^{(2)}(t) + 2t^3y^{(3)}(t) = 0$$

è del secondo ordine.

2) Si consideri l'equazione differenziale

$$y'(t) = 2y(t) + 5.$$

2A) L'equazione ha un numero finito di soluzioni.

2B) Esiste un'unica soluzione dell'equazione tale che  $y(0) = 6$ .

2C) Esiste un'unica soluzione dell'equazione tale che  $y(0) = 6$  e  $y'(0) = 12$ .

2D) Non esistono soluzioni dell'equazione tali che  $y(0) = 6$  e  $y'(0) = 17$ .

3) Si consideri il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y'(t) = e^{6t^2}, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

3A) Esiste un'unica soluzione di (1).

3B) La soluzione non si può scrivere esplicitamente in termini di funzioni elementari.

3C) Si ha  $y'(0) = 6$ .

3D) Si ha  $y''(0) = 0$ .

4) Si consideri il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y'(t) = -4y(t) + 12, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

4A) La funzione  $Qe^{4t}$  è soluzione dell'equazione omogenea associata all'equazione di (1) per ogni  $Q$  in  $\mathbb{R}$ .

4B) L'equazione di (1) ha come soluzione

$$y(t) = -3.$$

4C) Si ha  $y''(0) = 48$ .

4D) Si ha

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 3.$$

Docente

- ☐ DelaTorre Pedraza  
☐ Orsina

--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome

Nome

Matricola

Compito 00038

---

5) Si consideri l'equazione differenziale del primo ordine

(1)

$$y'(t) = f(t).$$

Scrivere tutte le soluzioni di (1) se

$$\text{a) } f(t) = 6t + 7, \quad \text{b) } f(t) = \cos(5t), \quad \text{c) } f(t) = (2t + 9)e^t, \quad \text{d) } f(t) = \frac{5t}{1 + 6t^2}.$$

---

--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome

Nome

Matricola

Compito 00038

---

6) Si consideri il problema di Cauchy

(1) 
$$\begin{cases} y'(t) = 2y(t) - 3, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

- a) Quante soluzioni ha l'equazione di (1)? E quante soluzioni ha (1)?  
b) Scrivere l'equazione omogenea associata all'equazione di (1), e scriverne tutte le soluzioni.  
c) Trovare una soluzione particolare dell'equazione di (1).  
d) Scrivere tutte le soluzioni dell'equazione di (1) e la soluzione di (1).
-

## Soluzioni del compito 00038

1) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

---

Ricordiamo che un'equazione differenziale si dice di ordine  $n \geq 1$  se la derivata di ordine massimo della funzione incognita  $y(t)$  è la derivata  $y^{(n)}(t)$ .

---

1A) L'equazione differenziale

$$y'(t) = 6t + 5t^2$$

è del secondo ordine.

**Falso:** Infatti vi compare la derivata prima di  $y(t)$ , e non derivate di ordine superiore.

---

1B) L'equazione differenziale

$$5y'(t)y''(t) + 6[y(t)]^3 = 0$$

è del secondo ordine.

**Vero:** Infatti vi compare la derivata seconda di  $y(t)$ , e non derivate di ordine superiore.

---

1C) L'equazione differenziale

$$[\sin(5y'(t))]' = 0$$

è del secondo ordine.

**Vero:** Infatti, derivando si ha

$$5 \cos(5y'(t))y''(t) = 0,$$

e quindi l'equazione è del secondo ordine.

---

1D) L'equazione differenziale

$$2ty^{(1)}(t) + 3t^2y^{(2)}(t) + 2t^3y^{(3)}(t) = 0$$

è del secondo ordine.

**Falso:** Infatti vi compare la derivata terza di  $y(t)$ , e non derivate di ordine superiore.

---

2) Si consideri l'equazione differenziale

$$y'(t) = 2y(t) + 5.$$

---

**2A)** L'equazione ha un numero finito di soluzioni.

**Falso:** Essendo un'equazione del primo ordine, ha infinite soluzioni, dipendenti da un'unica costante reale.

---

**2B)** Esiste un'unica soluzione dell'equazione tale che  $y(0) = 6$ .

**Vero:** Assegnando la condizione iniziale  $y(0) = 6$  si ottiene un problema di Cauchy, che ha un'unica soluzione.

---

**2C)** Esiste un'unica soluzione dell'equazione tale che  $y(0) = 6$  e  $y'(0) = 12$ .

**Falso:** Se  $y'(0) = 6$ , sostituendo nell'equazione si ha

$$y'(0) = 2y(0) + 5 = 2 \cdot 6 + 5 = 17 \neq 12,$$

e quindi non esiste alcuna soluzione dell'equazione che verifica le due condizioni assegnate.

---

**2D)** Non esistono soluzioni dell'equazione tali che  $y(0) = 6$  e  $y'(0) = 17$ .

**Falso:** Sappiamo già che esiste un'unica soluzione dell'equazione tale che  $y(0) = 6$  (si veda la domanda **2B**). Dall'equazione, scritta per  $t = 0$ , si ricava

$$y'(0) = 2y(0) + 5 = 2 \cdot 6 + 5 = 17,$$

e quindi la seconda condizione è automaticamente verificata.

---

**3)** Si consideri il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y'(t) = e^{6t^2}, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

---

Integrando tra 0 e  $s$  si ha, per il Teorema fondamentale del calcolo integrale:

$$y(s) - y(0) = \int_0^s y'(t) dt = \int_0^s e^{6t^2} dt,$$

da cui, ricordando che  $y(0) = 0$ , segue che l'unica soluzione del problema di Cauchy è data da:

$$(2) \quad y(s) = \int_0^s e^{6t^2} dt.$$

---

**3A)** Esiste un'unica soluzione di (1).

**Vero:** Trattandosi di un problema di Cauchy, esiste un'unica soluzione (si veda anche (2)).

---

**3B)** La soluzione non si può scrivere esplicitamente in termini di funzioni elementari.

**Vero:** La soluzione è data da (2), e l'integrale non si sa calcolare esplicitamente.

---

**3C)** Si ha  $y'(0) = 6$ .

**Falso:** Sostituendo  $t = 0$  nell'equazione si trova

$$y'(0) = e^{6 \cdot 0^2} = 1 \neq 6.$$

---

**3D)** Si ha  $y''(0) = 0$ .

**Vero:** Derivando l'equazione si ha

$$y''(t) = [y'(t)]' = [e^{6t^2}]' = 12t e^{6t^2},$$

da cui segue che

$$y''(0) = 12 \cdot 0 \cdot e^{6 \cdot 0^2} = 0.$$

---

4) Si consideri il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y'(t) = -4y(t) + 12, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

---

L'equazione omogenea associata all'equazione di (1) è

$$(2) \quad y'(t) = -4y(t).$$

---

**4A)** La funzione  $Qe^{4t}$  è soluzione dell'equazione omogenea associata all'equazione di (1) per ogni  $Q$  in  $\mathbb{R}$ .

**Falso:** Se  $y(t) = Qe^{4t}$ , allora

$$y'(t) = Q \cdot 4e^{4t} = 4 \cdot [Qe^{4t}] = 4y(t) \neq -4y(t),$$

e quindi la funzione proposta non risolve la (2), ovvero l'equazione omogenea associata all'equazione di (1).

---

**4B)** L'equazione di (1) ha come soluzione

$$y(t) = -3.$$

**Falso:** Sostituendo  $y = -3$  nell'equazione di (1) si ha

$$0 \neq 12 = -4 \cdot (-3) + 12,$$

e quindi  $y(t) = -3$  non è soluzione dell'equazione.

---

**4C)** Si ha  $y''(0) = 48$ .

**Falso:** Iniziamo con l'osservare che dall'equazione, e dalla condizione iniziale, segue che

$$y'(0) = -4y(0) + 12 = -4 \cdot 0 + 12 = 12.$$

Inoltre, derivando l'equazione si ha

$$y''(t) = -4y'(t),$$

e quindi

$$y''(0) = -4y'(0) = -4 \cdot 12 = -48 \neq 48.$$

---

**4D)** Si ha

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 3.$$

**Vero:** Sappiamo, dalle domande **4A** e **4B** che  $y_0(t) = Qe^{-4t}$  è soluzione dell'equazione omogenea associata (qualsiasi sia  $Q$  numero reale) e che  $\bar{y}(t) = 3$  è soluzione (particolare) dell'equazione. Per la teoria generale delle equazioni lineari, le funzioni della forma

$$y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t) = Qe^{-4t} + 3$$

sono tutte e sole le soluzioni dell'equazione di (1). Assegnando la condizione iniziale, si trova

$$0 = y(0) = Q + 3,$$

da cui  $Q = -3$ . Ne segue che

$$y(t) = -3e^{-4t} + 3 = 3(1 - e^{-4t})$$

è l'unica soluzione del problema di Cauchy (1), ed è tale che

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 3(1 - e^{-4t}) = 3.$$

---

5) Si consideri l'equazione differenziale del primo ordine

$$(1) \quad y'(t) = f(t).$$

Scrivere tutte le soluzioni di (1) se

$$\mathbf{a)} \ f(t) = 6t + 7, \quad \mathbf{b)} \ f(t) = \cos(5t), \quad \mathbf{c)} \ f(t) = (2t + 9)e^t, \quad \mathbf{d)} \ f(t) = \frac{5t}{1 + 6t^2}.$$

---

**Soluzione:**

L'equazione differenziale  $y'(t) = f(t)$  si può riformulare così: “la funzione  $y(t)$  è una primitiva di  $f(t)$ .” Pertanto, trovare tutte le soluzioni di (1) è equivalente a trovare tutte le primitive di  $f(t)$ , ovvero — come è noto... — è equivalente ad integrare  $f(t)$ .

**a)** Dato che

$$\int [6t + 7] dt = 3t^2 + 7t,$$

si ha che tutte le soluzioni di (1) sono date da

$$y(t) = 3t^2 + 7t + c,$$

con  $c$  costante arbitraria.

**b)** Dato che

$$\int \cos(5t) dt = \frac{\sin(5t)}{5},$$

si ha che tutte le soluzioni di (1) sono date da

$$y(t) = \frac{\sin(5t)}{5} + c,$$

con  $c$  costante arbitraria.

**c)** Dato che, integrando per parti,

$$\int (2t + 9)e^t dt = (2t + 9)e^t - \int 2e^t dt = (2t + 7)e^t,$$

si ha che tutte le soluzioni di (1) sono date da

$$y(t) = (2t + 7)e^t + c,$$

con  $c$  costante arbitraria.

**d)** Dato che

$$\int \frac{5t}{1 + 6t^2} dt = \frac{5}{12} \int \frac{12t dt}{1 + 6t^2} = \frac{5}{12} \ln(1 + 6t^2),$$

si ha che tutte le soluzioni di (1) sono date da

$$y(t) = \frac{5}{12} \ln(1 + 6t^2) + c,$$

con  $c$  costante arbitraria.



6) Si consideri il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y'(t) = 2y(t) - 3, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

a) Quante soluzioni ha l'equazione di (1)? E quante soluzioni ha (1)?

b) Scrivere l'equazione omogenea associata all'equazione di (1), e scriverne tutte le soluzioni.

c) Trovare una soluzione particolare dell'equazione di (1).

d) Scrivere tutte le soluzioni dell'equazione di (1) e la soluzione di (1).

---

**Soluzione:**

a) L'equazione di (1) ha infinite soluzioni (dipendenti da un parametro reale), mentre il problema di Cauchy (1) ha un'unica soluzione.

b) L'equazione omogenea associata all'equazione di (1) è

$$y_0'(t) = 2y_0(t),$$

le cui soluzioni sono date (per quanto visto a lezione) da

$$y_0(t) = A e^{2t},$$

con  $A$  costante reale arbitraria.

c) Per trovare una soluzione particolare dell'equazione di (1), cerchiamo

$$\bar{y}(t) = C,$$

con  $C$  costante reale. Sostituendo, si ha che deve essere

$$0 = 2C - 3,$$

da cui segue  $C = \frac{3}{2}$ .

d) Per quanto visto a lezione, tutte le soluzioni dell'equazione di (1) sono date da

$$y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t) = A e^{2t} + \frac{3}{2},$$

con  $A$  costante reale arbitraria. Assegnando la condizione iniziale, si ha che deve essere

$$0 = A e^{2 \cdot 0} + \frac{3}{2} = A + \frac{3}{2},$$

da cui segue che  $A = -\frac{3}{2}$  e quindi l'unica soluzione di (1) è data da

$$y(t) = -\frac{3}{2} e^{2t} + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} [1 - e^{2t}].$$