

# Soluzioni metodi matematici

Andrea Princic 1837592

15 Gennaio 2018

## **Es. 1**

- A. F
- B. F
- C. F
- D. V:  $x = 0, y = \{0\}, z = \{0, 1\}$

## **Es. 2**

- A. F:  $\{3\} \notin 2^Q$
- B. V:  $\{12\} \in 2^T \cap 2^Q$
- C. V
- D. F

## **Es. 3**

- A. F: se  $|A| = 1$
- B. V
- C. V: se contiene  $(u, v)$  allora contiene anche  $(v, u)$  essendo simmetrica
- D. V:  $A \times A$

**Es. 4**

$$\{(a, a)\} \cup \{b, c, d\} \times \{b, c, d\}$$

Insieme quoziente:

$$\{[a], [b]\}$$

**Es. 5**

Dim  $\forall n \geq 1$ :

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Caso base:  $n = 1$

$$\sum_{i=1}^1 \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2}$$

Passo induttivo:  $n + 1$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i(i+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1 - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} =$$

$$1 + \frac{-1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = 1 + \frac{-n-2+1}{(n+1)(n+2)} = 1 - \frac{\cancel{n+1}}{(\cancel{n+1})(n+2)} =$$

$$1 - \frac{1}{n+2}$$

**Es. 6**

Una formula è soddisfacibile se almeno un'interpretazione la verifica.

**Es. 7**

$$1. \neg A \neg B$$

$$2. A \rightarrow C$$

$$3. B \wedge \neg C$$

$$4. C \vee \neg A$$

**Es. 8**

- A. SF
- B. TS
- C. SF
- D. TS
- E. TS

**Es. 9**

$$(\exists y P(y) \wedge \exists z Q(z)) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge Q(x))$$

La formula significa che se esistono  $y$  e  $z$  (non necessariamente distinti) che soddisfano rispettivamente  $P$  e  $Q$ , allora esiste una  $x$  che soddisfa sia  $P$  che  $Q$ . Ovviamente la formula non è valida in un caso basilare come ad esempio:

Dominio:  $\mathbb{N}$

$P(x)$ :  $x$  è pari

$Q(x)$ :  $x$  è dispari

Dal momento che esistono  $y$  e  $z$  che soddisfano  $P$  e  $Q$ , ma non esiste  $x$  che soddisfa sia  $P$  che  $Q$ .

Un'interpretazione che la verifica può essere:

Dominio:  $\mathbb{N}$

$P(x)$ :  $x$  è multiplo di 3

$Q(x)$ :  $x$  è multiplo di 4