

Abstraktní interpolace - příklad

1) Navrhnete Galoisova spojení v číselných uspořádáních, přičemž konkrétní domény bude $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$ a přes abstraktní domény bude $\mathbb{N}$ a intervalů nad $\mathbb{Z}$, případně všechny o-dobové prvky.
 Toto spojení nemí být triviální - α, β nejsou konstanty!

2) Definiujte operátor $\triangleright$ (widening).

3) Definiujte konkrétní operátor $\triangleright$ nad abstraktní doménou $\mathbb{Z}$ bohem 1 bod, aby vždy umělo upravit 0 der abstr. konstanty.

$$\text{ad(1)} \quad (\mathbb{Z}, \subseteq) \quad \left(\begin{array}{c} \mathbb{I} \\ \text{abstraktní doména} \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \mathbb{I} \\ \text{abstraktní doména} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} - \quad \mathbb{I} &= \{ (a, b) \in \mathbb{Z}_{-\infty} \times \mathbb{Z}_{+\infty} \mid a \leq b \} \cup \{ (-\infty, -\infty) \} \\ - \quad (a_1, b_1) &\sqsubseteq (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 \geq a_2 \wedge b_1 \leq b_2 \end{aligned}$$

$$\inf(A) = (\inf\{\lfloor a \rfloor \mid a \in A\}, \sup\{\lceil a \rceil \mid a \in A\})$$

2/2

$$A \subseteq \mathbb{R}$$

$$\gamma(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

$(a, b) \in \mathbb{I}$
viz předváděla

$$(a_1, b_1) \supset (a_2, b_2) = (a, b); \text{ kde}$$

"stara" ukechla "přidavani" ukechla

$$a = \begin{cases} a_1 & a_2 \geq a_1 \\ a_2 & 0 \leq a_2 < a_1 \\ -\infty & \text{jinak} \end{cases} \quad b = \begin{cases} b_1 & b_2 \leq b_1 \\ b_2 & b_1 < b_2 \leq 0 \\ +\infty & \text{jinak} \end{cases}$$

	1	2	3	4	5
a_2	0	a_2	a_1	a_2	
3.		?	?	?	?
případ		případ	případ	případ	případ