

## Hinweise

Empfohlen wird die Verwendung dieser Vorlage mit der jeweils aktuellsten TeXLive Version (Linux, Windows) bzw. MacTeX Version (MacOS). Aktuell ist dies TeXLive 2016. Download hier:

<https://www.tug.org/texlive/>

Bei Verwendung von TexLive Versionen 2014 und älter sollte die Zeile

```
\RequirePackage{fixltx2e}
```

als erste Zeile der Präambel noch vor der Dokumentenklasse eingefügt werden. Dies lädt diverse Bugfixes für LaTeX, die ab TexLive 2015 Standard sind.

Die Vorlage `thesis.tex` ist für die Kompilierung mit `lualatex` ausgelegt, mit wenigen Anpassungen kann sie aber auch mit `pdflatex` oder `xelatex` verwendet werden. Die Dokumentenklasse `tudothesis.cls` kann mit allen drei Programmen verwendet werden.

Achten Sie auch auf die Kodierung der Quelldateien. Bei Verwendung von Xe<sub>La</sub>T<sub>E</sub>X oder Lua<sub>La</sub>T<sub>E</sub>X (empfohlen) müssen die Quelldateien UTF-8 kodiert sein. Bei Verwendung von pdf<sub>La</sub>T<sub>E</sub>X nutzen Sie die Pakete `inputenc` und `fontenc` mit der korrekten Wahl der Kodierungen.

Eine aktuelle Version dieser Vorlage steht unter

<https://github.com/maxnoe/tudothesis>

zur Verfügung.

Alle verwendeten Pakete werden im L<sub>A</sub>T<sub>E</sub>X Kurs von Pep et al. erklärt:

<http://toolbox.pep-dortmund.org/notes>

Für Rückmeldungen und bei Problemen mit der Klasse oder Vorlage, bitte ein *Issue* auf GitHub aufmachen oder eine Email an [maximilian.noethe@tu-dortmund.de](mailto:maximilian.noethe@tu-dortmund.de) schreiben.

Wenn Sie die Dokumentenklasse mit der Option `tucolor` laden, werden verschiedene Elemente in TU-Grün gesetzt.

Arbeit zur Erlangung des akademischen Grades  
Bachelor of Science

**L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Dokumentenklasse und Vorlage  
für Abschlussarbeiten an der TU  
Dortmund**

Maximilian Nöthe  
geboren in Castrop-Rauxel

2014

Lehrstuhl für Experimentelle Physik V  
Fakultät Physik  
Technische Universität Dortmund

Erstgutachter:	Prof. Dr. Erstgutachter
Zweitgutachter:	Prof. Dr. Zweitgutachter
Abgabedatum:	31. September 2015

## **Kurzfassung**

Hier steht eine Kurzfassung der Arbeit in deutscher Sprache inklusive der Zusammenfassung der Ergebnisse. Zusammen mit der englischen Zusammenfassung muss sie auf diese Seite passen.

## **Abstract**

The abstract is a short summary of the thesis in English, together with the German summary it has to fit on this page.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Theoretische Grundlagen</b>	<b>2</b>
2.1	Floquet Theorie und Floquet'sches Theorem . . . . .	2
2.2	Allgemeine L"osung der Schr"odinger-Gleichung des getriebenen har- monischen Oszillators in der Quantenmechanik . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Ergebnisse</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Zusammenfassung und Ausblick</b>	<b>7</b>
<b>A</b>	<b>Ein Anhangskapitel</b>	<b>8</b>
	<b>Literatur</b>	<b>9</b>

# 1 Einleitung

Hier folgt eine kurze Einleitung in die Thematik der Bachelorarbeit. Die Einleitung muss kurz sein, damit die vorgegebene Gesamtlänge der Arbeit von 25 Seiten nicht überschritten wird. Die Beschränkung der Seitenzahl sollte man ernst nehmen, da Überschreitung zu Abzügen in der Note führen kann. Um der Längenbeschränkung zu genügen, darf auch nicht an der Schriftgröße, dem Zeilenabstand oder dem Satzspiegel (bedruckte Fläche der Seite) manipuliert werden.

## 2 Theoretische Grundlagen

### 2.1 Floquet Theorie und Floquet'sches Theorem

Die Floquet Theorie ist ein n"utzliches Werkzeug zur der L"osung von quantenmechanischen Systemen, welche durch einen zeitlich periodischen Hamilton-Operator

$$H(t) = H(t + T) , \quad (2.1)$$

mit der Periode  $T$ , beschrieben werden.

Das Floquet'sche Theorem besagt, dass bei einem solchen Hamiltonian, die L"osungen  $\Psi_n(x, t)$  der Schr"odinger-Gleichung

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi_n(x, t) = H(t) \Psi_n(x, t) \quad (2.2)$$

in Ortsdarstellung die Form

$$\Psi_n(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \epsilon_n t} \Phi_n(x, t) \quad (2.3)$$

haben. Hierbei sind die  $\Phi_n(x, t) = \Phi_n(x, t + T)$   $T$ -periodische Funktionen, die sogenannten Floquet-Moden, und  $\epsilon_n$  die zugeh"origen reellen Quasienergien, wobei diese Bezeichnungen gew"ahlt wurden aufgrund der Parallele zu den Bloch-Moden und Quasiimpulsen des Bloch-Theorems [haenggi]. Das Floquet-Theorem kann damit als "Bloch-Theorem in der Zeit" aufgefasst werden.

Durch Einsetzen dieses Ansatzes f"ur die Wellenfunktionen (2.3) in die Schr"odingergleichung (2.2) erhalten wir

$$\epsilon_n \Phi_n(x, t) = (H(t) - i\hbar \frac{\partial}{\partial t}) \Phi_n(x, t) = \mathcal{H}(t) \Phi_n(x, t) . \quad (2.4)$$

Die L"osung der Schr"odinger Gleichung konnte somit auf die L"osung eines Eigenwertproblems f"ur den neuen hermiteschen Operator  $\mathcal{H}(t)$  zur"uckgef"uhrt werden [sherly].

$\mathcal{H}(t)$  bzw.  $H(t)$  ist hermitisch und operiert auf dem Hilbertraum  $\mathcal{L}^2 \otimes \mathcal{T}$ .  $\mathcal{L}^2$  ist der Raum der quadratintegrablen Funktionen und  $\mathcal{T}$  der Raum der auf  $[0, T]$  integrablen

Funktionen, da die Operatoren  $T$  periodisch sind [haenggi]. Nach dem Spektralsatz bilden die Eigenfunktionen  $\Phi_n(x, t)$  von  $\mathcal{H}(t)$  eine Orthogonalbasis von  $\mathcal{L}^2 \otimes \mathcal{T}$ , welche auf eine Orthonormalbasis normiert werden kann:

$$\langle \langle \Phi_n(x, t) | \Phi_m(x, t) \rangle \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_n^*(x, t) \Phi_m(x, t) dx dt = \delta_{n,m} . \quad (2.5)$$

### 2.1.1 Zeitlich gemittelter Erwartungswert der Energie $\bar{H}_n$

Da  $H(t)$  nicht zeitlich konstant ist, sind auch seine Observablen, die Energien des Systems, zeitabh"angig. Ein direkter Vorteil der Floquet-Theorie liegt darin, dass die durchschnittliche Energie

$$\bar{H}_n = \langle \langle \Psi_n(x, t) | H(t) | \Psi_n(x, t) \rangle \rangle \quad (2.6)$$

des  $n$ -ten Zustandes  $\Psi_n(x, t)$  leicht "uber die Quasienergien  $\epsilon_n$  berechnen l"asst, ohne explizit Integrale zu l"osen.

Dazu ersetzen wir  $H(t)$  mit Hilfe von (2.4), au"serdem unterscheiden sich die Floquet-Moden  $\Phi_n(x, t)$  und die Wellenfunktionen  $\Psi_n(x, t)$  nur durch eine komplexe Phase, daher sind deren Skalarprodukte identisch. Weiterhin benutzen wir (2.4), dass die Floquet-Moden Eigenfunktionen von  $\mathcal{H}(t)$  sind:

$$\begin{aligned} \bar{H}_n &= \langle \langle \Phi_n(x, t) | \mathcal{H}(t) + i\hbar \frac{\partial}{\partial t} | \Phi_n(x, t) \rangle \rangle \\ &= \epsilon_n \langle \langle \Phi_n(x, t) | \Phi_n(x, t) \rangle \rangle + \langle \langle \Phi_n(x, t) | i\hbar \frac{\partial}{\partial t} | \Phi_n(x, t) \rangle \rangle \\ &= \epsilon_n + \langle \langle \Phi_n(x, t) | i\hbar \frac{\partial}{\partial t} | \Phi_n(x, t) \rangle \rangle . \end{aligned} \quad (2.7)$$

N"ahere Betrachtung zeigt, dass

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} = -\omega \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \omega} \quad (2.8)$$

gilt [haenggi]. Da f"ur  $\epsilon_n$  und  $\mathcal{H}(t)$  mit (2.4) eine Art station"are Schr"oginger-Gleichung vorliegt, kann das Hellman-Feynman Theorem [hellmann online quelle]

$$\frac{\partial \epsilon_n}{\partial \omega} = \langle \langle \Phi_n(x, t) | \frac{\partial \mathcal{H}(t)}{\partial \omega} | \Phi_n(x, t) \rangle \rangle \quad (2.9)$$

angewendet werden, womit folgt [haenggi]:

$$\bar{H}_n = \epsilon_n - \omega \frac{\partial \epsilon_n}{\partial \omega} . \quad (2.10)$$



## 2.2 Allgemeine L"osung der Schr"odinger-Gleichung des getriebenen harmonischen Oszillators in der Quantenmechanik

Der Hamilton-Operator eines harmonischen Oszillators der Masse  $m$ , welcher mit einer beliebigen aber periodischen "au"seren Kraft  $S(t) = S(t + T)$  getrieben wird, hat die Form

$$H(t) = H(t + T) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 x^2 - S(t)x, \quad (2.11)$$

mit  $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ . Dieses System kann exakt gel"ost werden, indem die Schr"odinger-Gleichung durch einen Variablenwechsel und zwei unit"are Transformationen auf die bekannte Form des ungetriebenen Oszillators reduziert wird [haenggi].

### 1) Variablenwechsel

F"ur den neuen Ortsoperator bzw. die Ortsvariable wird eine zeitabh"angige Verschiebung angesetzt:

$$x \rightarrow y = x - \zeta(t), \quad (2.12)$$

wobei der Impulsoperator unver"andert bleibt.

Mit der neuen Zeitableitung der Wellenfunktion

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(y(t), t) = i\hbar \dot{\Psi} - \dot{\zeta} \frac{\partial}{\partial y} \Psi(y(t), t) \quad (2.13)$$

wird die Schr"odinger-Gleichung zu:

$$i\hbar \dot{\Psi}(y, t) = \left[ i\hbar \dot{\zeta} \frac{\partial}{\partial y} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 (y + \zeta)^2 - (y + \zeta)S(t) \right] \Psi(y, t). \quad (2.14)$$

### 2) Unit"are Trafe f"ur $\Psi(y, t)$

Im Weiteren w"ahlen wir die unit"are Transformation

$$\Psi(y, t) = e^{\frac{i}{\hbar}m\dot{\zeta}y} \Lambda(y, t). \quad (2.15)$$

Durch Einsetzen in die Schr"odinger-Gleichung (2.14) und Ausrechnen der Ableitungen erhalten wir

$$\begin{aligned} & e^{\frac{i}{\hbar}m\dot{\zeta}y} (i\hbar \dot{\Lambda} - m y \ddot{\zeta} \Lambda) \\ &= e^{\frac{i}{\hbar}m\dot{\zeta}y} \left[ \left( -m \dot{\zeta}^2 \Lambda + i\hbar \dot{\zeta} \frac{\partial}{\partial y} \Lambda \right) + \left( \frac{1}{2}m\dot{\zeta}^2 \Lambda - i\hbar \dot{\zeta} \frac{\partial}{\partial y} \Lambda - \frac{\hbar}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} \Lambda \right) \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{2}m\omega_0^2 (y + \zeta)^2 + (y + \zeta)S(t) \right] \end{aligned} \quad (2.16)$$

## 2.2 Allgemeine Lösung der Schrödinger-Gleichung des getriebenen harmonischen Oszillators in der Quantenmechanik

---

Wenn durch die Exponentialfunktion geteilt wird, erhalten wir eine Differentialgleichung für  $\Lambda(y, t)$ . Außerdem können durch geschicktes Umsortieren der Terme die Lagrange-Funktion  $L(\zeta, \dot{\zeta}, t)$

$$L(\zeta, \dot{\zeta}, t) = \frac{1}{2}m\dot{\zeta}^2 - \frac{1}{2}m\omega_0^2\zeta^2 + S(t)\zeta \quad (2.17)$$

und Bewegungsgleichung des klassischen getriebenen harmonischen Oszillators

$$m\ddot{\zeta} + m\omega_0^2\zeta - S(t) = 0 \quad (2.18)$$

für die Verschiebung  $\zeta(t)$  identifiziert werden. Die Differentialgleichung für  $\Lambda(y, t)$  ist

$$i\hbar\dot{\Lambda}(y, t) = \left[ \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 y^2 + (m\ddot{\zeta}\omega_0^2 y\zeta - S(t))y - L(\zeta, \dot{\zeta}, t) \right] \Lambda(y, t) \quad (2.19)$$

b

### 3 Ergebnisse

## 4 Zusammenfassung und Ausblick

## A Ein Anhangskapitel

Hier könnte ein Anhang stehen, falls Sie z.B. Code, Konstruktionszeichnungen oder Ähnliches mit in die Arbeit bringen wollen. Im Normalfall stehen jedoch alle Ihre Resultate im Hauptteil der Bachelorarbeit und ein Anhang ist überflüssig.

## Literatur

- [1] A. Einstein. „A Generalization of the relativistic theory of Gravitation“. In: *Annals of Mathematics* 46.4 (1945), S. 578–584.
- [2] Marc Ensenbach und Mark Trettin. *Das LATEX2-Sündenregister*. 2011. URL: <ftp://ftp.mpi-sb.mpg.de/pub/tex/mirror/ftp.dante.de/pub/tex/info/l2tabu/german/l2tabu.pdf>.
- [3] *Git Bash - Download*. 2014. URL: <http://msysgit.github.io/>.
- [4] *Gnu-Make Homepage*. 2014. URL: <http://www.gnu.org/software/make/>.
- [5] Markus Kohm und Jens-Uwe Morawski. *KOMA -Script. ein wandelbares LaTeX-Paket*. 2013. URL: <http://mirror.selfnet.de/tex-archive/macros/latex/contrib/koma-script/doc/scrguide.pdf>.
- [6] Friedhelm Kuypers. *Klassische Mechanik*. 9. Auflage. Wiley-VCH, 2010.
- [7] Philipp Lehman et al. *The Biblalex Package. Programmable Bibliographies and Citations*. 2014. URL: <ftp://ftp.fu-berlin.de/tex/CTAN/macros/latex/contrib/biblalex/doc/biblalex.pdf>.
- [8] *Pep et al. Toolbox – LATEX-Folien*. 2014. URL: <http://toolbox.pep-dortmund.org/files/archive/2014/latex.pdf>.
- [9] D. Satas, Hrsg. *Handbook of pressure sensitive adhesive technology*. 2nd. New York: Van Nostrand Reinhold, 1989.
- [10] *Texmaker. The universal LaTeX editor, Downloads*. 2014. URL: <http://www.xmlmath.net/texmaker/download.html>.
- [11] Joseph Wright. *siunitx - A comprehensive (SI) units package*. 2013. URL: <http://mirror.selfnet.de/tex-archive/macros/latex/contrib/siunitx/siunitx.pdf>.



## Eidesstattliche Versicherung

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit mit dem Titel „L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Dokumentenklasse und Vorlage für Abschlussarbeiten an der TU Dortmund“ selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt, sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

## Belehrung

Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50 000 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Technischen Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden (§ 63 Abs. 5 Hochschulgesetz –HG–).

Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Technische Universität Dortmund wird ggf. elektronische Vergleichswerkzeuge (wie z. B. die Software „turnitin“) zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen.

Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift