

Математическая статистика

Черновик

Кафедра СМиМ

2019

План

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Математическая статистика

Математическая статистика - наука, разрабатывающая математические методы систематизации и использования статистических (массовых) данных для научных и практических выводов.

Математическая статистика - наука о принятии решений в условиях неопределённости.

Математическая статистика

Задачи

- ▶ создание методов сбора, группировки статистических сведений
- ▶ анализ статистических данных

Признаки

Для описания изучаемых объектов используются два вида **признаки**

- ▶ Значение конкретного признака конкретного объекта можно рассматривать как значение случайной величины
- ▶ Количественные - представлены числом
Рост, масса, прочность, размеры, ...
- ▶ Качественные - обозначают порядок или категорию
место на олимпиаде, цвет, материал стен дома, конструкция крыши

Проблема изучения всех объектов

- ▶ Часто невозможно изучать все объекты в силу их большого количества
Например рост всех людей в определённой стране
- ▶ Иногда изучение объекта может быть слишком трудоёмким или затратным
- ▶ Изучение некоторых объектов приводит к их разрушению
например испытания на прочность плит перекрытия
- ▶ Поэтому приходится изучать ограниченное число объектов, и по их свойствам делать выводы о всей совокупности

Генеральная совокупность и выборка

- ▶ **Выборочная совокупность, выборка (sample)** - совокупность случайно отобранных объектов

Совокупность всех объектов на основе которых делаются выводы о генеральной совокупности

- ▶ **Генеральная совокупность (statistical population)** - совокупность объектов из которых производится выборка.

Совокупность всех объектов относительно которых делаются выводы

- ▶ **Объём совокупности** - число объектов в этой совокупности

Репрезентативность

- ▶ Отбор и изучение только части объектов из генеральной совокупности неизбежно приводит к неточностям в выводах
- ▶ Поэтому к выборке предъявляется требование репрезентативности
- ▶ **Репрезентативность** - соответствии характеристик выборки характеристикам генеральной совокупности.
- ▶ У каждого объекта из генеральной совокупности должен быть один и тот же шанс попасть в выборочную совокупность
- ▶ Как правило это достигается *случайным отбором*

Анализ статистических данных

Даже в простых случаях, когда у объекта может быть только один признак анализировать всё множество объектов непосредственно проблематично

Пример. Возраст пассажиров Титаника:

34 47 62 27 22 14 30 26 18 21 46 23 63 47 24 35 21 27 45 55 9 21 48 50 22
22 41 50 24 33 30 18 21 25 39 41 30 45 25 45 60 36 24 27 20 28 10 35 25 36
17 32 18 22 13 18 47 31 60 24 21 29 28 35 32 55 30 24 6 67 49 27 18 2 22 27
25 25 76 29 20 33 43 27 26 16 28 21 18 41 36 18 63 18 1 36 29 12 35 28 17
22 42 24 32 53 43 24 26 26 23 40 10 33 61 28 42 31 22 30 23 60 36 13 24 29
23 42 26 7 26 41 26 48 18 22 27 23 40 15 20 54 36 64 30 37 18 27 40 21 17
40 34 12 61 8 33 6 18 23 0 47 8 25 35 24 33 25 32 17 60 38 42 57 50 30 21 22
21 53 23 40 36 14 21 21 39 20 64 20 18 48 55 45 45 41 22 42 29 1 20 27 24
32 28 19 21 36 21 29 1 30 17 46 26 20 28 40 30 22 23 1 9 2 36 24 30 53 36 26
1 30 29 32 43 24 64 30 1 55 45 18 22 37 55 17 57 19 27 22 26 25 26 33 39 23
12 46 29 21 48 39 19 27 30 32 39 25 18 32 58 16 26 38 24 31 45 25 18 49 0
50 59 30 14 24 31 27 25 22 45 29 21 31 49 44 54 45 22 21 55 5 26 19 24 24
57 21 6 23 51 13 47 29 18 24 48 22 31 30 38 22 17 43 20 23 50 3 37 28 39 38

Анализ статистических данных

Для описания совокупности значений используются подходы похожие на те, что использовались для описания СВ в теории вероятностей

- ▶ Числовые характеристики
 - ▶ Среднее значение
 - ▶ Стандартное отклонение
 - ▶ Медиана, квартили
 - ▶ Мода
 - ▶ ...
- ▶ Ряд распределения или эмпирическая функция распределения


Ряд распределения

- ▶ Для построения **интервального ряда распределения** диапазон значений выборки разбивается на равные участки
- ▶ Далее для каждого интервала подсчитывается число попавших в него значений - **абсолютная частота**
- ▶ Вместо абсолютной частоты иногда используют **относительную частоту** - долю объектов попавших в диапазон

от	0	7.753	15.336	22.919	30.502	38.085	45.668	53.251	60.834	68.417
до	7.753	15.336	22.919	30.502	38.085	45.668	53.251	60.834	68.417	76.0
	16	16	71	97	43	37	25	17	9	1

Гистограмма

- ▶ Для графического представления ряда распределения используется *гистограмма*
- ▶ Высота столбца определяется количеством (**абсолютной частотой**) значений из выборки попавших в интервал, определяемый шириной столбца
- ▶ Вместо частот могут быть использованы **относительные частоты** или проценты - доля объектов выборки попавшая в интервал



Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Числовых характеристики статистического распределения

- ▶ Выборочные - вычисленные по данным выборки
- ▶ Генеральные - вычисляются по данным генеральной совокупности, или (чаще всего) *оцениваются* с помощью аналогичных характеристик выборки

Числовые характеристики выборки не описывают в точности генеральную совокупность, поэтому они являются **оценками** характеристик генеральной совокупности

Оценки делаются на две категории

- ▶ Точечные

Представляется одним числом. Например - среднее выборочное. Может заметно отличаться от значения оцениваемой величины.

- ▶ Интервальные

Представляют собой интервал, в которое в заданной вероятностью попадает оцениваемое значение

Интервальная оценка

- ▶ θ - оцениваемая величина (характеризует генеральную совокупность)
- ▶ θ^* - статистическая характеристика найденная по выборке

Вероятность того, что оцениваемая величина будет отличаться θ от своей оценки θ^ не более чем на δ с **надёжностью** γ*

$$P(|\theta - \theta^*| < \delta) = \gamma$$

- ▶ δ - половина ширины интервала
- ▶ $(\theta^* - \delta, \theta^* + \delta)$ - доверительный интервал
- ▶ γ - вероятность с которой величина θ попадёт в доверительный интервал

Оценка дисперсии генеральной совокупности

- ▶ SD - стандартное отклонение генеральной совокупности
- ▶ sd - стандартное отклонение выборочной совокупности

$$sd = \sqrt{\frac{\sum n_i(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

x_i - значения признака из выборки (в случае интервального ряда

берётся середина i -го интервала),

\bar{x} - среднее значение признака в выборке,

n_i - число значений признака x_i (в случае интервального ряда - число значений попавших в i -й интервал)

Доверительный интервал для МО

Дисперсия генеральной совокупности известна

- ▶ Рассмотрим выборку объемом n
- ▶ Пусть исследуемый признак распределён по нормальному закону с известным стандартным отклонением σ для генеральной совокупности
- ▶ Требуется получить интервальную оценку математического ожидания $M(X)$ признака в генеральной совокупности с надёжностью γ , если известно его среднее выборочное значение \bar{x}

$$P(\bar{x} - \delta < M(X) < \bar{x} + \delta) = \gamma$$

$$\delta = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\gamma = 2\Phi(z)$$

$\Phi(z)$ - значение функции распределения стандартного нормального распределения

Доверительный интервал для МО

Дисперсия генеральной совокупности известна

- ▶ Рассмотрим выборку объёмом n
- ▶ Пусть исследуемый признак распределён по нормальному закону с неизвестным стандартным отклонением для генеральной совокупности
- ▶ Вместо стандартного ген. совокупности отклонения будем использовать аналогичную величину для выборки - sd
- ▶ Требуется получить интервальную оценку математического ожидания $M(X)$ признака в генеральной совокупности с надёжностью γ , если известно его среднее выборочное значение \bar{x}

$$P(\bar{x} - \delta < M(X) < \bar{x} + \delta) = \gamma$$

$$\delta = t_\gamma \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \quad \gamma = 2 \int_0^{t_\gamma} S(t, n) dt$$

$S(t, n)$ - значение функции распределения Стьюдента с параметром n

Таблица распределения Стьюдента

t Table

cum. prob	t .50	t .75	t .80	t .85	t .90	t .95	t .975	t .99
one tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02
df								
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602

t-table.pdf

$$df = n - 1$$

Доверительный интервал для МО

Пример

Оценить м.о. генеральной совокупности распределённой по нормальному закону распределения при помощи доверительного интервала с надёжностью 0.95

Известно среднее выборочное - 20.2, выборочное с.к.о. - 0.8

Доверительный интервал для МО

Пример

Оценить м.о. генеральной совокупности распределённой по нормальному закону распределения при помощи доверительного интервала с надёжностью 0.95

Известно среднее выборочное - 20.2, выборочное с.к.о. - 0.8

1. Определим параметр df распределения Стьюдента: $df = n - 1$
2. Зная значение функции вероятности - 0.95 по таблице распределения определим соответствующее значение t_γ
3. Примечание: в таблице (в строке two-tails) вместо γ приводится величина $1 - \gamma$
4. $t_\gamma = 2.131$

Доверительный интервал для МО

Пример

Оценить м.о. генеральной совокупности распределённой по нормальному закону распределения при помощи доверительного интервала с надёжностью 0.95

Известно среднее выборочное - 20.2, выборочное с.к.о. - 0.8

1. Определим параметр df распределения Стьюдента: $df = n - 1$
2. Зная значение функции вероятности - 0.95 по таблице распределения определим соответствующее значение t_γ
3. Примечание: в таблице (в строке two-tails) вместо γ приводится величина $1 - \gamma$
4. $t_\gamma = 2.131$
5. Доверительный интервал (19.774, 20.686)

Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Статистические гипотезы

Статистическая гипотеза - предположение о виде распределения и о свойствах случайной величины (или нескольких), которое можно опровергнуть или подтвердить применением статистических методов.

Примеры статистических гипотез:

- ▶ Математическое ожидание равно 10
- ▶ Признак имеет нормальное распределение
- ▶ Математические ожидания двух генеральных совокупностей равны

Статистические гипотезы

Зачем?

- ▶ В выборках всегда присутствует элемент случайности, поэтому их характеристики не могут в точности соответствовать характеристикам генеральной совокупности
- ▶ Нельзя безоговорочно доверять даже средним значениям репрезентативных выборок
- ▶ Поэтому все характеристики выборок (числовые характеристики, распределения) можно считать *предположениями* о генеральной совокупности
- ▶ А значит появляется необходимость оценивать надёжность этих предположений - статистическая проверка гипотез

Статистические гипотезы

На практике обычно рассматривают две гипотезы - основную и противоположную ей.

- ▶ Нулевая гипотеза H_0 - основная гипотеза
- ▶ Альтернативная гипотеза H_1
- ▶ В результате проверки, нулевая гипотеза либо принимается либо отвергается
- ▶ Во втором случае следует автоматическое принятие альтернативной гипотезы

Например, если основная гипотеза формулируется так

$H_0 : M(X) = 10$, то альтернативная будет такой $H_1 : M(X) \neq 10$

Статистические критерии

- ▶ Для проверки гипотез разного вида и разных условий их применения разработаны статистические критерии
- ▶ **Статистический критерий** - строгое математическое правило, по которому принимается или отвергается та или иная статистическая гипотеза с известным уровнем значимости
- ▶ Уровень значимости α - вероятность отвергнуть правильную гипотезу
- ▶ Обычно уровень значимости выбирается равным 0.05 или меньше

Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Гипотеза о равенстве МО двух генеральных совокупностей

- ▶ Из двух генеральных совокупностей (X и Y) сделаны выборки объёмом n и m соответственно
- ▶ Известны дисперсии генеральных совокупностей $D(X)$ и $D(Y)$
- ▶ Средние выборочные значения (\bar{x} и \bar{y}) этих выборок близки
- ▶ Однако эти значения могли получиться близкими случайно, в силу того, что сделаны из выборок
- ▶ Требуется определить, равны ли математические ожидания генеральных совокупностей

Гипотеза о равенстве МО двух генеральных совокупностей

1. Сформулируем гипотезы:

$$H_0 : M(X) = M(Y)$$

$$H_1 : M(X) \neq M(Y)$$

2. Вычислим значение (**значение критерия**) Z^1 , которое будем использовать для принятия решения

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{D(X)/n + D(Y)/m}}$$

3. Определим критические значения z используя заранее заданный уровень значимости ($\alpha = 0.05$) из выражения $P(Z < z_k) = \Phi(z_k) = \alpha/2$

¹это значение вычисляется использованием случайных величин \bar{x} и \bar{y} и само является случайной величиной

Гипотеза о равенстве МО двух генеральных совокупностей

1. Примем нулевую гипотезу если

$$z < -z_k \text{ или } z > +z_k$$

2. Иначе, отклоним нулевую гипотезу и примем альтернативную

Проверка статистических гипотез

- ▶ значение критерия Z , по которому принимается решение о принятии или отклонении гипотезы является случайной величиной
- ▶ Для разных статистических критериев (например для сравнения дисперсий) используется своя формула для вычисления значения, но везде вычисленное значение - случайная величина
- ▶ Распределение случайной величины тоже изменяется от критерия к критерию

Проверка статистических гипотез

p-value

- ▶ Программные средства (и модули языков программирования) имеющие средства проверки статистических гипотез могут вместо *значения критерия* выдавать $p\text{-value}$ ²
- ▶ **p-value** вычисляется с помощью *значения критерия*
- ▶ Правила принятия и отклонения нулевой гипотезы:
 $p\text{-value} > \alpha$ - нулевая гипотеза принимается
 $p\text{-value} < \alpha$ - нулевая гипотеза отклоняется
где α - уровень значимости³

²Подробнее о смысле p-value:

<https://habr.com/en/company/stepic/blog/250527/>

³обычно выбирается равным 0.05, 0.01, ...

Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Проверка статистических гипотез

p-value — это вероятность получить такие или более выраженные различия при условии, что в генеральной совокупности никаких различий на самом деле нет.

Чем меньше p-value тем с большей надёжностью можно отклонять нулевую гипотезу

Проверка статистических гипотез

p-value


<u>P-VALUE</u>	<u>INTERPRETATION</u>
0.001	HIGHLY SIGNIFICANT
0.01	
0.02	
0.03	
0.04	SIGNIFICANT
0.049	
0.050	OH CRAP. REDO CALCULATIONS.
0.051	ON THE EDGE OF SIGNIFICANCE
0.06	
0.07	HIGHLY SUGGESTIVE, SIGNIFICANT AT THE $P < 0.10$ LEVEL
0.08	
0.09	
0.099	HEY, LOOK AT THIS INTERESTING SUBGROUP ANALYSIS
≥ 0.1	

<https://xkcd.com/1478/>

Проверка статистических гипотез

p-value и значение критерия

- ▶ значение критерия - случайная величина
- ▶ p-value - вероятность (площади на рис слева от $-z$ и справа от $+z$)
- ▶ Для проверки гипотезы на равенство чего-либо (математических ожиданий между собой, коэф.корреляции нулю и т.п.) p-value и значение критерия связываются следующим образом



Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Зависимые и независимые выборки

Независимые выборки - выборки сделанные из разных генеральных совокупностей

Зависимые выборки - выборки в которых можно поставить в соответствие объектам одной выборки объекты другой.

Примеры зависимых выборок: мужья и жены, пациенты до и после терапии, образцы бетона до и после воздействия воды.

Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Статистические гипотезы

Для чего могут применяться?

- ▶ Гипотеза о равенстве мат. ожидания генеральной совокупности среднему выборочному.
Например: Оценка прочности партии строительных материалов по испытаниям нескольких отобранных экземпляров
- ▶ Гипотеза о равенстве математических ожиданий двух генеральных совокупностей
Например: проверка образцов бетона затвердевших при температуре 25°C и при температуре -15°C
- ▶ Вместо гипотезы о равенстве математических ожиданий проверяют и гипотезу о равенстве выборок, это более надёжный способ сравнения случайных величин
- ▶ Гипотеза о значимости коэффициента корреляции
Пример: Действительно ли имеется зависимость между количеством добавки в смесь и прочностью бетона?

Другие статистические гипотезы

Некоторые статистические критерии.pdf

Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

- Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

- p-value

- Зависимые и независимые выборки

- Другие статистические гипотезы

Корреляция

- Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Отношения между величинами

Величины могут быть

- ▶ независимы друг от друга

Число студентов группы СУС-15 на паре и дневная температура в Москве в этот же день

- ▶ связаны функциональной зависимостью

Скорость и пройденный путь, нагрузка на колонну и напряжение внутри колонны

- ▶ связаны *статистической зависимостью* -
коррелировать

Корреляция

Корреляция - статистическая зависимость при которой изменение одной из величин ведёт к изменению *среднего значения* другой

Например количество удобрений и урожай связаны корреляционной зависимостью

Корреляцию можно представить уравнением


$$\bar{y} = f(x)$$

где $f(x)$ - уравнение *регрессии*⁴ \bar{y} - среднее значение y по выборке.

⁴чаще всего рассматривают линейную зависимость


Корреляция

- ▶ Рассмотрим значения двух случайных величин X и Y , такие что каждому значению X соответствует значение Y .
- ▶ Отметим эти значения как точки на графике



На рисунке просматривается линейная зависимость Y от X (или наоборот): чем больше X тем больше среднее значение Y

Корреляция




- ▶ На рисунке просматривается линейная зависимость Y от X (или наоборот): чем больше X тем больше среднее значение Y
- ▶ Представим такую зависимость в виде уравнения прямой:


$$y = \rho_{yx}x + b$$

- ▶ Это линейное **уравнение регрессии**


Корреляция




**STRONG POSITIVE
CORRELATION**




**WEAK POSITIVE
CORRELATION**




**STRONG NEGATIVE
CORRELATION**



**WEAK NEGATIVE
CORRELATION**



**MODERATE NEGATIVE
CORRELATION**




NO CORRELATION

Коэффициент корреляции

- ▶ Значения случайных величин могут иметь разный разброс на графике
- ▶ Это определяет степень корреляционной зависимости величин
- ▶ Математической мерой корреляции двух случайных величин служит коэффициент корреляции r^5
- ▶ $-1 \leq r \leq 1$
- ▶ $r = 0$ - зависимость отсутствует
- ▶ $r = 1$ - прямая зависимость
- ▶ $r = -1$ - обратная зависимость

⁵далее будет рассмотрен только линейный коэффициент корреляции - коэффициент корреляции Пирсона


Коэффициент корреляции



Коэффициент корреляции

- ▶ Коэффициент корреляции говорит только о степени взаимосвязи величин
- ▶ Но не говорит о том, какая из величин зависит от какой
- ▶ Две случайных величины могут быть даже зависимы от третьей и коэффициент корреляции об этом никакой информации
- ▶ Таким образом коэффициент корреляции ничего не говорит о причинно-следственной связи

Коэффициент корреляции



Корреляция есть, причинно-следственной связи нет.

Коэффициент корреляции

$$r_{xy} = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

где $\text{cov}(x, y)$ - ковариация - ещё одна мера линейной зависимости случайных величин

$$\text{cov}(X, Y) = M((X - M[X]) \cdot (Y - M[Y]))$$

или

$$\text{cov}(X_{(n)}, Y_{(n)}) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n X_t Y_t - \left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n X_t \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n Y_t \right)$$

Коэффициент корреляции




Уравнение линейно регрессии

$$y = \rho_{yx}x + b$$

- ▶ $\rho_{yx} = r_{xy} \cdot \frac{\sigma_x}{\sigma_y}$
- ▶ Коэффициент корреляции определяет наклон прямой линейной регрессии

Коэффициент корреляции

- ▶ $\rho_{yx} = r_{xy} \cdot \frac{\sigma_x}{\sigma_y}$
- ▶ Коэффициент корреляции определяет наклон прямой линейной регрессии



Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Выборочный коэффициент корреляции

- ▶ Когда исследование основано на выборке то ни в чём нельзя быть уверенным...
- ▶ Поэтому вычисляя коэффициент корреляции для двух величин его значения нельзя доверять в полной мере
- ▶ Чтобы определить степень доверия этому коэффициенту, т.е. его статистическую значимость требуется проверить соответствующую статистическую гипотезу
- ▶ Гипотеза о значимости выборочного коэффициента

Выборочный коэффициент корреляции

Проверка статистической значимости

- ▶ Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции
- ▶ $H_0 : r = 0$ - вычисленный выборочный коэффициент корреляции не значим (существенно не отличается от нуля)
- ▶ $H_0 : r \neq 0$ - вычисленный выборочный коэффициент корреляции значим
- ▶ Вычислим значение критерия

$$T = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

- ▶ Определим p-value используя распределение Стьюдента с параметром $df = n - 2$
p-value = $2 F(T)$ где $F(T)$ - функция распределения Стьюдента

Таблица распределения Стьюдента

значения соответствующие p-value закрашены жёлтым

t Table

cum. prob	t .50	t .75	t .80	t .85	t .90	t .95	t .975	t .99
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02
df								
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602

Например для значения $T = 1.1$ и параметра распределения $df = 11 - 2$ (11 элементов в выборке) будет соответствовать p-value = 0.3

Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Работа с распределениями случайных величин

- ▶ Программа для Android - Probability Distributions



Работа с распределениями случайных величин

- ▶ surfstat.anu.edu.au/surfstat-home/tables/t.php



Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

Вопросы

- ▶ Что такое генеральная совокупность? Выборочная совокупность?
- ▶ Почему выборки необходимы?
- ▶ Назовите основное требование к выборке.
- ▶ Дают ли числовые характеристики выборки точные сведения о генеральной совокупности?
- ▶ Что такое интервальная оценка?
- ▶ Что такое статистическая гипотеза?
- ▶ Приведите пример статистической гипотезы
- ▶ Что такое уровень значимости?
- ▶ Что такое p -value?

Вопросы

- ▶ Как проверить статистическую гипотезу на основе p-value?
- ▶ Требуется проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий двух выборок (сделанных из нормально распределённых величин) объёмом 25 элементов, если стандартные отклонения известны и приблизительно равны. Какой критерий следует использовать?

Outline

Математическая статистика

Числовых характеристики статистического распределения

Статистические гипотезы

Гипотеза о равенстве МО генеральных совокупностей

p-value

Зависимые и независимые выборки

Другие статистические гипотезы

Корреляция

Статистическая значимость коэф. корреляции

ПО и сайты для работы с распределениями

Вопросы

Ссылки

- ▶ Теория вероятностей и математическая статистика. Гмурман В.Е. biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika-431095
- ▶ Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. В. Е. Гмурман. — 11-е изд., Издательство Юрайт, 2019. — 406 с www.biblio-online.ru/book/02E0C1D3-4EEA-43AA-AA6B-5E25C4991D0

Материалы курса

github.com/VetrovSV/ST