

GEOMETRÍA II. RELACIÓN DE PROBLEMAS 2

TEMA 2: FORMAS BILINEALES Y MÉTRICAS

Curso 2018-19

1. Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre \mathbb{R} . Dadas dos formas lineales $\varphi, \psi \in V^*$ definimos su *producto tensorial* $\varphi \otimes \psi : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ como $(\varphi \otimes \psi)(u, v) = \varphi(u) \psi(v)$.

- a) Prueba que $\varphi \otimes \psi$ es bilineal.
- b) Prueba que las siguientes afirmaciones equivalen:
- i) $\varphi \otimes \psi = 0$.
 - ii) $\varphi = 0$ ó $\psi = 0$.
 - iii) $\varphi \otimes \psi$ es antisimétrica.
- c) Prueba que la aplicación

$$\begin{aligned} F : V^* \times V^* &\longrightarrow \mathcal{B}(V) \\ (\varphi, \psi) &\longmapsto \varphi \otimes \psi \end{aligned}$$

es bilineal.

- d) Sea $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V y $B^* = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ su base dual. Calcula la matriz de $\varphi \otimes \psi$ en la base B relacionándola con las coordenadas de φ y ψ en la base B^* . Demuestra que $B' = \{\varphi_i \otimes \varphi_j / i, j = 1, \dots, n\}$ es una base de $\mathcal{B}(V)$. Describe la base B' cuando $V = \mathbb{R}^n$ y $B = B_u$.
- e) Sea $b \in \mathcal{B}(V)$. Prueba que las siguientes afirmaciones equivalen:
- i) $\text{rango}(b) = 1$.
 - ii) $b = \varphi \otimes \psi$ con $\varphi \neq 0$ y $\psi \neq 0$.
 - iii) Existe B base de V tal que si b es simétrica

$$M(b, B) = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

y si b no es simétrica

$$M(b, B) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre \mathbb{R} . Denotemos por $\mathcal{L}(V, V^*)$ al espacio vectorial de las aplicaciones lineales de V en su dual V^* . Se define $F : \mathcal{B}(V) \rightarrow \mathcal{L}(V, V^*)$ como $F(b)(u)(v) = b(u, v)$, $b \in \mathcal{B}(V)$, $u, v \in V$. Prueba que F está bien definida y que es un isomorfismo.
3. Sea V un espacio vectorial sobre \mathbb{R} . Dado un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ y una forma bilineal $b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, se define la aplicación $b_f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ como $b_f(u, v) = b(f(u), f(v))$. Demuestra que b_f es una forma bilineal, que además es simétrica si lo es b .
4. Sean V_1 y V_2 dos espacios vectoriales reales. Consideremos el espacio producto $V = V_1 \times V_2$, donde la suma y el producto por escalares se realizan coordenada a coordenada. Dadas formas bilineales $b_i : V_i \times V_i \rightarrow \mathbb{R}$ definimos $b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$b((u_1, u_2), (v_1, v_2)) = b_1(u_1, v_1) + b_2(u_2, v_2).$$

Demuestra que b es una forma bilineal sobre V , que además es simétrica si lo son b_1 y b_2 .

5. Se considera la forma bilineal $b : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$b((x, y, z), (x', y', z')) = xx' - 2yy' - 3zz' + 2xy' - 3yz'.$$

- a) Calcula $M(b, B_u)$. ¿Es b una métrica sobre \mathbb{R}^3 ?
 - b) Utiliza la expresión matricial de b respecto a B_u para calcular $b((1, -2, 1), (1, -2, 4))$.
 - c) Se considera la base de \mathbb{R}^3 dada por $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$. Calcula $M(b, B)$ mediante la relación de congruencia.
 - d) Calcula $b(u, v)$, sabiendo que las coordenadas de u y v en la base B son $(1, -2, 1)$ y $(2, 1, 2)$, respectivamente.
6. Sea V un espacio vectorial de dimensión tres, b una forma bilineal sobre V y $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ una base de V . Sabiendo que

$$M(b, B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcula $b(u, v)$ para $u = v_1 + v_3$ y $v = v_2 + 3v_3$.
- b) ¿Existe algún vector $w \neq 0$ tal que $b(w, w) = 0$?
- c) Calcula $M(b, B')$ siendo $B' = \{v_1 + v_2, v_1 - v_3, v_2\}$.

7. En el espacio vectorial $\mathbb{R}_3[x]$ se considera la aplicación $b : \mathbb{R}_3[x] \times \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$b(p(x), q(x)) = \int_0^1 p(x)q'(x)dx.$$

- a) Comprueba que b es una forma bilineal.
- b) Calcula $M(b, B)$ para $B = \{1, x, x^2, x^3\}$.
- c) Consideremos la descomposición de b como suma de una métrica b_s y de una forma bilineal antisimétrica b_a . Calcula $M(b_s, B)$ y $M(b_a, B)$.
- d) Calcula b_s y b_a sobre una pareja cualquiera de polinomios en $\mathbb{R}_3[x]$.

8. En el espacio vectorial $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ se considera la aplicación $b : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$b(A, C) = \text{traza}(A \cdot C).$$

- a) Comprueba que b es una forma bilineal y simétrica.
- b) Calcula $M(b, B)$ para B la base usual de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

9. Demuestra que si dos matrices cuadradas A y C son congruentes, entonces A es simétrica si y sólo si lo es C . Utilizar este hecho para encontrar dos matrices A y C que sean semejantes y no sean congruentes. ¿Son dos matrices congruentes necesariamente semejantes?

10. Sea ω_g la forma cuadrática asociada a una métrica g . Si sabemos que para dos vectores u y v se verifica que $\omega_g(u) = \omega_g(2v) = 2$ y $\omega_g(u + v) = 3$, ¿cuánto vale $g(u + v, v)$?

11. Sea g la métrica en \mathbb{R}^3 tal que

$$M(g, B_u) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Escribe la expresión de la forma cuadrática ω_g asociada a g sobre cualquier $v \in \mathbb{R}^3$.
- b) Calcula el rango, la nulidad y el radical de g . ¿Es g degenerada?
- c) Encuentra B base de \mathbb{R}^3 tal que $M(g, B)$ sea diagonal. Clasifica g como métrica.

12. En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ definimos la forma bilineal

$$g(a_0 + a_1x + a_2x^2, b_0 + b_1x + b_2x^2) = a_0b_0 + a_0b_1 + a_0b_2 + a_1b_0 + a_1b_2 + 3a_2b_1 + 2a_2b_2.$$

- Calcula $M(g, B_u)$, donde B_u es la base usual de $\mathbb{R}_2[x]$.
- Consideremos la descomposición de g como suma de una métrica g_s y de una forma bilineal antisimétrica g_a . Calcula $M(g_s, B_u)$, $M(g_a, B_u)$ y las expresiones de g_s y g_a sobre dos polinomios cualquiera en $\mathbb{R}_2[x]$.
- Estudia si g_s es degenerada y calcula su radical.
- Encuentra una base ortogonal de $\mathbb{R}_2[x]$ para g_s . Clasifica g_s como métrica.

13. Sea ω la forma cuadrática en \mathbb{R}^3 dada por

$$\omega(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 4xy + 4xz + 4yz.$$

Encuentra una base B de \mathbb{R}^3 tal que si (a, b, c) son las coordenadas de un vector v en esa base, $\omega(v) = a^2 - b^2$.

14. Clasifica las métricas sobre \mathbb{R}^3 cuyas matrices respecto a la base usual vienen dadas, respectivamente, por

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 14 & -2 & 7 \\ -2 & 2 & 1 \\ 7 & 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Decide también si cualquier par de las matrices anteriores son congruentes.

15. Estudia si las matrices

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

pueden representar a una misma métrica sobre \mathbb{R}^2 . En caso afirmativo, encuentra una matriz regular P tal que $N = P^t M P$.

16. En el espacio vectorial \mathbb{R}^3 y para cada número real a fijo, se considera la métrica g_a asociada a la forma cuadrática dada por:

$$\omega_a(x, y, z) = x^2 + y^2 + 8z^2 + 2axz - 4ayz.$$

Clasifica g_a según los valores del parámetro a .

17. ¿Existen números reales x, y, z no todos nulos tales que $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy = 0$? ¿Y cumpliendo $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy = 0$?

18. Calcula todas las soluciones en \mathbb{R}^3 a las ecuaciones:

a) $x^2 + 5y^2 + z^2 + 4xy + 2yz = 0$,

b) $3x^2 + y^2 - xy = 0$,

c) $x^2 + z^2 + 4xy + 2xz + 4yz = 0$.

19. Se considera la métrica $g : \mathbb{R}_2[x] \times \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(p(x), q(x)) = \int_{-1}^1 p'(x) q'(x) dx,$$

donde $'$ representa la derivada respecto de x .

a) Calcula el radical de g .

b) Calcula el subespacio ortogonal a $\mathbb{R}_1[x]$ con respecto a g .

c) Encuentra una base ortogonal para g .

20. Se considera la métrica $g : M_2(\mathbb{R}) \times M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$g(A, C) = \text{tr}(AC^t).$$

a) Prueba que g es no degenerada.

b) Calcula $A_2(\mathbb{R})^\perp$, siendo $A_2(\mathbb{R})$ el subespacio de las matrices antisimétricas.

c) Encuentra una base ortogonal para g formada por matrices simétricas y antisimétricas.

21. Para cada $a \in \mathbb{R}$ se considera la métrica g_a de \mathbb{R}^3 tal que

$$M(g_a, B_u) = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Clasifica la métrica g_a según el valor de a . En el caso $a = -1$ calcula la forma cuadrática asociada y encuentra una base del subespacio ortogonal al plano de ecuación $z = 0$.

22. Calcula el índice, el rango y clasifica, en función del parámetro $a \in \mathbb{R}$, la métrica g_a en \mathbb{R}^3 cuya forma cuadrática asociada está dada por

$$\omega_a(x, y, z) = x^2 + y^2 + az^2 + 2axz - 4ayz.$$

23. Sea g la métrica de \mathbb{R}^4 cuya matriz en la base usual es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Encuentra una base ortonormal para g del plano de ecuaciones $x + y = 0, z + t = 0$.

24. En \mathbb{R}^3 se considera el plano U de ecuación $y - z = 0$ y la recta $W = L(\{(1, 1, -1)\})$. Encuentra la expresión de una métrica g en \mathbb{R}^3 cuyo radical sea W y cuya restricción a U sea lorentziana.

25. En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ de polinomios de grado menor o igual que dos, y para cada número real m fijo, se considera la métrica g_m dada por

$$g_m(p(x), q(x)) = p(m)q(m).$$

- a) Calcula una base del radical de g_m , una base ortonormal de $(\mathbb{R}_2[x], g_m)$, el rango y el índice de g_m . Clasifica g_m .
- b) Determina si para $m = 1$ existe una base B de $\mathbb{R}_2[x]$ tal que $M(g_1, B)$ es la matriz cuyas entradas son todas iguales a 1.
26. En \mathbb{R}^2 se consideran las métricas g_1, g_2 y g_3 que vienen representadas, en la base canónica, por las siguientes matrices:

$$G_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad G_2 = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad G_3 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

¿Son los planos (\mathbb{R}^2, g_1) , (\mathbb{R}^2, g_2) y (\mathbb{R}^2, g_3) isométricos entre sí? En caso afirmativo construye una isometría.

27. En \mathbb{R}^4 se considera g la métrica representada, en la base canónica por la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & -3 \\ -1 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcula su radical.
- b) Calcula una base ortonormal de (\mathbb{R}^4, g) .
- c) Encuentra una base ortonormal del hiperplano de ecuación $x_1 = 0$ con la métrica inducida por g .
-

d) Encuentra una base ortonormal del hiperplano de ecuación $x_1 + x_2 = 0$ con la métrica inducida por g .

e) ¿Son isométricos los hiperplanos anteriores?

28. Para cada $a \in \mathbb{R}$ se considera la métrica g_a de \mathbb{R}^3 cuya forma cuadrática asociada está dada por

$$\omega_a(x, y, z) = ax^2 + ay^2 + (a-1)z^2 + 2xy.$$

a) Calcula el índice, el rango y clasifica la métrica g_a según el valor de a .

b) En el caso $a = -1$ calcula una base ortonormal para g_{-1} .

c) En el caso $a = 2$ encuentra una base del subespacio ortogonal al plano de ecuación $y - 2z = 0$.

d) En el caso $a = 0$, ¿es posible encontrar dos vectores luminosos linealmente independientes?

e) ¿Son (\mathbb{R}^3, g_1) y (\mathbb{R}^3, g_{-1}) isométricos? ¿Son (\mathbb{R}^3, g_0) y $(\mathbb{R}^3, g_{\frac{1}{2}})$ isométricos? En caso afirmativo construye una isometría.

29. En \mathbb{R}^3 sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\}$ y $W = L(\{(1, -1, 1)\})$. Calcula, si es posible, una métrica g y la expresión matricial $M(g, B_u)$ en cada uno de los siguientes casos:

a) $\text{Rad}(g) = U$ y $g|_W$ es definida positiva.

b) $\text{Rad}(g) = W$ y $g|_U$ es definida negativa.

c) $U^\perp = U$.

d) $W^\perp = W$ y g no degenerada.

e) $U^\perp = W$, g no degenerada e $\text{índice}(g) = 2$. Si esta métrica existe da una base ortonormal para (\mathbb{R}^3, g) y para (U, g_U) .

30. Responde de forma razonada si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) ¿Es bilineal la aplicación $g : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g((x, y), (x', y')) = xy$?

b) Toda forma bilineal $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es de la forma $g(x, y) = axy$ con $a \in \mathbb{R}$.

c) Si dos matrices cuadradas son congruentes, entonces tienen la misma traza. ¿Deben tener el mismo determinante?

d) En \mathbb{R}^2 existe una métrica tal que $(L(\{(2, 1)\}))^\perp = L(\{(2, 1)\})$.

e) Sea V un espacio vectorial real y g una métrica en V . Supongamos que en la diagonal de $M(g, B)$ respecto de una cierta base B existen dos números a y b con $ab < 0$. Entonces g es indefinida.

- f) Si una métrica sobre \mathbb{R}^2 está representada en una cierta base por una matriz con determinante negativo entonces se trata de una métrica lorentziana.
- g) Sea V un espacio vectorial real de dimensión tres y g una métrica. Supongamos que existen vectores $u, v \in V$ linealmente independientes, ortogonales entre sí y luminosos. Entonces, g es degenerada.
- h) Sea V un espacio vectorial real y g una métrica. Si todos los elementos diagonales de la matriz de g en una cierta base B son negativos, entonces g es definida negativa.
- i) Toda métrica indefinida sobre un espacio vectorial real tiene vectores luminosos no nulos.
- j) Dos vectores perpendiculares y no nulos de una métrica g son linealmente independientes. ¿Y si alguno de los dos vectores no es luminoso?
- k) Si g es una métrica semidefinida, entonces un vector $v \in V$ es luminoso si y sólo si está en el radical de g . ¿Y si g es degenerada pero no semidefinida?
- l) En \mathbb{R}^3 con la métrica $g_{2,1}$ un plano vectorial de ecuación $ax + by + cz = 0$ es degenerado si y sólo si $g(v, v) = 0$, donde $v = (a, b, c)$.
- m) Existe en \mathbb{R}^4 una métrica no degenerada tal que $g|_U = 0$ y $g|_V = 0$ donde $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0, z + t = 0\}$ y $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y = 0, z - t = 0\}$.
- n) Dadas M y N dos matrices simétricas de orden 20 y de rango 1 se tiene que M y N son congruentes si y sólo si $\text{traza}(M) \cdot \text{traza}(N) > 0$.
- ñ) Dado (V, g) un espacio vectorial métrico tal que para todo subespacio U de V se tiene $\dim(V) = \dim(U) + \dim(U^\perp)$ entonces g es no degenerada.
- o) Una matriz simétrica A es semidefinida positiva si y sólo si existe una matriz cuadrada Q tal que $A = Q^t \cdot Q$.
- p) Si (V, g) es un espacio vectorial métrico tal que para todo subespacio U de V de dimensión mayor o igual que 1 se tiene $\dim(V) = \dim(U) + \dim(U^\perp)$, entonces g es no degenerada.
- q) Existe una métrica degenerada en \mathbb{R}^4 tal que el ortogonal a la recta generada por el vector $v = (1, 1, 1, 1)$ es la propia recta.