

# Relación de Ejercicios del Tema I

Métodos Numéricos I – Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Universidad de Granada – Curso 2019/2020

---

En la resolución de los ejercicios que consideres conveniente puedes hacer uso de **Maxima**.

1. Comprueba que si  $N \in \mathbb{N}$  y  $1 \leq p < \infty$ , entonces la aplicación  $\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$  definida en cada  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$  como

$$\|\mathbf{x}\|_p := \left( \sum_{j=1}^N |x_j|^p \right)^{1/p}$$

es una norma en dicho espacio vectorial.

(Indicación: el caso  $p = 1$  es fácil de comprobar. En caso contrario,  $1 < p < \infty$ , sea  $p'$  el único número real tal que  $1/p + 1/p' = 1$ . Demuestra en primer lugar que se cumple la desigualdad:

$$x, y \geq 0 \Rightarrow xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^{p'}}{p'}.$$

Para ello, basta con que, fijado  $y \geq 0$  estudies la monotonía de la función

$$x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \frac{x^p}{p} + \frac{y^{p'}}{p'} - xy.$$

A continuación deduce la **desigualdad de Hölder**, esto es:

$$x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_N \in \mathbb{R} \Rightarrow \sum_{j=1}^N |x_j y_j| \leq \left( \sum_{j=1}^N |x_j|^p \right)^{1/p} \left( \sum_{j=1}^N |y_j|^{p'} \right)^{1/p'}.$$

Concluye que  $\|\cdot\|_p$  verifica la desigualdad triangular y, como las otras dos condiciones que definen a una norma se cumplen trivialmente, se tiene lo propuesto).

2. **Símbolos de Landau**. Sean  $N \in \mathbb{N}$ ,  $A$  un subconjunto no vacío de  $\mathbb{R}^N$ ,  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  y supongamos que  $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^N$  es un punto de acumulación de  $A$  y que existe  $\gamma > 0$  de forma que

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x} \in A \\ 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \gamma \end{array} \right| \Rightarrow g(\mathbf{x}) \neq 0.$$

- Se dice que  $f$  es de orden **O grande** (u **O mayúscula**) respecto a  $g$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$  si

$$\text{existen } M > 0 \text{ y } 0 < \delta < \gamma : \left. \begin{array}{l} \mathbf{x} \in A \\ 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta \end{array} \right| \Rightarrow \left| \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} \right| < M,$$

hecho que se nota como  $f(\mathbf{x}) = O(g(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$ .

- La función  $f$  es de orden *o pequeña* (u *o minúscula*) respecto a  $g$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$  si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} = 0,$$

lo que se escribe  $f(\mathbf{x}) = o(g(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$ .

El papel de  $\mathbf{x}_0$  puede ser reemplazado, cuando  $N = 1$ , por  $+\infty$  (respectivamente  $-\infty$ ) si  $A$  no está acotado superiormente (respectivamente inferiormente).

Comprueba ( $f_1, f_2, g_1, g_2 : A \rightarrow \mathbb{R}$  y  $g_1$  y  $g_2$  satisfacen la misma hipótesis que  $g$  de no nulidad en un entorno de  $\mathbf{x}_0$ ):

- $f(\mathbf{x}) = o(g(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0 \Rightarrow f(\mathbf{x}) = O(g(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$ .
- $f(\mathbf{x}) = O(g_1(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$  y  $g_1(\mathbf{x}) = O(g_2(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0 \Rightarrow f(\mathbf{x}) = O(g_2(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$  (Ídem para  $o$ ).
- $f_1(\mathbf{x}) = O(g_1(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$  y  $f_2(\mathbf{x}) = O(g_2(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0 \Rightarrow f_1(\mathbf{x})f_2(\mathbf{x}) = O(g_1(\mathbf{x})g_2(\mathbf{x}))$  cuando  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0$  (Ídem para  $o$ ).
- Dados  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,  $an^2 + bn + c = O(n^2)$  cuando  $n \rightarrow \infty$ .
- Si  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es una función polinómica, entonces  $f(x) = o(e^x)$  cuando  $x \rightarrow \infty$ .

3. Calcula el radio espectral de la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 0 \end{bmatrix}.$$

¿Qué podemos afirmar sobre la sucesión  $\{\mathbf{A}^n\}_{n \geq 1}$ ?

4. Encuentra una matriz  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  y una norma matricial  $\|\cdot\|$  en  $\mathbb{R}^{3 \times 3}$  de forma que  $\rho(\mathbf{A}) < 1$  pero  $\|\mathbf{A}\| \geq 1$ .
5. Demuestra que toda función real definida en un intervalo y de clase  $C^1$  es estable, pero que el recíproco no es cierto. Comprueba además que la función  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  definida en cada  $x \in \mathbb{R}_+$  como

$$f(x) := \sqrt{x}$$

no es estable en cero. ¿Podemos asegurar que toda función real definida en un intervalo que sea estable en todo su dominio es de clase  $C^1$ ? Justifica tu respuesta.

6. Decide en función del parámetro  $a \in \mathbb{R}$  si el problema:

$$\text{dado } \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2, \text{ encontrar } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \begin{bmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

está bien planteado. Para los valores de  $a$  que hagan que dicho problema esté bien planteado, estudia su condicionamiento en  $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.1 \\ 0.22 \end{bmatrix}$  y el de la matriz de coeficientes, referidos ambos a una conveniente norma que elijas.

7. Sean  $N \in \mathbb{N}$  y  $\|\cdot\|$  una norma matricial en  $\mathbb{R}^{N \times N}$  inducida por una norma en  $\mathbb{R}^N$ . Prueba que

$$\min\{c(\mathbf{A}) : \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{N \times N} \text{ regular}\} = 1,$$


y que si  $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{N \times N}$  son matrices regulares, entonces

$$c(\mathbf{AB}) \leq c(\mathbf{A})c(\mathbf{B}).$$

8. Estudia el condicionamiento de las siguientes funciones en todos los puntos de su dominio y discute los puntos de mal condicionamiento que eventualmente puedan existir:

- $f(x) = e^x \sin x, \quad (0 < x < \pi).$
- $f(x) = 2 - 4 \cos x, \quad (-\pi/2 < x < \pi/2).$
- $f(x) = \log \sqrt{x}, \quad (x > 0).$

9. Modeliza matemáticamente la relevancia de cada una de las cuatro páginas web que aparecen en la figura, de acuerdo con el algoritmo PageRank de Google y teniendo en cuenta la estructura de enlaces mutuos.



10. Decide razonadamente la validez del siguiente razonamiento: “En la sucesión de Fibonacci, al ser

$$n \in \mathbb{N} \Rightarrow x_{n+2} = x_{n+1} + x_n,$$

dividiendo por  $x_{n+1}$  obtenemos

$$\frac{x_{n+2}}{x_{n+1}} = 1 + \frac{1}{\frac{x_{n+1}}{x_n}},$$

luego notando

$$\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n},$$

se tiene de la igualdad anterior

$$\ell = 1 + \frac{1}{\ell} \Leftrightarrow \ell^2 - \ell - 1 = 0$$

y como  $\ell \geq 0$ , entonces  $\ell = \Phi$ .”

(Indicación: habría que probar antes que la sucesión  $\{x_{n+1}/x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente. En general, el hecho de que una sucesión verifique una relación de recurrencia no garantiza su convergencia, como ocurre por ejemplo con la sucesión

$$x_1 = 1$$

y

$$n \in \mathbb{N} \Rightarrow x_{n+1} = -x_n + 1).$$

11. Obtén la representación posicional binaria de los números

$$8.275, \quad -6.6875, \quad \frac{5}{7}.$$

12. ¿Es posible encontrar un número real con representación posicional decimal infinita y binaria finita? ¿Por qué? De forma más general, ¿qué debe cumplir una base  $b$  para que toda representación posicional finita en dicha base sea también finita en base 10?

13. Fijada una base  $b$ , sean  $k \geq 1$ ,  $0 \leq a_{k+1}, a_{k+2} \dots \leq b-1$  y  $0 \leq a_k < b-1$ . Demuestra que

$$(0.0 \dots 0a_k a_{k+1} a_{k+2} \dots)_b \leq (0.0 \dots 0a_k + 1)_b.$$

14. Describe todos los números estrictamente positivos del sistema de punto flotante  $\mathbb{F}(2, 3, -1, 2)$ . Calcula su épsilon máquina y su precisión. Obtén además la truncatura y el redondeo en dicho sistema del número real 3.25, comprobando que los correspondientes errores relativos están acotados por el épsilon máquina y la precisión.

15. Determina, para todos y cada uno de los sistemas decimales de punto flotante del estándar ISO/IEC/IEEE60559:2011, el rango de variación del valor absoluto de los números reales que incluye, el épsilon máquina y la precisión.

16. Considera un sistema de punto flotante  $\mathbb{F}(b, t, L, U)$  con  $L < U$ . Sean  $L \leq e < e' \leq U$  y  $(0.a_1 \dots a_t) \cdot b^e, (0.\alpha_1 \dots \alpha_t) \cdot b^{e'} \in \mathbb{F}(b, t, L, U)$ . Demuestra que

$$(0.a_1 \dots a_t) \cdot b^e < (0.\alpha_1 \dots \alpha_t) \cdot b^{e'}.$$

Deduce la distribución de los puntos del sistema de punto flotante  $\mathbb{F}(b, t, L, U)$ .

17. Sea  $\{x_n\}_{n \geq 0}$  la sucesión de números reales definida para cada  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  como

$$x_n := \int_0^1 \frac{x^n}{x+3} dx.$$

Justifica razonadamente que esta sucesión verifica la recurrencia

$$x_0 = \log(4/3)$$

y

$$n \geq 1 \Rightarrow x_n = \frac{1}{n} - 3x_{n-1}$$

(utiliza para ello la identidad

$$\frac{x}{x+3} = 1 - \frac{3}{x+3},$$

multiplica por  $x^{n-1}$  e integra). Para estudiar la propagación del error, parte en la recurrencia anterior de un redondeo de  $x_0$  con 5 cifras significativas ( $t = 5$ ). De forma más general, analiza la propagación del error cuando se parte de  $x_0 + \delta$ , con  $\delta \in \mathbb{R}$ . Expresa  $x_n$  como  $f_n(x_0)$ , para una conveniente función  $f_n$  y halla su condicionamiento en  $x_0$ .