





требований соответствия N° BY/112 05.01.109.02 00021.

Республика Беларусь, 220020, Победителей, д. 73, корпус 1, пом. 3H, комната 4 Система менеджмента качества сертифицирована по сертификации системы менеджмента «БелСтандартЦентр» соответствие на СТБ ИСО 9001-2015. Сертификат

Штрихкод:

8104527148

повышенного внимания

Индикатор зоны

ИООО «Синэво»

Результаты исследований

Дата заказа: 22/07/2021 10:06

№ заказа 10081026 Фамилия: Кулешова

Имя, Отчество: Дина Валерьевна

Дата рождения: Возраст:

16/05/1981 40 L 2 M

Карта БЕЛФАРМАЦИЯ Пункт: Минск, Хоружей №2

Пол: Женский

Паспорт:

Лата вапилации

Ромоцистеин 9.35 МКМОЛЬ/Л Метод: Ферментативный анализ Автоматический анализатор: Cobas 6000 Реагент: Roche Diagnostics GmbH Референтные значения, мкмоль/л Дополнительное употребление фолата: Беременность: до 8; Взрослые (15-65): до 12; Пожилые люди: до 16 Отсутствие доп. употр-ния фолата: Беременность: до 10; Дети <15 лет: до 10; Взрослые (15-65): до 15; Пожилые люди: до 20 В европ. лаб-риях уровень 12 мкмоль/л исп-ся в кач-ве точки разделения в ходе опр-ния норм. конц-ции НСҮЅ у взр. людей. Имеют значение возраст, берем-ть и функция почек. Употребление фол. кислоты как в качестве биодобавки, так и вместе с пищей также должно учитываться.	Показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
Автоматический анализатор: Cobas 6000 Реагент: Roche Diagnostics GmbH Референтные значения, мкмоль/л Дополнительное употребление фолата: Беременность: до 8; Дети <15 лет: до 8; Варослые (15-65): до 12; Пожилые люди: до 16 Отсутствие доп. употр-ния фолата: Беременность: до 10; Дети <15 лет: до 10; Дети <15 лет: до 10; Варослые (15-65): до 15; Пожилые люди: до 20 В европ. лаб-риях уровень 12 мкмоль/л исп-ся в кач-ве точки разделения в ходе опр-ния норм. конц-ции НСҮЅ у взр. людей. Имеют значение возраст, берем-ть и функция почек. Употребление фол. кислоты как в качестве биодобавки, так и вместе с пищей также должно	Био/иммунохимия			
	Гомоцистеин	9.35	мкмоль/л	Автоматический анализатор: Cobas 6000 Реагент: Roche Diagnostics GmbH Референтные значения, мкмоль/л Дополнительное употребление фолата: Беременность: до 8; Дети <15 лет: до 8; Взрослые (15-65): до 12; Пожилые люди: до 16 Отсутствие доп. употр-ния фолата: Беременность: до 10; Дети <15 лет: до 10; Взрослые (15-65): до 15; Пожилые люди: до 20 В европ. лаб-риях уровень 12 мкмоль/л исп-ся в кач-ве точки разделения в ходе опр-ния норм. конц-ции HCYS у взр. людей. Имеют значение возраст, берем-ть и функция почек. Употребление фол. кислоты как в качестве биодобавки, так и вместе с пищей также должно

Анти-Мюллеров гормон (АМГ)

0.032

нг/мл

Метод: Электрохемилюминесцентный

иммунотест

Автоматический анализатор: Cobas 6000 Реагент: Roche Diagnostics GmbH Референтные значения, нг/мл: Мужчины: 1.43-11.6

Женщины (крайние процентили — 5-95%):

20-24л - 1,66-9,49 25-29л - 1,18-9,16 30-34л - 0,672-7,55

Женщины (крайние процентили - 10-90%):

35-39л - 0,777-5,24 40-44л - 0,097-2,96 45-50л - 0,046-2,06

Женщины с синдромом поликистозных

яичников: 2,41-17,1



Врач лабораторной диагностики



Результаты лабораторных исследований не являются достаточным основанием для постановки диагноза. Интерпретация результатов и постановка диагноза осуществляется только лечащим врачом. Обработка материала и выдача результатов анализа производится при помощи лабораторно-информационной системы SILAB.