



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
 ESCUELA DE INGENIERÍA
 DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC1253 — Matemáticas Discretas — 1' 2020

Tarea 5 – Respuesta Pregunta 2

1

Existe una relación de equivalencia \sim que cumple $|A/\sim| = n$ para cualquier $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Por palomar, dado que \mathbb{N} es al menos n veces mas grande que cualquier subconjunto finito de este, con $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, por lo tanto, se puede asegurar que existe una relación sobre $A \times A$, tal que $|A/\sim| = n$

2

Una partición P de A cumple que la unión de todos sus elementos dan como resultado A , y además, la intersección de cualquiera 2 elementos distintos de P , dan como resultado vacío, es decir, son disjuntos. Sabiendo lo anterior:

Demostrar que si A es numerable existe una partición finita numerable se puede hacer a través de un ejemplo:

P estaría formado por subconjuntos de un elemento, donde cada elemento sería un elemento de A , se podría decir que el primer elemento de A está contenido en el primer elemento de P . Así, cada subconjunto S de P es finito, pues tiene tamaño 1, y sabemos que la unión de todos los subconjuntos S darán como resultado A . Por lo que solo falta demostrar que P es numerable, pero como cada elemento de P es un conjunto que contiene a un elemento de A , podemos hacer una función biyectiva entre P y A , que vaya de la siguiente manera:

$$\forall a \in A. f : A \rightarrow P. f(a) = \{a\}$$

Y como A es numerable, P también lo es.

Este ejemplo se puede aplicar en cualquier caso, por lo que queda demostrado que " A numerable $\rightarrow \exists P$ partición finita numerable de A ".

Ahora, para el otro lado, si P es una partición finita numerable de A , y la unión de todos los elementos de P da como resultado A , significa que A esta formado por la unión de conjuntos finitos, por lo tanto, cada conjunto finito, sería numerable, lo que significa que la unión de todos estos conjuntos será equinumerable a la suma de la numerabilidad de cada subconjunto, es decir:

Si " $A = a_1 \cup a_2 \cup a_3 \cup \dots$ " entonces la numerabilidad de A será $|a_1| + |a_2| + |a_3| \cup \dots$, y como sabemos que cada subconjunto es finito, sabemos que eso será la sumatoria de números finitos, y por lo tanto, será numerable.