Lista de Exercícios 5

1a) $(a+b+c)^*a(a+b+c)^*b(a+b+c)^* + (a+b+c)^*b(a+b+c)^*a(a+b+c)^*$

b) $(a+1)^*1(a+1)(a+1)(a+1)(a+1)(a+1)(a+1)(a+1)(a+1)(a+1)$

c) $0^*(10)^*(\varepsilon+11)0^*(10)^*$

2a)



$R_{11}^{(0)}$	$\varepsilon+1$
$R_{12}^{(0)}$	0
$R_{13}^{(0)}$	$\emptyset$
$R_{21}^{(0)}$	1
$R_{22}^{(0)}$	ε
$R_{23}^{(0)}$	0
$R_{31}^{(0)}$	$\emptyset$
$R_{32}^{(0)}$	1
$R_{33}^{(0)}$	$\varepsilon+0$

b) $R_{11}^{(1)} = (\varepsilon+1) + (\varepsilon+1)(\varepsilon+1)^*(\varepsilon+1) = 1^*$

$R_{12}^{(1)}$	$0+(\varepsilon+1)(\varepsilon+1)^*0 = 0+1^*0$
$R_{13}^{(1)}$	$\emptyset+(\varepsilon+1)(\varepsilon+1)^*\emptyset = \emptyset$
$R_{21}^{(1)}$	$1+1(\varepsilon+1)^*(\varepsilon+1) = 1+11^* = 11^*$
$R_{22}^{(1)}$	$\varepsilon+1(\varepsilon+1)^*0 = \varepsilon+11^*0$
$R_{23}^{(1)}$	$0+1(\varepsilon+1)^*\emptyset = 0$
$R_{31}^{(1)}$	$\emptyset+0(\varepsilon+1)^*(\varepsilon+1) = \emptyset$
$R_{32}^{(1)}$	$1+\emptyset(\varepsilon+1)^*0 = 1$
$R_{33}^{(1)}$	$(\varepsilon+0)+\emptyset(\varepsilon+1)^*\emptyset = \varepsilon+0$

tilibra

c)

$q_1 \xrightarrow{2a} q_2$: $\emptyset + 0\emptyset^*0 = 00$

$q_2 \xrightarrow{2a} q_2$: $1 + 0\emptyset^*1 = 1 + 01$

$q_1 \xrightarrow{2a} q_3$: $\emptyset + 10^*1 = 11$

$q_2 \xrightarrow{2a} q_3$: $0 + 10^*0 = 0 + 10$



RE: $((1+01)+00(0+10)^*11)^*00(0+10)^*$

3a)



R_{11}	ε
R_{21}	0
R_{31}	1
R_{12}	1
R_{22}	0
R_{32}	ε
R_{13}	1
R_{23}	1
R_{33}	1
R_{14}	0
R_{24}	ε

b)

$R_{11}^{(1)} = \varepsilon + \varepsilon(\varepsilon)^*\varepsilon = \varepsilon$

$R_{12}^{(1)} = 0 + \varepsilon(\varepsilon)^*0 = 0$

$R_{13}^{(1)} = 1 + \varepsilon(\varepsilon)^*1 = 1$

$R_{21}^{(1)} = 0 + 0(\varepsilon)^*\varepsilon = 0$

$R_{22}^{(1)} = \varepsilon + 0(\varepsilon)^*0 = \varepsilon + 00$

$R_{23}^{(1)} = 1 + 0(\varepsilon)^*1 = 1 + 01$

$R_{31}^{(1)} = \phi + 1(\varepsilon)^*\varepsilon = \phi$

$R_{32}^{(1)} = 0 + 1(\varepsilon)^*0 = 0 + 10$

$R_{33}^{(1)} = \varepsilon + 1(\varepsilon)^*1 = \varepsilon + 11$

c)



$q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 : 1 + 0\phi^*1 = 1 + 01$

$q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 : \phi + 0\phi^*0 = 00$

$q_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 : 1 + 1\phi^*0 = 1 + 10$

$q_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 : \phi + 0\phi^*1 = 01$



$RE = (00 + (1+01)(01)^*(1+00))^*(1+01)(01)^*$

4)



Eliminando R:
$S \xrightarrow{} Q : 0 + 10^*1$



Eliminando Q:
$S \xrightarrow{} S : \emptyset + (0+10^*1)\emptyset^*1 = (0+10^*1)1$
$S \xrightarrow{} P : \emptyset + (0+10^*1)\emptyset^*0 = (0+10^*1)0$



Eliminando S:
$P \xrightarrow{} P : 1 + 0(0+10^*1)1)^*(0+10^*1)0$

$1 + 0((0+10^*1)1)^*(0+10^*1)0$



$RE = (1+0((0+10^*1)1)^*(0+10^*1)0)^*$

5) Eliminando q_1:
$q_0 \xrightarrow{} q_2 : \phi + \varepsilon b^*a = b^*a$
$q_1 \xrightarrow{} q_2 : b + ab^*a = b + ab^*a$

Eliminando q_3:
$q_0 \xrightarrow{} q_2 : \phi + \varepsilon(a+b)^*a = (a+b)^*a$

Eliminando q_3:
$q_0 \xrightarrow{} q_4 : \phi + \varepsilon\phi^*(a+b) = a+b$
$q_4 \xrightarrow{} q_4 : \phi + (a+b)\phi^*(a+b) = (a+b)(a+b)$

Eliminando q_2:
$q_0 \xrightarrow{} q_e : \phi + a\phi^*a = aa$



Eliminando q_5

$q_3 \xrightarrow{} q_4 : \emptyset + ((a+b)^*a)\emptyset^*(aa) = (a+b)^*aaa$



Eliminando q_2

$q_3 \xrightarrow{} q_4 : (b^*a)(b+ab^*a)^*$

Eliminando q_4

$q_3 \xrightarrow{} q_0 : (b+b)(b^*a)(b+ab^*a)^*$

Eliminando q_0

$q_3 \xrightarrow{} q_1 : (a+b)^*aaa(a+b)^*$

RE: $(b^*a)(b+ab^*a)^* + (a+b)((a+ba)^*) + (a+b)^*aaa(a+b)^*$

6)



Eliminando q_2

$q_3 \xrightarrow{} q_0 : \varepsilon + b\emptyset^*\varepsilon = \varepsilon + b$

$q_3 \xrightarrow{} q_1 : a + b\emptyset^*a = a + ba$

$q_1 \xrightarrow{} q_0 : \varepsilon + b$

$q_1 \xrightarrow{} q_1 : ba$



Eliminando q_1:

$q_3 \xrightarrow{} q_0 : (\varepsilon + b) + (a + ba)(ba)^*(\varepsilon + b)$


RE = (ε+b)+(a+ba)(ba*)(ε+b)
7) Eliminando q3
q0 → q1 : a+(a+b)b*c = a+(a+b)c
Eliminando q1
q0 → q4 : (a+(a+b)c)c
q0 → q2 : (a+(a+b)c)b
q2 → q4 : bc
q2 → q2 : bb
Eliminando q2
Eliminando q4

RE = (ε + ((a + (a+b)c)b)(bb)*) + (((a+(a+b)c)c) + ((a+(a+b)c)b)(bb)*bc)

8)



Eliminando q_1

$q_0 \xrightarrow{1} q_4 : \varepsilon + a$

$q_0 \xrightarrow{1} q_2 : b + ab$

$q_2 \xrightarrow{1} q_0 : c + ac$



Eliminando q_2

$q_0 \xrightarrow{q_2} q_4 : (\varepsilon + a) + (b + ab)$

$q_0 \xrightarrow{q_2} q_0 : (c + ac) + (b + ab)c$



RE = ((c + ac) + (b + ab)c)* ((ε + a) + (b + ab))

a)



b)



c)



d)



e)



f)



g)