


图 1.1　前向 Compton 振幅 T_2 在复 $\omega=1/x$ 平面上的欧氏点。靶静止系中，欧氏动量 $q=(\mathrm{i}q^4,\mathbf{q})$（$|\mathbf{q}|\ge Q/2$）给出 $\omega=2\mathrm{i}Mq^4/Q^2$，恰好取遍虚轴上的短线段 $\mathcal{I}_Q=\{\mathrm{i}y:\,|y|\le\sqrt{3}M/Q\}$（蓝色粗线；右上为原点附近的放大），$Q\to\infty$ 时它缩向原点（VF-REF-1）。T_2 在单位圆盘 $|\omega|<1$ 内解析，割线 $(-\infty,-1]$ 与 $[1,\infty)$ 分别为 u 道与 s 道（物理区）的割线。欧氏 OPE 只在长度为 $\mathcal{O}(M/Q)$ 的线段 $\mathcal{I}_Q$ 上提供信息；由此得到固定 n 的矩还需要 $F_2\ge 0$ 与有限减除的色散关系（定理 7.2），而 $n<n_0$ 的低阶矩还需要增长条件（命题 7.3）。

第 7 章　dummy chapter 7

命題 7.1　dummy `prop:dis-dispersion-np`

定理 7.2　dummy `thm:dis-fixed-n`

命題 7.3　dummy `prop:dis-low-moments`