


$$C_S\Gamma = T_S\,\Gamma$$

$$C_A\Gamma = T_A(1-T_S)\,\Gamma, \qquad C_B\Gamma = T_B(1-T_S)\,\Gamma$$

$$C_H\Gamma = T_H\big(\Gamma - C_S\Gamma - C_A\Gamma - C_B\Gamma\big)$$

$$\Gamma = \textstyle\sum_R C_R\Gamma + r$$

只有分组表达式被压低（例 9.2）：单个链项一般不可积（例如离壳三角图中的 $T_{C_1}\Gamma$ 对任何 ε 都不绝对可积），被压低并满足 (CS1)–(CS3) 的是分组表达式 $C_R\Gamma$ 与余项 r。

图 1.1　区域的偏序与减除（示意；钳夹集画成区域）。单圈顶点的钳夹集彼此嵌套：软钳夹集 π_S（绿色）同时含于两个共线钳夹集 π_A（蓝）、π_B（橙）之中，且恰为二者之交 $\pi_S = \pi_A \cap \pi_B$（逐线交 $A \wedge B = S$）；所有钳夹集都含于硬区 $\pi_H = \Omega$。减除自最小区域（软）开始，依次为 ① T_S、② T_A, T_B、③ T_H：较大区域的近似子作用于减去较小区域贡献之后的被积函数，$C_R\Gamma \equiv T_R\big(\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma\big)$（定义 9.3）。单个链项一般不可积，只有分组表达式满足 (CS1)–(CS3)。

第 9 章　dummy chapter 9

引理 9.1　dummy `lem:method-meets`

例 9.2　dummy `ex:method-naive-induction`

定义 9.3　dummy `def:method-subtraction`