

Homomorfizem kalobarjev:

$$p(a) + p(b) = p(a+b)$$

$$p(a) \cdot p(b) = p(a \cdot b)$$

$$p(1) = 1$$

$$G/\ker p \cong \text{im } p$$

↑
edinka

Homomorfizem algebr: H. kalobarjev + linearne preslikave

$$\bullet N \triangleleft G \iff aNa^{-1} \subseteq N$$

$$\bullet |G:H| = 2 \implies H \triangleleft G$$

$$\bullet H \leq G, N \triangleleft G \implies HN = NH \leq G$$

$$\bullet N \triangleleft G, M \triangleleft G \implies NM = MN \triangleleft G$$

$$\bullet H \leq G, N \triangleleft G \implies$$

$$1) N \cap H \triangleleft H \quad (2. \text{ izrek o izomorfizmu})$$

$$2) N \triangleleft HN$$

$$3) HN/N \cong H/(N \cap H)$$

$$\bullet M, N \triangleleft G, M \subseteq N \implies$$

$$1) M \triangleleft N$$

(3. izrek o izomorfizmu)

$$2) \frac{N}{M} \triangleleft \frac{G}{M}$$

$$3) \left(\frac{G}{M} \right) / \left(\frac{N}{M} \right) \cong \frac{G}{N}$$

Velja $H \leq G$ $N \trianglelefteq G$ $\varphi: G \rightarrow G'$

$$\varphi_*(H) \leq G' \quad \varphi_*(N) \trianglelefteq G'$$

$$\varphi^*(H') \trianglelefteq G \quad \varphi^*(N') \trianglelefteq G$$

• G nima pravih netrivialnih podgrup $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_p$

• G abelova $\wedge p \mid G \Rightarrow \exists a \in G. \text{red } a = p$

• $N \trianglelefteq G, a \in G \Rightarrow (\text{red } aN) \mid (\text{red } a)$

• ciklična grupa $\langle x \rangle$ je abl.

Ideal: $I \subseteq K \quad I \neq \emptyset$

- $(I, +)$ je podgrupa $a - b \in I$
- $\forall a \in I. \forall x \in K. ax \in I \wedge xa \in I$

glavni ideal $(a) = aK = Ka$
($\forall I \ni a. aK \subseteq I$) (če K komutativen)

Najmanjši ideal ki vsebuje a :

$$K_a K = \left\{ \sum_{i=0}^n x_i a y_i ; \forall n \in \mathbb{N}. x_i, y_i \in K \right\}$$

• če ideal vsebuje obrnljiv element je $I = K$

$$- I \cdot J = \left\{ \sum_{i=0}^n x_i y_i ; \forall n \in \mathbb{N}. x_i \in I, y_i \in J \right\}$$

$$- I + J$$

- $I \cap J$ so vsi ideal:

$$\bullet (I + J) / J \cong I / I \cap J$$

Korespondenčni izrek:

- Podkolobarji v K/I so natanko oblike L/I ; $L \leq K, I \subseteq L$
- $J \triangleleft K, I \subseteq J$. K/I so oblike J/I
- K komutativen kolobar.
 $M \triangleleft K$ je maksimalen $\Leftrightarrow K/M$ je polje
- \forall pravi ideal je vsebovan v maksimalnem

$$\begin{aligned}
 ij &= k & ji &= -k & ki &= j \\
 ik &= -j & jk &= i & kj &= -i
 \end{aligned}$$

Podgrupa: asociativnost

monoid: enota

grupa: inverz

abelova grupa: komutativnost

Kolobar: abelova grupa + monoid
+ distributivnost

Obseg: Kolobar + inverz

Polje: komutativen obseg

vektorski prostor: (abelova grupa +)

$$(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$$

$$\alpha(v + u) = \alpha v + \alpha u$$

$$(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v)$$

$$1v = v$$

algebra Kolobar + vektorski prostor

$$\lambda(vu) = (\lambda v)u = v(\lambda u)$$

$$a^2b = ba^2$$

$$a^3b^4 = b^4a^3$$

$$ab = a^8b^8 =$$

$$a^3b^{-3} = b^{-3}a^{-4}$$

$$a^7 = 1$$

$$= a^6a^2bb^7 = a^6ba^2 =$$

$$= a^4 \underbrace{a^2b} a^2 = a^{2+2}ba^4 = a^2ba^6 = ba^8 = ba$$