


1.1.

$$A = [-1, 1] \times [-1, 1]$$

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}/A$$

hoc



a) $g^*((-\infty, 0] \times (-\infty, 0])$

ni: opty
ni: opty

$$g^*((-\infty, 0] \times (-\infty, 0])$$




b) $g^*(\mathbb{R}^2 - (-\infty, 0] \times (-\infty, 0])$

ni: opty
ni: opty




c) $g^*([-2, 2] \times [-2, 2])$

opty




g^*
 g^*




5)

$$g^*([2, 2] \times [2, 2])$$



\rightarrow




opty

ni: opty

d) ni: opty

14

$$a) [-2, 2] / [-1, 1] \cong [-1, 1]$$


$$b) [-1, 1] / \mathbb{Z} \cdot 1, 0, 1, 2$$

$$[-1, 1]$$

$$\cong \text{circle}$$

$$c) \mathbb{R} / \mathbb{Z}$$

8

$$\mathbb{R}^n /_{K(0,1)} \xrightarrow{\approx} \mathbb{R}^n$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^n \\ \downarrow & & \\ \mathbb{R}^n /_{K(0,1)} & & \end{array}$$

$$f(\vec{a}) := \begin{cases} 0; & \text{ce } |\vec{a}| \leq 1 \\ \vec{a} - \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}; & \text{ce } \vec{a} \in \mathbb{R}^n - \overline{K(0,1)} \end{cases}$$

$$d) \quad \mathbb{R}^n / \sim \quad x \sim y \Leftrightarrow \|x\| = \|y\|$$

$$\mathbb{R}^n / \sim \xrightarrow{\sim} [0, \infty)$$

$$f: \mathbb{R}^n \longrightarrow [0, \infty)$$

$$f(\vec{x}) = \|\vec{x}\| \quad \text{je sur}$$

$$a \in [0, \infty) \quad (a, 0, 0, \dots) \mapsto a$$

$$[x] = [y] \Leftrightarrow \|x\| = \|y\| \Leftrightarrow f(x) = f(y)$$

je zame

iščemo preslikavo s , da

$$\text{velja} \quad f \circ s = \text{id}_{[0, \infty)}$$

$$s: a \mapsto (a, 0, \dots)$$

Dokažimo da je $r \circ s = \text{id}_Y$

\Rightarrow r kvocientna, sukvotna

$$S \subseteq Y \text{ takoda } r^*(S) \text{ odg. v } X$$

$$S = s^*(r^*(S)) =$$

$$= (s^* \circ r^*)(S) = (r \circ s)^*(S) =$$

$$\text{id}_Y^*(S) = S$$

$\Rightarrow S$ je odgorta

f)

$$S^n \times [-1, 1] / \{S^n \times \{-1\}, S^n \times \{1\}\} \cong S^{n+1}$$

$$f: X \rightarrow S^{n+1}$$


$$(x, t) \mapsto (xb, t) = (\sqrt{1-t^2}x, t)$$

\uparrow
anotado valla

$$\|xb\|^2 + \|t\|^2 = 1$$

$$\|b\|^2 + \|t\|^2 = 1$$

$$b = \sqrt{1-\|t\|^2} = \sqrt{1-t^2}$$



$$G/H = \{g \cdot h; g \in G\} =$$

$$= \{ \{g \cdot h; h \in H\}; g \in G \}$$

G top. grupe

$$a \in G$$

$$L_a: G \longrightarrow G$$
$$x \longmapsto a \cdot x \quad \text{leva transkacija}$$

$$a, b \in G$$

$$h: G \longrightarrow G$$

$$h(a) = b \quad h = ?$$

$$L_{a^{-1}}: x \longmapsto ba^{-1}x$$

možnosti

$$ba^{-1}x$$
$$xa^{-1}b$$
$$bxa^{-1}$$
$$a^{-1}xb$$

topološke grupe zahtevajo

povsod isto, ker lahko vzelo

točko prestikano v drugo s homeomorfizmom

2.1.

a)

$A \subseteq G$ desica $\Leftrightarrow b a^{-1} A$ desica $b \in G$

$$\exists U^{*dr} \subseteq A, a \in U$$

$$b \in b a^{-1} A$$

$$a \in U \Rightarrow b a^{-1} a \in \underbrace{b a^{-1} U}_b \subseteq b a^{-1} A$$

ker je $L_{b a^{-1}}$ homeomorfizem je

$$b a^{-1} U \stackrel{\subseteq A}{\text{odprta v } G}$$

\Leftarrow potem velja tudi obratno

b) $H \leq G$ H dedice 1 $\Rightarrow H$ odg: n zap v G

$$a \in aH \subseteq H$$

$\Rightarrow H$ je dedica
vsake svoje tocke

G/H je adf.

$$aH \cap H = \emptyset \Rightarrow aH = H$$

$$a \in G/H \Rightarrow aH \cap H \neq \emptyset \Rightarrow$$

vsek element ima dedico ki ne
seka $H \Rightarrow H$ je zaprta

c) C komponente $1 \in C$

$\Rightarrow C$ zaprt edinka v G

$$C \subseteq G$$

$L_a: x \mapsto ax$ je homomorfizem za $\forall a \in C$

$$\forall a \in C. L_a \subseteq C$$

L_a ohranja povezanost

$$\text{Pravi tako } L_a \cdot 1 = a \Rightarrow$$

$$L_a \cdot C \cap C \Rightarrow L_a C \subseteq C$$

invertiranje: invertiranje je tudi x homeo $i: x \mapsto x^{-1}$
 \Rightarrow po istih argumentih ~~na~~

Ali je edinka?

$$\forall a \in G. aC = Ca \Leftrightarrow aCa^{-1} \subseteq C$$


$x \mapsto axa^{-1}$ je homeomorfizem

\Rightarrow je povezano in $a \text{ id } a^{-1} = \text{id} \in C$

$$\Rightarrow aCa^{-1} \subseteq C$$

\rightarrow ker je kompozitna tvel transkacij
(leva in desna)

d) za G je



$$a, b \in G$$

$$\text{memo } L_{ba^{-1}}$$

$$\exists U \subseteq G \quad a \in U, b \notin U \quad \text{BŠZS}$$

$$U^{-1} = \{a^{-1} : a \in U\}$$

$$a \in U^{-1} \Rightarrow b \quad a \mapsto b$$

$$\text{Pretpno da } a \in aU^{-1}b$$

$$\exists c \in U, a = ac^{-1}b$$

$$\Rightarrow b = c \Rightarrow b \in U \quad \times$$

$$\tau_1 \Rightarrow \tau_2$$

$$\exists U, V \subseteq G, \quad a \in U, b \in V, \quad a \notin V \quad L \notin U$$

$$\Delta \subseteq G \times G \text{ je } \Delta \subseteq G \times G$$

$$\Delta_0 = f^*(\{1\})$$

$$f: (k, x) \mapsto xy^{-1}$$

za svaku grupu G je Δ_0 je

$$\textcircled{2} \quad T_{cc} \in T_1 \text{ in } n: T_2$$

$$\Rightarrow (\mathbb{R}, +) \text{ nichtgruppe zu } T_{cc}$$

$$(\ker 1, d)$$

(2.3) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}^2$

$\Delta (m, n)(x, y) := (m+x, n+y)$

$\Phi: g \mapsto (a \mapsto g \cdot a)$

bijekcija (izomorfizam)

$\Phi: G \rightarrow \text{Bij}(A) \leftarrow \text{grupa}$


za kompozicije

Ubišdu: $\Phi: G \rightarrow (\text{Konec}(A), \circ)$
 $\mathcal{L}(AA)$




maemo $[0, 1) \cong \mathbb{R}^2 / \Phi$

Na nivouju množice
 za nivouju topologije? NC



Dobimo torus

 $\cong S^1 \times S^1$

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow S^1 \times S^1$

$(x, y) \mapsto (e^{2\pi i x}, e^{2\pi i y})$

Tuk nismu pokazali već i