

KẾT QUẢ CAN THIỆP STENT GRAFT BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH CHỦ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG


BS. CKII. Trần Phước Hòa

NỘI DUNG

1. Đặt vấn đề
2. Mục tiêu
3. Đối tượng và PP nghiên cứu
4. Kết quả
5. Kết luận

ĐẶT VẤN ĐỀ

- **Tỷ lệ tử vong cao: nếu không điều trị**
 - **50% trong 48 giờ đầu**
 - **80% trong 2 tuần đầu**
 - **90% sau 3 tháng**
 - **92% trong 1 năm**
- **Điều trị nội khoa: tỷ lệ tử vong 58% (*)**
- **Điều trị: can thiệp / phẫu thuật: tỷ lệ tử vong 20%**



(*)Selke (2005): *Surgery of the Aortic root and ascending Aorta, Surgery of chest* (pp.1115-1135), Saunder

MỤC TIÊU

- **Mô tả một số đặc điểm kỹ thuật trong đặt stent graft**
- **Đánh giá kết quả thành công bước đầu đặt stent graft**


ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- **Đối tượng nghiên cứu**

- Tất cả các cas phình, bóc tách được thực hiện

- **Đối tượng loại trừ**

- Suy thận nặng
- Suy kiệt nặng
- TBMM não
- Ung thư
- Hôn mê
- Dị ứng với thuốc cản quang....



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- **Phương pháp nghiên cứu**
 - Nghiên cứu mô tả chuỗi ca bệnh (Case series)
- **Xử lý số liệu**
 - SPSS 20.0 để nhập và phân tích số liệu




KẾT QUẢ

Tuổi:

- Cao nhất là 86 tuổi
- Thấp nhất là 42 tuổi

Giới



KẾT QUẢ

- Thời gian



- Nhập viện Can thiệp là $7,14 \pm 2,8$ ngày
- Nhập viện Xuất viện là $12,71 \pm 4,2$ ngày

- Stent

- Đặt stent graft CC chiếm(14,28%)
- Đặt stent graft chương trình(85,72%)
- Đặt stent graft trên mỗi bệnh nhân($2,43 \pm 5,74$)



KẾT QUẢ KỸ THUẬT

- **32 Cas (100%)**



KẾT QUẢ KỸ THUẬT

- **Debranching 6 cas (18,75%) - Có 3 Cas phải lưu lại hs > 7j**



BIẾN CHỨNG TRÊN KỸ THUẬT


- Dò tồn lưu 3 cas (9,38%)
- Tụ máu ở cổ 3 cas (9,38%)
- Tụ máu vùng đùi 2 cas (6,25%)
- Sốt $\geq 38^{\circ}\text{C}$ có 5 Cas (15,63%)
- Tăng Creatinin sau mổ 4 cas (12,5%)

BÀN LUẬN

- Tuổi: # 70 tuổi phù hợp
 - Giới: chúng tôi Nam/nữ = 3/4
 - Các tác giả khác Nam/Nữ 5/1
-
- Thời gian từ nhập viện đến can thiệp $7,14 \pm 2,8$
 - Theo nghiên cứu của INSTEAD (12 ngày)

BÀN LUẬN

- 100% thành công về mặt kỹ thuật
- Có 2 cas tử vong sau can thiệp (6,25%)
 - Tỷ lệ tử vong của TG (2,4%)
- Có 2 cas can thiệp lại type IIIA (6,25%)
- Che ĐM dưới đòn có chủ ý là (18,75%)
 - Theo INSTEAD (24,3%)



BÀN LUẬN

- Suy thận cấp chiếm (12,5%)
- Các tác giả khác là (26%)
- Báo cáo tương tự ở Nhật Bản

 Hồi phục sau can thiệp

- Sốt sau can thiệp 2 cas chiếm (14,28%)
- Nghiên cứu của DAN YU (85,9%)

 Hội chứng sau đặt stent graft (postimplantation syndrome)

VIDEO



BS HOA.mp4

KẾT LUẬN

- Chúng tôi còn rất hạn chế về số lượng
- Bước đầu cho thấy hiệu quả rất tốt
- Kỹ thuật stent graft hoàn toàn có thể thực tại BVĐK HMCL
- Tỷ lệ thành công cao và biến chứng thấp

THANK YOU!

