



Semaine 2 - Algèbre de Boole

Informatique fondamentale

présenté par

Revekka Kyriakoglou

le

01 fevrier 2023

Plan du cours

- 1 Algèbre booléenne
 - Binaire vers Décimale
 - Addition
 - Multiplication et division
 - Notation
 - Fonctions booléennes

Algèbre booléenne



Le langage de l'ordinateur :

Les ordinateurs ne comprennent pas le langage humain. Grâce au logiciel modern, l'utilisateur ne le sait pas, mais aux niveaux les plus bas de votre ordinateur, tout est représenté par un signal électrique binaire : 1 ou 0.



Binaire-Décimale

Le binaire est un système numérique de base 2.

Question

Qu'est-ce que le système décimal?

Binaire-Décimale

Le binaire est un système numérique de base 2.

? Question

Qu'est-ce que le système décimal?

Formule de conversion binaire-décimale :

Binary Number = $(d_{n-1} ... d_2 d_1 d_0)_2$

(Decimal Number)₁₀ =
$$(d_0 \times 2^0) + (d_1 \times 2^1) + \dots + (d_{n-1} \times 2^{n-1})$$

Binaire-Décimale

Le binaire est un système numérique de base 2.



Question

Qu'est-ce que le système décimal?

Formule de conversion binaire-décimale :

Binary Number = $(d_{n-1} \dots d_2 d_1 d_0)_2$


(Decimal Number)₁₀ =
$$(d_0 \times 2^0) + (d_1 \times 2^1) + \cdots + (d_{n-1} \times 2^{n-1})$$

Exemple

$$(11001011)_2 = (203)_{10}$$


Décimale-Binaire

Conversion décimale-binaire : Repeated Division-by-2 Method



Décimale-Binaire


Conversion décimale-binaire : Repeated Division-by-2 Method





Décimale-Binaire

Conversion décimale-binaire : Repeated Division-by-2 Method



Question Transformez (156)₁₀ en binaire : (156)₁₀ = (10011100)₂

Addition de nombres binaires



Addition

L'addition de nombres binaires se fait en ajoutant les chiffres à partir du côté droit des nombres, de la même manière que nous additionnons deux ou plusieurs nombres en base 10.

Addition de nombres binaires



Addition

L'addition de nombres binaires se fait en ajoutant les chiffres à partir du côté droit des nombres, de la même manière que nous additionnons deux ou plusieurs nombres en base 10.

Exemple

$$(1001)_2 + (111)_2 = (10000)_2$$



- ? Question
- Faites l'addition $(110)_2 + (1010)_2 + (1001)_2$

?

Question

Faites l'addition $(110)_2 + (1010)_2 + (1001)_2 = (11001)_2$

11001



Multiplication

Pour résoudre un problème de multiplication binaire, nous devons suivre le même processus de multiplication et d'addition que nous utiliserions avec les nombres décimaux.



Multiplication

Pour résoudre un problème de multiplication binaire, nous devons suivre le même processus de multiplication et d'addition que nous utiliserions avec les nombres décimaux.

Nous devos comprendre comment fonctionne l'addition avec les nombres binaires!!!



Multiplication

Pour résoudre un problème de multiplication binaire, nous devons suivre le même processus de multiplication et d'addition que nous utiliserions avec les nombres décimaux.

Nous devos comprendre comment fonctionne l'addition avec les nombres binaires!!!

Exemple

$$(1010)_2 \times (1111)_2 = (10010110)_2$$



Multiplication

Pour résoudre un problème de multiplication binaire, nous devons suivre le même processus de multiplication et d'addition que nous utiliserions avec les nombres décimaux.

Nous devos comprendre comment fonctionne l'addition avec les nombres binaires!!!

Exemple

$$(1010)_2 \times (1111)_2 = (10010110)_2$$



Question

Faites la multuplication $(110)_2 \times (101)_2$



Multiplication

Pour résoudre un problème de multiplication binaire, nous devons suivre le même processus de multiplication et d'addition que nous utiliserions avec les nombres décimaux.

Nous devos comprendre comment fonctionne l'addition avec les nombres binaires!!!

Exemple

$$(1010)_2 \times (1111)_2 = (10010110)_2$$



Question

Faites la multuplication $(110)_2 \times (101)_2 = (011110)_2$

Division de nombres binaires



Division

La division binaire s'effectue à l'aide de soustractions et de décalages, comme la division décimale.



Le bit du quotient est :

- 1 si on peut soustraire le diviseur,
- sinon il est 0.

Division de nombres binaires



Division

La division binaire s'effectue à l'aide de soustractions et de décalages, comme la division décimale.



Le bit du quotient est :

- 1 si on peut soustraire le diviseur,
- sinon il est 0.

Exemple

```
(10110)2/(11)2
0101
0100
```

Expression booléenne

Pour simplier l'écriture,

- on notera l'opération booléenne ET multiplicativement,
- on notera l'opération booléenne **NON** par un accent plat,
- on notera l'opération booléenne OU additivement.

Question

Transformez $(a \wedge b) \vee \neg c$:

Expression booléenne

Pour simplier l'écriture,

- on notera l'opération booléenne ET multiplicativement,
- on notera l'opération booléenne NON par un accent plat,
- on notera l'opération booléenne OU additivement.

Question

Transformez $(a \wedge b) \vee \neg c$:

 $ab + \overline{c}$

Tables de vérité

Les tables de vérité de disjonction et de conjonction peuvent être transformés en tables d'addition et tables de multiplication.

Tables de vérité

Les tables de vérité de disjonction et de conjonction peuvent être transformés en tables d'addition et tables de multiplication.

+	0	1
0	0	1
1	1	1

Propriétés

- Associativité : ((a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c) et (ab)c = a(bc) = abc
- Commutativité : a + b = b + a et ab = ba
- Distributivité : a(b+c) = ab + ac et a + (bc) = (a+b)(a+c)
- Idempotence : $a + a + \cdots + a = a$ et $aa \dots a = a$
- Élément neutre : a + 0 = 0 + a = a et a1 = 1a = a
- Absorption : 0a = 0 et 1 + a = 1
- De Morgan : $\overline{(a+b)} = \overline{a} + \overline{b}$
- Involution : $\overline{\overline{a}} = a$
- Tiers-exclus : $a + \overline{a} = 1$
- Non-contradiction : $a\overline{a} = 0$

Autres opérations binaires

- Implication : $a \Rightarrow b = \overline{a} + b$
- **Equivalence** : $a \Leftrightarrow b = (\overline{a} + b)(\overline{b} + a)$

Autres opérations binaires

- Implication : $a \Rightarrow b = \overline{a} + b$
- **Equivalence**: $a \Leftrightarrow b = (\overline{a} + b)(\overline{b} + a)$

\Leftrightarrow	0	1
0	1	0
1	0	1

Definition

Une fonction booléenne est une fonction qui a *n* variables ou entrées et qui ne suppose que 0 ou 1 dans sa sortie.

Definition

Une fonction booléenne est une fonction qui a *n* variables ou entrées et qui ne suppose que 0 ou 1 dans sa sortie.

Les *n* variables ou entrées implique qu'il existe . . . combinaisons possibles de variables.

Definition

Une fonction booléenne est une fonction qui a *n* variables ou entrées et qui ne suppose que 0 ou 1 dans sa sortie.

Les *n* variables ou entrées implique qu'il existe 2ⁿ combinaisons possibles de variables.

Exemple

La fonction booléenne associée avec la formule $(P \land Q) \lor R$ est :

$$f(a,b,c) = a.b + c$$

avec $a \in P, b \in Q, c \in Q$.



Nous pouvons créer la table de vérité de la fonction.



Nous pouvons créer la table de vérité de la fonction.

Exemple

La fonction booléenne associée avec la formule $(P \land Q) \lor R$ est :

$$f(a,b,c)=a.b+c$$

а	b	С	f(a,b,c)
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



Nous pouvons créer la table de vérité de la fonction.

Exemple

La fonction booléenne associée avec la formule $(P \land Q) \lor R$ est :

$$f(a,b,c)=a.b+c$$

а	b	С	f(a,b,c)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Minterms et Maxterms

Terme somme (Sum terms)

est une fonction composée uniquement de sommes.

Terme produit (Product terms)

est une fonction composée uniquement de produits.

Maxterm

de *n* variables est une somme de variables dans laquelle chacune apparaît exactement une fois sous forme vraie ou complémentée.

Minterm

de n variables est un produit des variables dans lequel chacune apparaît exactement une fois sous forme vraie ou complémentée.

■ Toute fonction booléenne peut s'exprimer par une expression booléenne constituée de la somme des minterms qui correspondent à chaque sortie à 1 dans sa table de vérité.

■ Toute fonction booléenne peut s'exprimer par une expression booléenne constituée de **la somme des minterms** qui correspondent à chaque **sortie à** 1 dans sa table de vérité.

Toute fonction booléenne peut s'exprimer par une expression booléenne constituée du produit des maxterms qui correspondent à chaque sortie à 0 dans sa table de vérité.

