

MIMS integrated

(API Guide for VN Contraindication)

VN CONTRAINDICATION ALERT

CONTENTS

Document Revision Control	1
Intended Audience.....	1
Scope of the Document	1
Sample Mapped File	2
VN Contraindication ALERT Request XML structure	2
VN Contraindication ALERT Result XML structure	3
VN Contraindication ALERT (“result.html”)	4
Testing VN_Contraindication using Postman.....	4

DOCUMENT REVISION CONTROL

Date	Version	Changes	Author(s)	Title
2024	1.0			

INTENDED AUDIENCE

- Business and technical analysts.
- Application developers.

SCOPE OF THE DOCUMENT

This document provides an integration guide on MIMS VN Contraindication Alert to system integrator. It includes :

- the Request XML structure
- Result XML structures

Sample Mapped Files

Hospital Formulary Master

Item code	Brand_Name	Item_Generic_Name	VN_Molecule
DurgCode1	Aceronko 1	Acenocoumarol	Acenocoumarol
DurgCode2	Aspirin 81	Aspirin	Aspirin
DurgCode3	Tegretol 200	Carbamazepine	Carbamazepin
DurgCode4	Agilecox 200	Celecoxib	Celecoxib
DurgCode5	Ciprobay 400mg	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin
DurgCode6	Ciprobay 200	Ciprofloxacin lactate	Ciprofloxacin
DurgCode7	Voltaren Emulgel	Diclofenac diethylamine	Diclofenac
DurgCode8	Cataflam 25	Diclofenac kali	Diclofenac
DurgCode9	Motilium-M	Domperidone maleate	Domperidon
DurgCode10	Mobimed 7.5	Meloxicam	Meloxicam

VN CONTRAINDICATION ALERT

XML Request and Response for VN CONTRAINDICATION Alert

Request XML Structure for VN Contraindications Alert.

```

<Request>
<Interaction>
<Prescribing>
<ItemCode=" 21863" />
<ItemCode=" 10226" />

<ItemCode="20824" />
<ItemCode="19007" />
</Prescribing>
</Interaction>
</Request>

```

You need to add the Drugs in prescribing tag

Current Medication

Previous Medication

Result XML Structure for VN Contraindications Alert.	<pre> <Result> <Interaction> <DANH_SACH_TUONG_TAC> <CAP_TUONG_TAC> <CapTuongTac>[Aspirin] - [Ketorolac]</CapTuongTac> <HoatChat_1>Aspirin 500mg Agimexpharm [Aspirin]</HoatChat_1> <HoatChat_2>Acuvail eye 4.5mg/ml 0.4ml [Ketorolac]</HoatChat_2> <CacThuocCoKhaNangGayTuongTac/> <MucDoTuongTac/> <ThoiGianKhoiPhat/> <MucDoNghiemTrong>Chống chỉ định</MucDoNghiemTrong> <DuLieuVeTuongTac/> <HauQuaCuaTuongTac>Tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng (sử dụng đồng thời ketorolac với 1 NSAID khác làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa gấp 5 lần so với phối hợp 2 NSAID khác)</HauQuaCuaTuongTac> <CoCheTuongTac>Hiệp đồng tác dụng kích ứng đường tiêu hóa</CoCheTuongTac> <XuTriTuongTac>Chống chỉ định phối hợp. Cần đặc biệt lưu ý nguy cơ tương tác trong trường hợp giảm đau hậu phẫu.</XuTriTuongTac> <BanLuan/> <TaiLieuThamKhao>Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế.</TaiLieuThamKhao> <TuyenBoMienTruTrachNhiem>Các cảnh báo và thông tin Chống chỉ định của VN do Bộ Y tế quy định chứ không phải từ MIMS hoặc bất kỳ nền tảng liên quan nào. Do đó, bất kỳ sự khác biệt hoặc quan ngại nào liên quan đến nội dung thì cần liên hệ MOH để làm rõ. MIMS từ chối mọi trách nhiệm về sai sót hoặc thông tin không chính xác. Người dùng cuối được khuyến khích xác minh thông tin với các kênh chính thức của Bộ Y tế Việt Nam. Người dùng cuối có trách nhiệm đánh giá tất cả thông tin trong bối cảnh lâm sàng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định kê đơn cuối cùng nào. Bằng cách truy cập và sử dụng thông tin này, người dùng thừa nhận rằng MOH là nguồn thông tin chính thức</TuyenBoMienTruTrachNhiem> </CAP_TUONG_TAC> <CAP_TUONG_TAC> <CapTuongTac>[Acenocoumarol] - [Tamoxifen]</CapTuongTac> <HoatChat_1>Acenocoumarol 1mg [Acenocoumarol]</HoatChat_1> <HoatChat_2>Nolvadex 10mg [Tamoxifen]</HoatChat_2> <CacThuocCoKhaNangGayTuongTac/> <MucDoTuongTac/> <ThoiGianKhoiPhat/> <MucDoNghiemTrong>Chống chỉ định có điều kiện</MucDoNghiemTrong> <DuLieuVeTuongTac/> <HauQuaCuaTuongTac>Tăng nguy cơ xuất huyết</HauQuaCuaTuongTac> <CoCheTuongTac>[Tamoxifen] ức chế CYP2C9 làm giảm chuyển hóa của acenocoumarol</CoCheTuongTac> <XuTriTuongTac>1. Chống chỉ định phối hợp ở bệnh nhân sử dụng tamoxifen dự phòng tiên phát ung thư vú.2. Ở bệnh nhân ung thư vú, nên cân nhắc sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp (LMWH) hoặc các thuốc chống đông đường uống tác động trực tiếp (DOAC) thay thế cho warfarin để điều trị thuyên tắc tĩnh mạch do huyết khối. Trong trường hợp bắt buộc sử dụng đồng thời tamoxifen với warfarin, cần giảm 1/2 đến 2/3 liều warfarin và theo dõi chặt chẽ bệnh nhân.</XuTriTuongTac> <BanLuan/> <TaiLieuThamKhao>Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế.</TaiLieuThamKhao> <TuyenBoMienTruTrachNhiem>Các cảnh báo và thông tin Chống chỉ định của VN do Bộ Y tế quy định chứ không phải từ MIMS hoặc bất kỳ nền tảng liên quan nào. Do đó, bất kỳ sự khác biệt hoặc quan ngại nào liên quan đến nội dung thì cần liên hệ MOH để làm rõ. MIMS từ chối mọi trách nhiệm về sai sót hoặc thông tin không chính xác. Người dùng cuối được khuyến khích xác minh thông tin với các kênh chính thức của Bộ Y tế Việt Nam. Người dùng cuối có trách nhiệm đánh giá tất cả thông tin trong bối cảnh lâm sàng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định kê đơn cuối cùng nào. Bằng cách truy cập và sử dụng thông tin này, người dùng thừa nhận rằng MOH là nguồn thông tin chính thức</TuyenBoMienTruTrachNhiem> </CAP_TUONG_TAC> </DANH_SACH_TUONG_TAC> </Interaction> </Result> </pre>
--	--

The Display of
VN
Contraindications
Alert to End User.
(Example)

Tương tác chống chỉ định VN (2)

⊗ Aspirin 500mg Agimexpharm [Aspirin] vs Acuvail eye 4.5mg/ml 0.4ml [Ketorolac] (Chống chỉ định)

✗ Acenocoumarol 1mg [Acenocoumarol] vs Nolvadex 10mg [Tamoxifen] (Chống chỉ định có điều kiện)

Tương tác chống chỉ định VN (2)

⊗ Aspirin 500mg Agimexpharm [Aspirin] vs Acuvail eye 4.5mg/ml 0.4ml [Ketorolac] (Chống chỉ định)

Mức Độ Tương Tác

Chống chỉ định

Cơ Chế Tương Tác

Hiệp đồng tác dụng kích ứng đường tiêu hóa

Hậu Quả Tương Tác

Tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng (sử dụng đồng thời ketorolac với 1 NSAID khác làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa gấp 5 lần so với phối hợp 2 NSAID khác)

Xử Trí Tương Tác

Chống chỉ định phối hợp. Cần đặc biệt lưu ý nguy cơ tương tác trong trường hợp giảm đau hậu phẫu.

Tài Liệu Tham Khảo:

Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế.

Tuyên Bó Miễn Trừ Trách Nhiệm:

Các cảnh báo và thông tin Chống chỉ định của VN do Bộ Y tế quy định chứ không phải từ MIMS hoặc bất kỳ nền tảng liên quan nào. Do đó, bất kỳ sự khác biệt hoặc quan ngại nào liên quan đến nội dung thì cần liên hệ MOH để làm rõ. MIMS từ chối mọi trách nhiệm về sai sót hoặc thông tin không chính xác. Người dùng cuối được khuyến khích xác minh thông tin với các kênh chính thức của Bộ Y tế Việt Nam. Người dùng cuối có trách nhiệm đánh giá tất cả thông tin trong bối cảnh lâm sàng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định kê đơn cuối cùng nào. Bằng cách truy cập và sử dụng thông tin này, người dùng thừa nhận rằng MOH là nguồn thông tin chính thức

✗ Acenocoumarol 1mg [Acenocoumarol] vs Nolvadex 10mg [Tamoxifen] (Chống chỉ định có điều kiện)

Testing VN_Contraindication using Postman

POST http://localhost:8080/RESTFTWebService/FTRequest/xmlrequestplus-vn Send

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description	Bulk Edit
☒ prescriptionquery	<Request><Interaction><Prescribing><ItemCod...		
☒ responsetype	xml		
Key	Value	Description	

Body Cookies Headers (5) Test Results 200 OK 140 ms 4.15 KB Save as example

Pretty Raw Preview Visualize Text

```

1 <Result>
2 <Interaction>
3 <DANH_SACH_TUONG_TAC>
4 <CAP_TUONG_TAC><CapTuongTac>[Aspirin] - [Ketorolac]</CapTuongTac><HoatChat_1>Aspirin 500mg Agimexpharm
  [Aspirin]</HoatChat_1><HoatChat_2>Acuvail eye 4.5mg/ml 0.4ml [Ketorolac]</
  HoatChat_2><CacThuocCoKhaNangGayTuongTac></MucDoTuongTac></ThoiGianKhoiPhat/
  ><MucDoNghiemTrong>Chống chỉ định</MucDoNghiemTrong><DuLieuVeTuongTac></HauQuaCuaTuongTac>Tăng nguy
  cơ xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng (sử dụng đồng thời ketorolac với 1 NSAID khác làm tăng nguy cơ
  xuất huyết tiêu hóa gấp 5 lần so với phối hợp 2 NSAID khác)</HauQuaCuaTuongTac><CoCheTuongTac>Hiệp
  đồng tác dụng kích ứng đường tiêu hóa
  
```