

Trabalho 1

Vignon Fidele Adanvo

August 8, 2022

1 Introdução

A distribuição Rice reproduz um cenário onde, além da linha de visada indireta (NLOS), existe uma linha de visada direta (LOS), conforme mostrado a Figura 1. Este documento apresenta a expressão analítica da função densidade de probabilidade, a média e a variância da distribuição de Rice em função de r . Denote-se N o número de amostra usado para gerar a variável da referida distribuição. Plota-se o histograma da variável gerada e a expressão analítica encontrada. Considera-se $\sigma = 1$ e diferentes valores de K . Compara-se a figura quanto ao número de amostra e o parâmetro K .




Figure 1: Cenário de Rice

2 Desenvolvimento analítico


Sendo x e y VA Gaussinas i.i.d. $\mu = 0$, desvio padrão σ e a uma constante, prove que se

$$re^{j\phi} = (x + a) + jy \quad (1)$$

Dada a dificuldade que algumas integrais apresentam, foi utilizada esta referência [1], que possui uma diversas integrais tabelada e o *Software wolfram mathematica*, que possibilita resolver integrais. O desenvolvido da afirmação 1 é apresentado a continuação


1º Trabalho de TP545

a) x e y são VA Gaussianas i.i.d com $\mu=0$, σ e K



$$S_r = a_1 e^{j\omega_0 t} + a_2 e^{j(\omega_0 t + \phi_1)} + a_3 e^{j(\omega_0 t + \phi_2)} + \dots$$

em banda base



$$S_r = a + a_1 e^{j\phi_1} + a_2 e^{j\phi_2} + \dots$$

$$= a + \sum_{k=1}^N a_k e^{j\phi_k}$$

$$= a + \sum_{k=1}^N a_k (\cos \phi_k + j \sin \phi_k)$$

$$= a + \sum_{k=1}^N a_k \cos \phi_k + j \sum_{k=1}^N a_k \sin \phi_k$$

Se N é suficientemente grande então o

$\sum_{k=1}^N a_k \cos \phi_k$ e $\sum_{k=1}^N a_k \sin \phi_k$ pode se considerar um VA

$$S_r = (a+x) + jy \quad \text{Is assumido que } x \text{ e } y \text{ são i.i.d}$$

$$S_r = r e^{j\theta} = (a+x) + jy$$

$$\text{sendo } r = \sqrt{(a+x)^2 + y^2} \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{a+x} \right)$$

$$\text{A pdf de } x \text{ e } y \quad p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$$

$$p(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$$

Proximo objetivo: Determina a pdf de (r, θ)

$$p(r, \phi) = p(x, y) \left| d \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ \phi \end{pmatrix} \right|$$

sendo verdadeiro que x e y são mud. indep.

$$\begin{aligned} p(x, y) &= p(x) p(y) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

$$d \begin{vmatrix} x & y \\ r & \phi \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial r} \\ \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \end{vmatrix}$$

$$r^2 = (a+x)^2 + y^2 \Rightarrow (a+x)^2 = r^2 - y^2$$

$$\tan \phi = \frac{y}{a+x} \Leftrightarrow y = (a+x) \tan \phi$$

$$(a+x)^2 = r^2 - (a+x)^2 \tan^2 \phi$$

$$r^2 = (a+x)^2 + (a+x)^2 \tan^2 \phi$$

$$= (a+x)^2 [1 + \tan^2 \phi]$$

$$= (a+x)^2 \left(1 + \frac{\sin^2 \phi}{\cos^2 \phi}\right)$$

$$= (a+x)^2 \left(\frac{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}{\cos^2 \phi}\right)$$

$$r^2 = (a+x)^2 \left(\frac{1}{\cos^2 \phi}\right)$$

$$r = (a+x) \frac{1}{\cos \phi} \Rightarrow a+x = r \cos \phi$$

$$x = r \cos \phi - a$$

$$y = (r \cos \phi - a) \frac{\sin \phi}{\cos \phi}$$

$$y = r \sin \phi$$

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \phi, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \phi, \quad \frac{\partial x}{\partial \phi} = -r \sin \phi, \quad \frac{\partial y}{\partial \phi} = r \cos \phi$$

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \phi)} \right| = \begin{vmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -r \sin \phi & r \cos \phi \end{vmatrix} = r \cos^2 \phi + r \sin^2 \phi = r(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = r$$

$$p(r, \phi) = \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\left(\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)} \quad \text{sendo } x = r \cos \phi - a \text{ e } y = r \sin \phi$$

$$= \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{[(r \cos \phi - a)^2 + (r \sin \phi)^2]}{2\sigma^2}}$$

$$= \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{[(r \cos \phi)^2 - 2ra \cos \phi + a^2 + (r \sin \phi)^2]}{2\sigma^2}}$$

$$= \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{[r(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + a^2 - 2ra \cos \phi]}{2\sigma^2}}$$

$$p(r, \phi) = \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\left(\frac{r^2 + a^2 - 2ra \cos \phi}{2\sigma^2}\right)}$$

$$p(r) = \int_{-\infty}^{\infty} p(r, \phi) d\phi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\left(\frac{r^2 + a^2 - 2ra \cos \phi}{2\sigma^2}\right)} d\phi$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(r^2+a^2)}{2\sigma^2}} e^{\frac{2ra \cos \phi}{2\sigma^2}} d\phi \quad \text{sendo } \phi \in [-\pi, \pi]$$

$$\rightarrow \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(r^2+a^2)}{2\sigma^2}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{\frac{2ra \cos \phi}{2\sigma^2}} d\phi = \frac{r}{2\pi\sigma^2} \int_{-\pi}^{\pi} e^{\frac{ra \cos \phi}{\sigma^2}} d\phi$$

a integral de $\int_{-\pi}^{\pi} e^{a \cos b} db = 2\pi I_0(a)$ por tanto

$$p(r) = \frac{r}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(r^2+a^2)}{2\sigma^2}} \cdot I_0\left(\frac{ar}{\sigma^2}\right)$$

$$\boxed{p(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{(r^2+a^2)}{2\sigma^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma^2}\right)} \quad (1)$$

Para $K = \frac{a^2}{2\sigma^2} \Rightarrow a = \sqrt{2K\sigma^2}$ sendo $a > 0$

Podemos realizar alguma transformação com (1)

$$p(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} e^{-K} I_0\left(\frac{r \cdot \sqrt{2K\sigma^2}}{\sigma^2}\right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Para realizar a} \\ \text{simulação} \end{array} \right.$$

b) Média

$$E(r) = \int_0^\infty r \cdot \left[\frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{(r^2+a^2)}{2\sigma^2}} I_0\left(\frac{r \sqrt{2K\sigma^2}}{\sigma^2}\right) \right] dr$$

$$r = -\frac{1}{\sigma^2}$$

b) Media de $\rho(r)$

$$M_r = \int_{-\infty}^{\infty} r f(r) dr$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} r f(r) dr$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} r \cdot \frac{r}{\sigma^2} e^{-\left(\frac{r^2+a^2}{2\sigma^2}\right)} I_0\left(\frac{ar}{\sigma^2}\right) dr$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{r^2}{\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma^2}\right) dr$$

$$= \frac{e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}}{\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma^2}\right) dr$$

$$\text{Seja } d = \frac{1}{2\sigma^2}$$

$$2d = \frac{1}{\sigma^2}$$

$$= \frac{e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}}{\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-d r^2} I_0(2d \cdot a \cdot r) dr$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-d r^2} I_0(2d \cdot a \cdot r) dr = \frac{e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}}{\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{4d(\log e)^{5/2}} \left(\frac{1}{2} I_1\left(\frac{d^2}{2a \log e}\right) + I_0\left(\frac{d^2}{2a \log e}\right) \right)$$

$$(d^2 + a \log e)$$

$$= \frac{1/2\sigma^2}{e^{a^2/2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{4d(\log e)^{5/2}} \left(\frac{1}{2} I_1\left(\frac{1/2\sigma^2}{2a \log e}\right) + I_0\left(\frac{1/2\sigma^2}{2a \log e}\right) \right)$$

$$\frac{1}{\sigma^2} + a \log e$$

→

Sabendo que

$$e^{\frac{a^2}{2\sigma^2}} \left[\left(1 - \frac{a^2}{\sigma^2}\right) I_0\left(-\frac{a^2}{2\sigma^2}\right) - \frac{a^2}{\sigma^2} I_1\left(\frac{a^2}{\sigma^2}\right) \right]$$

$$e^{\frac{a^2}{2\sigma^2}} \left[\left(1 - \frac{a^2}{\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{a^2}{2\sigma^2}\right) - \frac{a^2}{\sigma^2} I_1\left(\frac{a^2}{\sigma^2}\right) \right]$$

$$\begin{aligned} \mu &= \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} \left[\left(1 - \frac{a^2}{\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{a^2}{2\sigma^2}\right) - \frac{a^2}{\sigma^2} I_1\left(\frac{a^2}{2\sigma^2}\right) \right] \\ &= \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} L_{1/2}\left(-\frac{a^2}{2\sigma^2}\right) \end{aligned}$$

$$\mu_r = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} L_{1/2}\left(-\frac{a^2}{2\sigma^2}\right)$$

sendo $k = \frac{a^2}{2\sigma^2}$
Para $\sigma = 1$

$$\mu_r = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} L_{1/2}(-K)$$

$$K = \frac{a^2}{2\sigma^2} \Rightarrow a^2 = 2\sigma^2 K$$

Para $\sigma = 1$ e $K = 0$ então $a = 0 \Rightarrow$ implica distribuição Rayleigh

$$\begin{aligned} \mu_0 &= 1 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} L_{1/2}(0) \\ &= 0,88 L_{1/2}(0) \end{aligned}$$

$$\mu = 1,25$$

Para $\sigma = 1$ e $K = 1 \approx a = \sqrt{2 \cdot 1 \cdot 1} = \sqrt{2} \neq 0$ distribuição Rice

$$\mu = 2 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} L_{1/2}(1) = 1,25 \times 1,44 = 1,8$$

Para $\sigma_1, K=1, M=1.832$

c) calcular a variancia

$$\sigma_r^2 = \int_0^{\infty} (r - M)^2 f(r) dr$$

$$= \int_0^{\infty} (r^2 - 2rM + M^2) f(r) dr$$

$$= \int_0^{\infty} r^2 f(r) dr - \int_0^{\infty} 2rM f(r) dr + M^2 \int_0^{\infty} f(r) dr$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{r^3}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr - \int_0^{\infty} \left[\sigma_1 \sqrt{\frac{\pi}{2}} L_{1/2}\left(-\frac{a^2}{2\sigma_1^2}\right) \right]^2 \frac{r}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr$$

$$+ \left[\sigma_1 \sqrt{\frac{\pi}{2}} L_{1/2}\left(-\frac{a^2}{2\sigma_1^2}\right) \right]^2 \int_0^{\infty} \frac{r}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{r^3}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr - \underbrace{\left[\sigma_1 \sqrt{\frac{\pi}{2}} L_{1/2}\left(-\frac{a^2}{2\sigma_1^2}\right) \right]^2}_{M} \int_0^{\infty} \frac{r^2}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr +$$

$$\sigma_1^2 \frac{\pi}{2} L_{1/2}^2\left(-\frac{a^2}{2\sigma_1^2}\right) \int_0^{\infty} \frac{r}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{r^3}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr - \left[2\sigma_1 \sqrt{\frac{\pi}{2}} L_{1/2}\left(-\frac{a^2}{2\sigma_1^2}\right) \cdot \sigma_1 \sqrt{\frac{\pi}{2}} L_{1/2}\left(-\frac{a^2}{2\sigma_1^2}\right) \right] +$$

$$\sigma_1^2 \frac{\pi}{2} L_{1/2}^2\left(-\frac{a^2}{2\sigma_1^2}\right) \int_0^{\infty} \frac{r}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{r^3}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr - 2\sigma_1^2 \frac{\pi}{2} L_{1/2}^2\left(-\frac{a^2}{2\sigma_1^2}\right) \left[1 - \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{r}{\sigma_1^2} e^{-\frac{(a^2+r^2)}{2\sigma_1^2}} I_0\left(\frac{ar}{\sigma_1^2}\right) dr \right]$$

Aplicando a referência ① e usando wolfram

$$\sigma_r^2 = 2\sigma^2 + a^2 - \frac{\pi\sigma^2}{2} L_{1/2}^2\left(-\frac{a^2}{2\sigma^2}\right)$$

Para $K = \frac{a^2}{2\sigma^2} \Rightarrow a^2 = 2\sigma^2 K$

$$\sigma_r^2 = 2\sigma^2 + 2\sigma^2 K - \frac{\pi\sigma^2}{2} L_{1/2}^2(-K)$$

Para $\sigma_1 = 1$ e $K = 0$

$$\sigma_r^2 = 2 + 2 \cdot 1 \cdot 0 - \frac{\pi}{2} L_{1/2}^2(0)$$

$$= 2 - \frac{\pi}{2}(1) =$$

$\sigma_r^2 = 0,42$ equivalente a distribuição de Rayleigh.

Para $\sigma_1 = 1$ e $K = 1$

$$\sigma_r^2 = 2 + 2 - \frac{\pi}{2} L_{1/2}^2(-1)$$

$$= 4 - \frac{\pi}{2}(1,44)^2$$

$$= 4 - 3,25 = 0,75$$

3 Simulação

O **script** da simulação encontra-se na pasta integrável. Basicamente o **Script** tem três funções: uma para a geração numérica dos valores de r , uma para plotar a expressão analítica e um para o programa principal. Será necessário uma versão de **python3** e a instalação de algumas bibliotecas (numpy, matplotlib.pyplot) para reproduzir o ambiente de simulação.

4 Comentário da figurar

As Figuras 2 e 3 mostram a simulação do histograma e a curva analítica dos valores r gerados respectivamente. Considera-se mil amostras e um milhão de amostras ($N = 1000$ e $N = 1000000$), $K = 8$ e $\sigma = 1$. Observa-se que quanto maior o número de amostra de N , maior é a precisão do valor de r . Portanto, o número de amostra deve ser suficientemente grande para que o modelo numérico seja realista ou próximo do analítico. Dessa forma, será possível minimizar o erro. Em particular neste cenário, um milhão amostra são suficiente para obter uma margem de error relativamente pequeno.




Figure 2: Função densidade probabilidade com $N = 1000$

A Figura 4 mostra a simulação realizada variando o parâmetro K . Observa-se que o valor que r (que representa o ganho do canal) cresce junto ao valor de K . Por exemplo, para $K = 0$, a probabilidade de ter r maior que 4 é quase 0, enquanto $K = 8$ essa probabilidade é maior que 0.5. Da mesma forma, para um valor muito baixo de r , ou seja, menor que 1, são necessários valores baixos de K para alcançar uma probabilidade muito alta ou seja $p(r)$. Portanto, dependendo da probabilidade a ser alcançada, este valor K deve ser ajustado adequadamente.




Figure 3: Função densidade probabilidade com $N = 100000$




Figure 4: Função densidade probabilidade variando K

5 Conclusão

Neste trabalho, foi apresentada a simulação do modelo numérico e analítico da distribuição de Rice. A média e a variância foram calculadas. As simulações realizadas foram comparadas com o número da amostra e com o valor de K . O valor de N determina a precisão das amostras e o valor de K dá uma ideia do desempenho.

References

- [1] I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik, *Table of integrals, series, and products*. Academic press, 2014.