

FICHE
01

CONTEXTE RÉGIONAL

FICHE DE SYNTHÈSE DES
RÉSULTATS DE RECHERCHE



Sous la direction scientifique de Solène BERTRAND-PROTAT (UNC-LIRE/CPS) et Olivier GALY (UNC-LIRE)

Rédaction : Ludovic BREAU (UNC-D2S)

Mots-clés : étude bibliographique, statut pondéral, surpoids, obésité, facteurs de risques, adolescents océaniques, population multi-ethnique, pays insulaires du Pacifique (PICT).

UNC : Université de la Nouvelle-Calédonie, **LIRE** : Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Éducation, **CPS** : Communauté du Pacifique, division santé publique, **D2S** : Direction Science et Société

Cette étude a été réalisée dans le cadre du **projet FALAH** (agriculture familiale, mode de vie et santé dans le Pacifique).



Financement : Programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne (Convention n°873185), Marie Skłodowska-Curie Actions, RISE (Research & Innovation Staff Exchange), 2019. <https://falah.unc.nc>

Partenaires : CRESICA (UNC, IRD, IAC), PIURN (Universités du Pacifique Sud), CPS, 4 universités australiennes (USYD, UNSW, UOW, WSU) + 5 partenaires européens (France et Allemagne)

Depuis ces soixante-dix dernières années, les pays et territoires insulaires du Pacifique (PICT en anglais, fig. 2) connaissent une transition socio-économique très rapide qui bouleverse les modes de vie traditionnels des populations insulaires. Ces profonds changements ont entraîné une augmentation très importante des maladies non-transmissibles (MNT)¹ dans tous les groupes d'âge, en particulier chez les jeunes océaniques, ces MNT sont devenues la principale cause de décès prématurés et d'invalidité dans le Pacifique (75 % des décès) et représentent une lourde charge pour les systèmes de santé nationaux. La plupart de ces maladies sont étroitement associées à des caractéristiques anthropométriques² telles que le surpoids et l'obésité, qui apparaissent bien souvent dès l'enfance. Il apparaît que sept des dix pays les plus touchés par l'obésité dans le monde se situent dans la région Pacifique. Cette première fiche présente de récents résultats de recherche qui permettent de dresser un constat sur la prévalence⁴ du surpoids et de l'obésité chez les jeunes océaniques à l'échelle régionale (PICT).

Les fiches suivantes décrivent plus en détails les méthodes d'évaluation du statut pondéral ainsi que les résultats des études sur les différents facteurs sociodémographiques associés à cette forte prévalence chez les jeunes calédoniens.

Surpoids & obésité

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le surpoids est défini comme « un état caractérisé par une accumulation excessive de tissu adipeux (graisse) ». On parle d'obésité quand ce dépôt excessif de graisse a des impacts sur la santé ; l'obésité est donc une maladie chronique³. L'indice de masse corporelle (IMC) et les diagrammes de croissance spécifique sont généralement utilisés pour déterminer le statut de poids de l'enfant (voir fiche 02).

○ Problématique

Diverses enquêtes normalisées menées par différentes organisations mondiales ou régionales ont permis de récolter de nombreuses données sur la santé des enfants dans la région Pacifique. Ces enquêtes incluent notamment des données anthropométriques permettant de déterminer la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les très jeunes enfants ainsi que chez les adolescents ; celles-ci ne fournissent toutefois que peu d'informations sur les jeunes de six à douze ans (en âge de fréquenter les écoles primaires). Dans une récente étude (Bertrand-Protat *et al.*, 2023), l'équipe du LIRE (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Éducation) a donc examiné la littérature issue de la recherche scientifique publiée entre janvier 1980 et août 2022 afin de répondre à cette question :

QUELLE EST LA PRÉVALENCE DU SURPOIDS ET DE L'OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS ÂGÉS DE SIX À DOUZE ANS VIVANT DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE ET QUELLES EN SONT LES PRINCIPALES CAUSES ?

¹ MNT (maladies non transmissibles) : maladies cardiovasculaires, cancers, diabète et maladies respiratoires chroniques.

² L'anthropométrie est l'ensemble des techniques de mesure du corps humain et de ses différentes parties.

³ <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>

⁴ La prévalence d'une maladie désigne la proportion d'une population qui est ou a été touchée par cette maladie à un moment donné. Elle s'exprime donc en pourcentage.

○ Méthode

Des recherches documentaires ont été réalisées sur les plateformes PubMed, Google Scholar et ScienceDirect (plateformes web de bibliographie scientifique) en utilisant un ensemble de mots-clés généraux et spécifiques¹. Des rapports techniques provenant de sources faisant autorité (ex. : Ministères de la santé des PICT) ont également été inclus, ainsi que des études menées en Nouvelle-Zélande et Hawaï (fig. 1).

➤ RECUEIL DE 786 ARTICLES ET 4 RAPPORTS NATIONAUX

Quatre critères d'éligibilité ont ensuite été déterminés pour la sélection des articles :

- Étude menée dans au moins un des vingt-deux PICT et/ou en Nouvelle-Zélande ou Hawaï
- Étude incluant des enfants âgés de 6 à 12 ans
- Étude fournissant des données de surpoids ou d'obésité ou identifiant au moins un facteur explicatif du surpoids ou de l'obésité
- Études menées en Nouvelle-Zélande et Hawaï incluant des données liées au surpoids et à l'obésité obtenues chez de jeunes insulaires du Pacifique.

Guidés par ces critères d'éligibilité, deux chercheurs ou chercheuses de l'équipe du LIRE ont lu indépendamment les articles et rapports sélectionnés pour en extraire et en résumer les informations pertinentes relatives au surpoids et à l'obésité.

➤ SÉLECTION FINALE DE 31 PUBLICATIONS (25 ARTICLES + 2 ÉTUDES MONDIALES + 4 RAPPORTS NATIONAUX).




Figure 1. Stratégie de recherche et de sélection des études liées au surpoids et à l'obésité dans la région Pacifique.

● Résultats

Prévalence du surpoids et de l'obésité chez les enfants vivant dans les PICT

Selon les études ainsi sélectionnées, la prévalence globale du surpoids et de l'obésité chez les enfants vivant dans les PICT de la Mélanésie s'échelonne de 5,4 % (Vanuatu) à 25,5 % (Nouvelle-Calédonie) et atteint 45 % en Micronésie (7-10 ans). Les prévalences les plus élevées s'observent dans les PICT polynésiens, soit 35 % en Polynésie française, 49 % à Wallis et Futuna et jusqu'à 55,6 % aux Iles Samoa (7-16 ans) (fig. 2).




Figure 2. Prévalence globale maximale du surpoids et de l'obésité chez les enfants de 6 à 12 ans vivant dans les PICT (compilation des données de 31 études).

¹ Mots-clés généraux : « surpoids ou obésité », « enfants », « îles du Pacifique »

Mots-clés spécifiques : « anthropométrie, état nutritionnel, déterminants de l'obésité infantile, causes profondes de l'obésité infantile, facteurs de risque d'obésité infantile »

Mots-clés indiquant les noms individuels des 22 PICT de la région Pacifique.

Les principales causes de surpoids et d'obésité chez les jeunes vivant dans les PICT




Figure 3. Groupes de déterminants du surpoids et de l'obésité chez les jeunes vivant dans les PICT.

CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES DES ENFANTS

L'indice de Masse Corporelle (IMC) varie fortement selon l'ethnie. Les enfants polynésiens montrent un IMC supérieur à celui des autres communautés pluriethniques du Pacifique, indiquant une plus forte prévalence de l'obésité. De plus, cette prévalence augmente également avec l'âge.




Figure 4. Prévalence de l'obésité (en %) chez les enfants d'origine polynésienne et les enfants kanak vivant en Nouvelle-Calédonie (Tubert-Jeannin et al, 2018)




Figure 5. Evolution de la prévalence de l'obésité chez les jeunes calédoniens en fonction de l'âge (Tubert-Jeannin et al, 2018)

Le statut de poids est également lié au sexe de l'enfant ; en Nouvelle-Calédonie, les filles sont ainsi plus susceptibles d'être en surpoids que les garçons (voir fiche 3).

SCHÉMAS COMPORTEMENTAUX DES ENFANTS

Principaux facteurs comportementaux favorisant le surpoids et l'obésité identifiés dans ces études :



ABSENCE DE PETIT- DÉJEUNER

au profit de collations de type "snacking", particulièrement sucrées ou salées



CONSOMMATION DE BOISSONS SUCRÉES

au cours de la journée




DURÉE DU SOMMEIL FAIBLE

inférieure à 10h par nuit



RECOURS AUX VÉHICULES

plutôt que de se rendre à pied à l'école




PAS DE PRATIQUE SPORTIVE

au sein d'un club

PRATIQUES PARENTALES ET NIVEAU D'ÉDUCATION

Le statut de poids des enfants de la région Pacifique dépend également des pratiques d'éducation et du niveau d'instruction des parents. L'allaitement maternel réduirait les risques de surpoids tandis l'augmentation du niveau d'instruction des parents serait associée à une diminution de la prévalence du surpoids.



ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE



LA PRÉSENCE DE MARCHÉS TRADITIONNELS OU DE COMMERCES MODERNES

La présence des commerces modernes favorisent le surpoids via la consommation de produits industriels transformés riches en sucres et en graisse.



LE MODE DE VIE

Le mode de vie traditionnel ou moderne peut influencer la santé et le statut de poids de l'enfant.



LE NIVEAU DE REVENUS DES PARENTS

Dans les pays en développement, les ménages ayant les revenus les plus bas apparaissent globalement moins touchés par le surpoids et l'obésité, le manque de moyens financiers limitant l'accès régulier aux aliments industriels par rapport aux aliments issus de l'agriculture familiale ou locale ainsi qu'aux technologies numériques favorisant la sédentarité. La tendance inverse s'observe dans les pays développés, dans lesquels les ménages les plus modestes sont les plus touchés par la surcharge pondérale (voir fiche 3).

● Synthèse et recommandations

Cette étude met en évidence un **déficit de connaissances** sur les questions liées au surpoids et à l'obésité dans certains PICT de la région Pacifique, notamment pour en comprendre les causes profondes. Davantage d'études scientifiques sont donc nécessaires dans ce domaine à l'échelle régionale.

L'analyse comparée de la prévalence du surpoids et de l'obésité à l'échelle régionale se heurte à une **forte hétérogénéité dans la collecte de**

données selon les pays, ainsi qu'à l'**hétérogénéité des méthodes de mesures anthropométriques** mises en œuvre pour déterminer le statut de poids des enfants (normes différentes selon les pays). Une standardisation internationale de ces méthodes est donc indispensable pour affiner les résultats.

Malgré ces biais, cette étude révèle que les **prévalences du surpoids et de l'obésité dans les PICT de la région Pacifique sont significativement plus**

élevées que celles observées dans les pays occidentaux ou encore les grands pays de la région (l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'état américain d'Hawaï) et résultent de **causes multifactorielles** (caractéristiques individuelles, modes de vie & comportements, éducation parentale et contexte socioéconomique).

● Sources

Bertrand-Protat S., Chen J., Jonquoy A., **Frayon S.**, Thu Win Tin S., Ravuvu A., Caillaud C., **Galy O.**, 2023. Prevalence, causes and contexts of childhood overweight and obesity in the Pacific region: a scoping review. *Open Research Europe*, pp. 52. DOI: [10.12688/openreseurope.15361.2](https://doi.org/10.12688/openreseurope.15361.2); hal-04481288.

Autres références citées :

Breau L., Frayon S., Galy O., Cavaloc Y., Cherrier S., Lerrant Y., Wattelez G., Ashwell M., 2026b. Étude du surpoids et de l'obésité chez les jeunes calédoniens. Fiche 2 : Les méthodes anthropométriques d'évaluation du surpoids et leur mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie. *Fiches de synthèse des résultats de recherche, université de la Nouvelle-Calédonie*. DOI

Breau L., Frayon S., Galy O., Ashwell M., Caillaud C., Cavaloc Y., Cherrier S., Lerrant Y., Touitou A., Wattelez G., Yacef K., Zongo P., 2026c. Étude du surpoids et de l'obésité chez les jeunes calédoniens. Fiche 3 : Caractérisation du statut pondéral et de l'adiposité d'une population multiethnique d'adolescents calédoniens. *Fiches de synthèse des des résultats de recherche, université de la Nouvelle-Calédonie*. DOI

Frayon, S., Cherrier S., Cavaloc Y., Wattelez G., Lerrant Y., Galy O., 2018a. Relationship of body fat and body mass index in young Pacific Islanders: a cross-sectional study in European, Melanesian and Polynesian groups. *Pediatric Obesity*; 13(6), 357-364. <https://doi.org/10.1111/ijpo.12229>

Frayon, S., Cavaloc Y., Wattelez G., Cherrier S., Lerrant Y., Ashwell M., Galy O., 2018b. Potential for waist-to-height ratio to detect overfat adolescents from a Pacific Island, even those within the normal BMI range. *Obesity Research & Clinical Practices*; 12(4), 351-357. <https://doi.org/10.1016/j.orcp.2017.12.001>

Tubert-Jeannin S., Pichot H., Rouchon B., Pereira B., Hennequin M., 2018. Common risk indicators for oral diseases and obesity in 12-year-olds: a South Pacific cross sectional study. *BMC Public Health*, 18(1): 112. <https://doi.org/10.1186/s12889-017-4996-y>

“ Comment citer cette fiche ? ”

Breau L., Bertrand-Protat S., Galy O., Frayon S., Chen J., Jonquoy A., Thu Win Tin S., Ravuvu A., Caillaud C., 2026a. Étude du surpoids et de l'obésité chez les jeunes calédoniens. Fiche 1 : Contexte régional. *Fiches de synthèse des résultats de recherche, université de la Nouvelle-Calédonie*. DOI