

**Prova 3** (02/07/2025)

- É recomendável fazer a avaliação a lápis, mas escreva **a caneta** as suas **respostas finais**, bem como o **número de cada questão e item**.
- **É proibido:** consultar livros ou anotações; comunicar-se com colegas; usar calculadora, celular, ou qualquer dispositivo eletrônico.
- Empregue a **língua portuguesa** e a **notação matemática** de maneira correta.

**É necessário justificar as suas respostas!** Para tanto, uma *sugestão* é usar a notação de teoria de conjuntos e/ou a terminologia de “objetos básicos,” “configurações,” “representações,” além dos princípios de contagem propriamente ditos. *Listas* (sequências finitas) e *conjuntos* podem ser usados e combinados de diversas maneiras para formar representações.

◆ BOA PROVA! ◆

- 0,5 pts. **Q0.** Capricho, organização, clareza e legibilidade nas demais questões.
- Q1.** Em uma festa junina, *quatro* crianças, Ana, Beto, Cora e Dani, vão à mesa de doces, onde encontram 20 docinhos *distintos*.
- 1,0 pt. (a) De quantas maneiras pode-se distribuir os 20 doces distintos entre as quatro crianças? A ordem em que os doces são oferecidos é *irrelevante*: só interessa saber quais doces cada criança recebe, ao final da distribuição. Admite-se que alguma criança possa ficar sem doce algum.
- 0,5 pts. (b) De quantas maneiras pode-se distribuir os doces, de modo que *ao menos a Ana* não ganhe doce algum?
- 0,5 pts. (c) De quantas maneiras pode-se distribuir os doces, de modo que *ao menos a Ana e o Beto* não ganhem doce algum?
- 1,5 pts. (d) De quantas maneiras pode-se distribuir os doces, de modo que *ao menos uma* criança não ganhe doce algum?  
*Dica:* Use os itens anteriores e o Princípio de Inclusão-Exclusão.
- 0,5 pts. (e) De quantas maneiras pode-se distribuir os doces, de modo que cada criança receba *ao menos um* doce?
- 1,0 pt. (f) De quantas maneiras pode-se distribuir os 20 doces distintos, de modo que cada criança receba *exatamente cinco* doces?
- Q2.** Uma mercearia oferece cinco tipos de frutas: ameixas, laranjas, maçãs, pêras e tangerinas. Uma “cesta para presente” contém 20 frutas, escolhidas dentre esses cinco tipos. As frutas são bem selecionadas, de modo que frutas do mesmo tipo são consideradas idênticas.
- 1,5 pts. (a) Quantas cestas distintas podem ser preparadas? Não há “ordem” entre as frutas na cesta. Só interessa saber quantas frutas de cada tipo a cesta contém.
- 1,0 pt. (b) Quantas cestas distintas podem ser preparadas, de modo que haja *ao menos duas* frutas de cada tipo?
- Q3.** Uma *sequência ternária* é uma sequência (uma lista) composta pelos algarismos 0, 1 e 2 (por exemplo, 0211210).
- 1,0 pt. (a) Quantas sequências ternárias de  $n$  algarismos contêm exatamente  $k$  “uns”?
- 1,0 pt. (b) Quantas sequências ternárias de  $n$  algarismos *não* contêm dois algarismos consecutivos iguais? (*Sugestão:* Use um argumento simples. Não é necessário aplicar o Princípio de Inclusão-Exclusão em grande generalidade.)

## Respostas:

- Q1.** (a) Para cada um dos 20 doces distintos, há 4 “opções de criança” a quem entregá-lo. Pelo PM, o número de configurações (formas de distribuir os doces) é  $4^{20}$ . Essa é uma “justificativa mínima” que já seria suficiente na avaliação. Aqui está uma versão mais precisa (neste problema simples, não seria necessário elaborar tanto): Imagine que os doces sejam rotulados de “doce 1” até “doce 20”. Cada *configuração*, assim, pode ser *representada* por uma *lista* de comprimento 20, onde cada entrada é um elemento do conjunto das crianças (“com repetição”): a lista  $(c_1, c_2, \dots, c_{20})$  representa a configuração em que a criança  $c_i$  recebe o “doce  $i$ ”. Assim, por exemplo, a lista (Beto, Ana, Dani, Dani, ...) representa a configuração em que Beto ganha o doce 1, Ana ganha o doce 2, Dani ganha os doces 3 e 4, etc. A “ordem” na lista é relevante, já que os doces são distintos: a lista (Ana, Beto, ...) representa a configuração em que Ana ganha o doce 1 e Beto o doce 2, diferente do exemplo anterior. Assim, há uma bijeção entre o conjunto das listas e o das configurações. Há 4 “opções” de preenchimento em cada entrada na lista, e são 20 entradas. Pelo PM, o número de tais listas é  $4^{20}$  e, pelo PB, este é, também, o número de configurações.
- (b)  $3^{20}$ . O argumento é mesmo do item anterior, mas agora há apenas 3 “opções de criança”, já que Ana foi excluída das opções...
- (c)  $2^{20}$ . Mesmo argumento. Agora Ana e Beto foram excluídos.
- (d) Como sugerido no quadro, no dia da prova, considere:
- $A$ : conjunto das configurações em que Ana não recebe doce;
  - $B$ : conjunto das configurações em que Beto não recebe doce;
  - $C$ : conjunto das configurações em que Cora não recebe doce;
  - $D$ : conjunto das configurações em que Dani não recebe doce.

O objetivo, neste item, é calcular  $|A \cup B \cup C \cup D|$  (reflita e entenda a razão — não basta “decorar” isso!). O “PIE4” (ver [https://www.uel.br/eventos/colmatsul/livros/cerioli\\_viana.pdf](https://www.uel.br/eventos/colmatsul/livros/cerioli_viana.pdf), página 126; página 131 do PDF), aplicado a estes conjuntos, nos dá:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C \cup D| &= |A| + |B| + |C| + |D| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |A \cap D| \\ &\quad - |B \cap C| - |B \cap D| - |C \cap D| \\ &\quad + |A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| \\ &\quad + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D| \\ &\quad - |A \cap B \cap C \cap D| = 4 \cdot 3^{20} - 6 \cdot 2^{20} + 4. \end{aligned}$$

*Sugestão para estudo:* Reflita e entenda como calcular cada um dos termos que aparecem na expressão acima. Alguns desses termos foram obtidos em itens anteriores... Apesar de a formulação do “PIE4” ser um pouco extensa, apresentá-la inteiramente, como foi feito acima, é a forma mais direta e objetiva de justificar sua resposta nesta questão.

*Observação:* Alguns(mas) alunos(as) indicaram na prova, *incorretamente*, que a soma de termos  $|A| + |B| + |C| + |D|$  corresponde à “quantidade de configurações em que *exatamente uma* criança” fica sem doce, a soma de termos  $|A \cap B| + \dots + |C \cap D|$  corresponde à “quantidade de configurações em que *exatamente duas* crianças” ficam sem doce, etc. Essas afirmativas *não* estão corretas! Reflita sobre a razão... Lembre que os conjuntos  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  têm interseções não-vazias. Há elementos de  $A$  (“Ana sem doce”) que também pertencem aos outros conjuntos, há elementos de  $A \cap B$ , por exemplo, que também pertencem a  $C$ , etc. A “vantagem” do PIE é justamente lidar com situações assim.

- (e) Seja  $X$  o conjunto de todas as configurações (todas as maneiras de distribuir os 20 doces). No item (a), calculamos  $|X| = 4^{20}$ . Observe/reflita que o objetivo aqui é calcular

$$|X \setminus (A \cup B \cup C \cup D)| = |X| - |A \cup B \cup C \cup D| = 4^{20} - 4 \cdot 3^{20} + 6 \cdot 2^{20} - 4.$$

- (f) Justificativa “simplificada” (seria suficiente na avaliação): Há  $\binom{20}{5}$  maneiras de escolher, dentre os 20 doces, os 5 doces da Ana. Dentre os 15 doces que “sobram”, há  $\binom{15}{5}$  maneiras de escolher os 5 do Beto. Há  $\binom{10}{5}$  e  $\binom{5}{5} = 1$  maneiras de escolher os doces da Cora e da Dani, respectivamente. Pelo PM, o número de maneiras de distribuir 5 doces para cada criança, portanto, é  $\binom{20}{5} \binom{15}{5} \binom{10}{5} \binom{5}{5} = \frac{20!}{(5!)^4}$ .

- Q2.** (a) Represente uma cesta de frutas (ou seja, uma configuração) usando uma sequência binária de “barras” e “estrelas”, com *exatamente* 20 estrelas e 4 barras. As barras agem como “divisórias”, que determinam 5 categorias ou “compartimentos”, correspondentes às 5 frutas. A quantidade de estrelas em cada “compartimento” representa a quantidade de frutas do tipo correspondente.

Para o propósito da representação, vamos considerar arbitrariamente as “categorias” nesta ordem: ameixa, laranja, maçã, pêra e tangerina (qualquer outra ordem seria igualmente válida). Assim, por exemplo, a sequência

\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\*\* || \*\*\*\*\*

representa a configuração (a cesta) com 3 ameixas, 4 laranjas, 7 maçãs, nenhuma pêra e 6 tangerinas. Há uma bijeção entre o conjunto de tais sequências binárias e o conjunto das configurações.

O número de sequências binárias de comprimento 24, com exatamente 20 estrelas e 4 barras é  $\binom{24}{4}$ . *Atenção:* É importante entender e saber justificar a razão para isso! Tivemos uma aula inteira em que este era o ponto central... O argumento está dado, sucintamente, no último parágrafo da prova do Teorema 18.8, no livro do Scheinerman (3a Ed), logo antes do Exemplo 18.9.

O número de cestas, portanto, também é  $\binom{24}{4}$ , pelo PB.

- (b) A resposta é  $\binom{14}{4}$ . O argumento é análogo ao dado acima (não é necessário repeti-lo...).

- Q3.** (a)  $\binom{n}{k} \cdot 2^{n-k}$ .

Justificativa sucinta: Escolher, entre as  $n$  posições em uma sequência, as  $k$  posições dos “uns”. Em seguida, preencher as demais  $n - k$  posições com 0 ou 2.

(Recomendo refletir e reescrever a justificativa com suas próprias palavras, de forma mais clara e contextualizada. Mas não é necessário escrever um “textão”).

- (b)  $3 \cdot 2^{n-1}$ . Há 3 opções (0, 1 ou 2) para a primeira entrada de uma sequência (observe que você pode começar o argumento com qualquer uma das entradas, não necessariamente a primeira...). Para as  $n - 1$  entradas seguintes, há apenas 2 opções (0, 1 ou 2, mas excluindo o algarismo na posição anterior).