

Table 13
Best Overall Response per Investigator by Age Category
ITT Subjects

Subgroup: Age Category - <65

	Number of Subjects (%)		
	CMP123 (N=50)	Placebo (N=50)	Total (N=100)
BEST OVERALL RESPONSE			
COMPLETE RESPONSE (CR)	6 (12.0)	3 (6.0)	9 (9.0)
PARTIAL RESPONSE (PR)	13 (26.0)	7 (14.0)	20 (20.0)
STABLE DISEASE (SD)	2 (4.0)	7 (14.0)	9 (9.0)
PROGRESSIVE DISEASE (PD)	6 (12.0)	5 (10.0)	11 (11.0)
UNABLE TO DETERMINE (NE)	8 (16.0)	13 (26.0)	21 (21.0)
DEATH BEFORE MEASUREMENT	6 (12.0)	12 (24.0)	18 (18.0)
DROPED STUDY	1 (2.0)	0 (0.0)	1 (1.0)
WITHDRAWN CONSENT	1 (2.0)	1 (2.0)	2 (2.0)
OBJECTIVE RESPONSE RATE (1)	19/50 (38.0%)	10/50 (20.0%)	29/100 (29.0%)
(95% CI)	(0.3665, 0.7117)	(0.1464, 0.4630)	(0.2977, 0.5383)
(1): 95% confidence interval computed using Clopper-Pearson approach.			

Table 13
Best Overall Response per Investigator by Age Category
ITT Subjects

Subgroup: Age Category - >=65

	Number of Subjects (%)		
	CMP123 (N=50)	Placebo (N=50)	Total (N=100)
BEST OVERALL RESPONSE			
COMPLETE RESPONSE (CR)	2 (4.0)	4 (8.0)	6 (6.0)
PARTIAL RESPONSE (PR)	3 (6.0)	4 (8.0)	7 (7.0)
STABLE DISEASE (SD)	2 (4.0)	3 (6.0)	5 (5.0)
PROGRESSIVE DISEASE (PD)	3 (6.0)	2 (4.0)	5 (5.0)
UNABLE TO DETERMINE (NE)	5 (10.0)	2 (4.0)	7 (7.0)
DEATH BEFORE MEASUREMENT	5 (10.0)	0 (0.0)	5 (5.0)
DROPPED STUDY	0 (0.0)	1 (2.0)	1 (1.0)
OBJECTIVE RESPONSE RATE (1)	5/50 (10.0%)	8/50 (16.0%)	13/100 (13.0%)
(95% CI)	(0.1182, 0.6162)	(0.2659, 0.7873)	(0.2546, 0.6257)
(1): 95% confidence interval computed using Clopper-Pearson approach.			