
6/7/22, 11:52



6/7/22, 11:52 Resultado

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

En los tres frotis se observan similares cambios:

Se observan múltiples grupos de diferentes tamaños de células muy reactivas organizadas en forma de acines y en otras zonas como racimos, con moderado pleomorfismo; diferentes tamaños, de ovales a poligonales, moderada cantidad de citoplasma basofílico, núcleo redondo a oval excéntrico, moderada anisocariosis, cromatina dispersa, de 1 a 2 nucleolo prominente y moderada cantidad de gránulos basofílicos y vacuolas de diferentes tamaños. Aparecen aisladas mitosis por campo 40 X. El resto del frotis está compuesto por moderada cantidad de neutrófilos y en menor número linfocitos, plasmocitos y macrófagos, material proteinaceo hialino, adipocitos y moderada cantidad de eritrocitos.

DIAGNÓSTICO MORFOLÓGICO

Carcinoma indiferenciado.

Alteración inflamatoria supurativa moderada.

TÉCNICA: MICROSCOPIA DIRECTA DEL MATERIAL TEÑIDO CON COLORANTE DE WRIGHT-LEISHMAN. **COMENTARIOS**:

Los hallazgos citológicos observados corresponden a un proceso de tipo neoplásico células epiteliales con características malignas junto con alteración inflamatoria supurativa moderada, por lo que el pronóstico es reservado.

RESPONSABLE: MVZ M.C. JUAN IGNACIO MONROY BASILIO CED. PROF UNAM 645733 / SENASICA MR-1220-13-005-13 LACLIVET

https://intranet.laclivet.com.mx/ResultadoEditar.aspx?pathdescarga=e4f9e53b-54cc-4355-b04c-ee1665ac4744