


# Chapitre 2 : Notion de vecteur



# I/ Premières propriétés

## 1) Vecteur et translation

### Définition :

Soit  $A$  et  $B$  deux points du plan. On appelle **vecteur** l'objet  $\overrightarrow{AB}$  qui représente la **translation** de  $A$  vers  $B$ .

### Définition :

Soit  $A$  et  $B$  deux points du plan. On appelle **vecteur** l'objet  $\overrightarrow{AB}$  qui représente la **translation** de  $A$  vers  $B$ .

### Remarques :


- Le vecteur  $\overrightarrow{BB}$  noté  $\overrightarrow{0}$  est appelé **vecteur nul**, il induit une « *translation immobile* ».
- On peut aussi noter un vecteur sans points, ex :  $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ .

# Comment caractériser un vecteur ?

Norme (longueur) :  $\|\vec{u}\| = 5.39$

Direction : 

Sens : 



## Définition / Propriété :

Un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  est caractérisé par :

- ✦ sa longueur appelée **norme** et notée  $\|\overrightarrow{AB}\|$  ;
- ✦ sa **direction** i.e. l'inclinaison de la droite  $(AB)$  ;
- ✦ et enfin son **sens** (de  $A$  vers  $B$ ).


## 2) Égalité de vecteurs

### Définition :

On dit que  $\vec{u} = \vec{v}$  lorsque les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont même **norme**, même **direction** et même **sens**.

## Définition :

On dit que  $\vec{u} = \vec{v}$  lorsque les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ont même **norme**, même **direction** et même **sens**.



**Propriété :**

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  ssi  $ABDC$  est un parallélogramme  
(éventuellement plat).

**Propriété :**

Pour tous points distincts  $A$  et  $B$  :  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$  ssi  $M$   
est le **milieu** de  $[AB]$ .



## II/ Opérations sur les vecteurs


### 1) Somme de vecteurs

#### Définition :

La translation de vecteur  $\vec{u}$  suivie de la translation de vecteur  $\vec{v}$  est une translation notée  $\vec{u} + \vec{v}$ .

## Définition :

La translation de vecteur  $\vec{u}$  suivie de la translation de vecteur  $\vec{v}$  est une translation notée  $\vec{u} + \vec{v}$ .



**Propriété :**

La **Relation de Chasles** énonce que  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .

$B$   
+

+

$C$

+

$A$

## 2) Opposé d'un vecteur

### Définition :

On appelle **opposé** du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  le vecteur  $-\overrightarrow{AB}$  défini par l'égalité  $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ .

### Propriété :

Pour tous points  $A, B$  :



$$\overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

### 3) Produit d'un vecteur par un nombre

#### Définition :

Soit  $\vec{u}$  un vecteur et  $k \neq 0$  un nombre. Le vecteur  $k \times \vec{u}$  :

- a la même **direction** que  $\vec{u}$  ;
- a le même **sens** que  $\vec{u}$  si  $k > 0$ , le sens contraire si  $k < 0$  ;
- a pour **norme**  $|k| \times \|\vec{u}\|$ .



### Remarques :

- $k \times (\vec{u} + \vec{v}) = k \times \vec{u} + k \times \vec{v}$
- $0 \times \vec{u} = \vec{0}$

🍷 Fin de Chapitre 🍷