

Уравнение Линдблада для двухуровневой системы, взаимодействующей с термостатом

Pan Vyacheslav Igorevich

29 апреля 2024 г.

Аннотация

Уравнение Шредингера (5), широко применяемое для нахождения волновой функции, имеет ограниченное применение, так как, описывая изменение системы только под действием потенциальных сил, позволяет определить только чистые состояния¹ и не способно описать диссипацию² квантовой системы.

$$i\hbar\partial_t|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle \quad (1)$$

В то же время матрица плотности может задавать как чистые, так и смешанные состояния. Уравнение Линдблада (5), рассматриваемое в данной работе, является уравнением матрицы плотности, описывающим ее эволюцию.

$$\partial_t\rho = -\frac{i}{\hbar}[H, \rho] + \sum_i \gamma_i(L_i\rho L_i^\dagger - \frac{1}{2}[L_i^\dagger L_i, \rho]) \quad (2)$$

1 Введение

Введем некоторые постулаты квантовой механики для чистых состояний.

Постулат 1. С любой закрытой квантовой системой связано конечномерное или бесконечномерное Гильбертово пространство³ \mathcal{H} над полем комплексных чисел, которому принадлежит вектор состояния $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

Состояния системы, описываемые векторами состояний называют чистыми. Зная вектор состояния системы, мы владеем наибольшей возможной информацией о ней. Вектор состояния Ψ в нотации Дирака можно записать как

$$\Psi = \sum_i a_i |\psi_i\rangle \quad (3)$$

где ψ_i — возможное состояние системы, a_i — амплитуда вероятности нахождения системы в состоянии с индексом i . Так как суммарная вероятность всех состояний должна равняться единице,

$$\sum_i a_i^2 = 1 \quad (4)$$

В случае, если мы не владеем полным представлением о состоянии системы, мы говорим, что она находится в смешанном состоянии. Как было сказано выше, для описания смешанных систем используется оператор ρ , принадлежащий Гильбертову пространству, называемый матрицей плотности (или оператором плотности) и задается как

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i| \quad (5)$$

где p_i является вероятностью нахождения состояния ψ_i , а $|\psi_i\rangle \langle \psi_i|$ — соответствующий оператор проекции. След матрицы плотности равен 1 по условию нормировки ($\text{tr}[\rho]=1$), а сама матрица должна

¹Полностью известное квантовое состояние.

²Необратимая потеря энергии.

³Линейное пространство, в котором норма порождается скалярным произведением.

быть положительна, по определению вероятности ($\rho > 1$).

В силу утверждения (4) случае если $tr[\rho^2] = tr[\rho] = 1$ мы считаем состояние чистым. В случае $tr[\rho^2] < 1$ состояние смешанное. Матрица плотности представляет собой квадратную матрицу размерности $N \times N$, где N — количество базисных векторов соответствующего Гильбертова пространства.

Постулат 2. Пусть до измерения система находилась в чистом состоянии ψ .

Согласно спектральной теореме о Эрмитовой матрице