

# TUTORAT 1 DE MATHÉMATIQUES (2ÈME ANNÉE)

Etienne Reyssat

## ÉQUATIONS AUX DÉRIVÉES PARTIELLES

N'hésitez pas à me contacter (etienne.reyssat@espci.fr) si au cours de la préparation vous rencontrez des difficultés, aviez besoin de précisions...

### 1 Équation de diffusion à une dimension

(A) Considérons l'équation de diffusion à une dimension spatiale,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D \Delta \phi \quad (1)$$

Quelle est la solution "standard"? Quelles sont les hypothèses utilisées pour son obtention?

(B) Transformation en une EDO : Quelle est la variable  $s$  qui apparaît naturellement dans l'équation de diffusion, i.e. quelle combinaison de  $x$  et  $t$  apparaît dans les solutions? Y a-t-il plusieurs choix possible pour  $s$ ? Écrivez l'équation pour  $F$  telle que

$$\phi(x, t) = t^\alpha F(s) \quad (2)$$

et trouvez une équation différentielle ordinaire pour  $F$ . Cherchez une solution de la forme suivante :  $F(s) = Ae^{-Bs}$ . Quelle solution retrouvez-vous?

(C) Cherchez des solutions de la forme

$$\phi(x, t) = f(x - \beta t) \quad (3)$$

Pourquoi n'avez vous pas trouvé cette solution par la méthode standard?

### 2 Nivellement d'un film mince

Nous discutons ici l'évolution du profil d'épaisseur d'un mince film de liquide déposé sur une surface solide. La viscosité du liquide est notée  $\eta$ , sa tension de surface  $\gamma$ . L'épaisseur  $h(x, t)$  du film dépend de la position et du temps. Sous l'influence de la capillarité, le film tend à s'aplanir.

(A) L'évolution du profil  $h(x, t)$  est régie par l'équation des films minces :

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\gamma}{3\eta} \frac{\partial}{\partial x} \left( h^3 \frac{\partial^3 h}{\partial x^3} \right) = 0 \quad (4)$$

Expliquer comment on obtient cette équation.

(B) En divisant les longueurs par  $h_0$ , adimensionner l'équation d'évolution de  $h$ . On notera l'épaisseur adimensionnée  $H(X, T)$ . Comment s'exprime le temps adimensionné  $T$ ?

(C) Nous supposons ici que le profil est faiblement perturbé, c'est-à-dire qu'on peut écrire l'épaisseur du film sous la forme suivante :

$$H(X, T) = 1 + \Delta(X, T) \quad (5)$$

où  $\Delta \ll 1$  est une petite perturbation à la surface d'un film très étendu d'épaisseur 1. Dans cette limite, que devient l'équation des films minces? Voyez-vous des similarités avec une autre équation courante de la physique?

(D) En utilisant un raisonnement analogue à celui utilisé pour l'opérateur de diffusion, montrer que la fonction de Green du problème s'écrit :

$$\mathcal{G}(X, T) = \frac{\Theta(T)}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-K^4 T} e^{iKX} dK \quad (6)$$

où  $X = x/h_0$  et  $T$  sont la position et le temps adimensionnés, et  $\Theta$  est la fonction de Heaviside.

(E) Quelle variable autosimilaire naturelle  $S$  apparaît ici ? Vérifier que la fonction de Green est autosimilaire, c'est-à-dire qu'elle s'exprime sous la forme  $\mathcal{G}(X, T) = T^\alpha G(S)$ .

(F) On cherche des solutions de l'équation des films minces sous la forme  $\Delta(X, T) = T^\alpha F(S)$ . De quelle équation différentielle ordinaire  $F$  est-elle solution ?

(G) On considère une condition initiale sommable  $\Delta(X, 0) = \Delta_0(X)$ , d'intégrale non-nulle  $\mathcal{I}_0$ . Donner la solution formelle générale  $\Delta(X, T)$ .

(H) À temps long, vers quelle fonction semble tendre la fonction  $f(X, T) = T^{1/4} \Delta(X, T) / \mathcal{I}_0$  ? Connaissez-vous un comportement semblable dans un autre problème de physique ?

### 3 Équation de Burgers

(A) Discutez les solutions de l'équation de transport convectif :

$$\frac{\partial v}{\partial t} + c \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad (7)$$

où  $c$  est un champ  $c(x, t)$ .

(B) Qu'arrive-t-il si on considère  $c = v$  ? Les singularités peuvent être lissées par ajout d'un petit terme diffusif. Celui-ci change la nature de l'EDP, qui d'hyperbolique devient parabolique. On obtient l'équation de Burgers :

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} = \epsilon \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}. \quad (8)$$

Expliquez qualitativement pourquoi l'ajout du terme d'ordre 2 permet de lisser les singularités.

(C) Chose inhabituelle pour une équation aux dérivées partielles non-linéaire, l'équation de Burgers admet des solutions analytiques. Construisez la solution générale en introduisant  $\phi$  tel que

$$v = -2\epsilon \frac{\partial}{\partial x} \ln \phi \quad (9)$$

(transformation de Hopf et Cole). Écrivez l'équation de Burgers en fonction de  $\phi$ . La substitution se fait en trois étapes : (1)  $v = -2\epsilon \partial_x \psi$ , (2) Intégrer l'équation obtenue, (3)  $\psi = \ln \phi$ .