



Chapitre 1 - Nombres relatifs

Activité d'introduction :

Voici une carte de prévision météorologique.



1.
 - a. A priori, à quelle saison les températures prévues correspondent-elles ?
 - b. Quelle est la température la plus basse ?
La température la plus haute ?
 - c. Classer ces températures en deux catégories en justifiant le choix des catégories.
2. Placer ces températures sur la droite graduée puis placer l'initiale de chaque ville de la carte en fonction de la température prévue. (*P pour Paris, N pour Nice, ...*)



3.
 - a. Quelle est la différence de températures prévue entre Paris et Marseille ? Entre Nice et Marseille ?
 - b. Comment cela se traduit-il sur la droite graduée les points P et N ?
4. Où fera-t-il le plus chaud :
 - a. À Strasbourg ou à Lille ?
 - b. À Dijon ou à Brest ?
 - c. À Dijon ou à Paris ?
5. En utilisant ce qui vient d'être fait, indique le plus grand des deux nombres :
 - a. -12 et -7
 - b. -9 et 2
 - c. -9 et -4
6. Ranger les températures de la plus froide à la plus chaude.

I - Les nombres relatifs :

Les nombres **positifs** sont les nombres supérieurs ou égaux à zéro (≥ 0).
Ils s'écrivent seul ou avec le signe « + » placé devant eux.

Exemple :

2 ; 7 ; 3,5 ; +4 ; +6 ; +31,62 ; 2024 ; etc..

Les nombres **négatifs** sont les nombres inférieurs ou égaux à zéro (≤ 0).
Ils s'écrivent avec le signe « - » placé devant eux.

Exemple :

-8 ; -17 ; -6,3 ; -42,72 ; -2025 ; etc..

Les nombres **relatifs** regroupent les nombres **positifs** et **négatifs**.


Remarque :

- Le nombre 0 est à la fois négatif et positif.
- Si un point est **strictement supérieur** à zéro, il est **strictement positif**. (> 0)
- Si un point est **strictement inférieur** à zéro, il est **strictement négatif**. (< 0)

II – Représentation :


1) Repérage sur une droite graduée :

Une **droite graduée** de façon régulière est une droite qui possède un **sens**, une **origine** et une **unité de longueur**.



Sur la droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif unique appelé **l'abscisse** de ce point.

Exemples :



- Le point A a pour abscisse -3.
On note : $A(-3)$.
- Le point B a pour abscisse +2.
On note : $B(+2)$.
- Le point C a pour abscisse -4,3.
On note : $C(-4,3)$.

La **valeur absolue** d'un nombre relatif a (notée $|a|$) est :

- a si a est positif.
- $-a$ si a est négatif.

On parle aussi de **distance à zéro**.

$-5,3$
Signe négatif Valeur absolue

$+3$
Signe positif Valeur absolue

8
Signe positif Valeur absolue


Remarque :

- La valeur absolue est toujours positive.

L'**opposé** d'un nombre est le nombre ayant le **signe opposé** et la **même distance à zéro**.

Exemple :

-3,2 et l'opposé de +3,2.



2) Comparaison de nombres relatifs :

Propriétés :

- Un nombre **négatif** est toujours plus petit qu'un nombre **positif**.
- De deux nombres **positifs**, le plus grand est celui qui a la plus **grande valeur absolue**.
- De deux nombres **négatifs**, le plus grand est celui qui a la plus **petite valeur absolue**.

Exemple :


- | | | |
|--------------|--------------|-----------------|
| • $-12 < +3$ | $-27 < 15$ | $-99,24 < +1,2$ |
| • $+7 < +16$ | $9 < 63$ | $+14,3 < 26,2$ |
| • $-12 < -5$ | $-74 < -2,1$ | $-1,2 < -1,1$ |

Remarques :

- Sur une droite graduée, les nombres sont rangés dans l'ordre croissant de la gauche vers la droite.
- Pour deux nombres négatifs celui le plus à gauche est le plus petit.

3) Repérage dans le plan :

Un **repère orthogonal** du plan est composé de deux droites graduées perpendiculaires et de même origine. Une première horizontale qui est appelée axe des **abscisses**. Une autre verticale qui est appelée axe des **ordonnées**.



Remarque :


- Le point O est appelé origine du repère.

Dans un repère, la position d'un point est alors donnée par deux nombres relatifs :

- Le premier, appelé **abscisse** se lit sur l'axe horizontal.
- Le second, appelé **ordonnée** se lit sur l'axe vertical.

Ces deux nombres représentent les **coordonnées** de ce point.

Exemples :



$E(2 ; 1)$
 ↑ ↑
 Abscisse Ordonnée

- $F(-2 ; 2)$
- $G(-1 ; -1)$
- $H(0 ; -2)$
- $O(0 ; 0)$

Remarques :

- Tous les points de l'axe des abscisses ont une ordonnée égale à 0.
- Tous les points de l'axe des ordonnées ont une abscisse égale à 0.