

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·一、选择题（第 1—8 题，每小题 5 分，共 40 分）

1. 5 分


抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点坐标为 ()

- A. $(-1, 0)$ B. $(1, 0)$ C. $(0, 1)$ D. $(0, -1)$

解 对照抛物线标准式 $y^2 = 2px$ ，其焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线为 $x = -\frac{p}{2}$ 。

本题 $2p = 4$ ，故 $p = 2$ ，于是焦点 $= (\frac{2}{2}, 0) = (1, 0)$ ，准线为 $x = -1$ 。

答案 $F(1, 0)$ ，选 **B**



第 1 题 $2p = 4 \Rightarrow p = 2$ ，焦点 $(1, 0)$ ，准线 $x = -1$

2. 5 分

设集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$ ， $B = \{y \mid x^2 + y^2 = 4\}$ ，则 $A \cap B = ()$


- A. $[-1, 2]$ B. $[-2, 3]$ C. $[-2, 2]$ D. $[-1, 3]$

解 对 A ：因式分解得 $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) \leq 0$ ，即 $x \in [-1, 3]$ 。

对 B ：由 $x^2 + y^2 = 4$ 知 y 的取值范围为 $[-2, 2]$ 。

于是 $A \cap B = [-1, 3] \cap [-2, 2] = [-1, 2]$ 。

答案 $[-1, 2]$ ，选 **A**



第 2 题 $A = [-1, 3]$ 与 $B = [-2, 2]$ 取交得 $[-1, 2]$

3. 5 分

设平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ ()

A. 1

B. -1

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

解 由向量模的平方公式, 对任意 u, v 有 $|u + v|^2 = |u|^2 + |v|^2 + 2u \cdot v$.


于是

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 3,$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 1,$$

两式相减得 $4\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 - 1 = 2$, 故 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$ 。

答案 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$, 选 C



第 3 题 平行四边形: 红色为 $|a + b| = \sqrt{3}$, 蓝色为 $|a - b| = 1$ 对应的对角线

4. 5 分

设数列 $\{a_n\}$ 为公差 $d \neq 0$ 的等差数列, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_4 - S_2 = 17$, $a_2 + a_7 = 23$, 则 $\{a_n\}$ 的公差为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解 $S_4 - S_2 = a_3 + a_4 = (a_1 + 2d) + (a_1 + 3d) = 2a_1 + 5d = 17$ 。

$a_2 + a_7 = (a_1 + d) + (a_1 + 6d) = 2a_1 + 7d = 23$ 。

两式相减: $2d = 23 - 17 = 6$, 故 $d = 3$ 。

代回第一式得 $2a_1 = 17 - 5 \times 3 = 2$, 即 $a_1 = 1$, 于是 $a_n = 3n - 2$ 。

答案 $d = 3$, 选 B

5. 5分


有 8 件产品, 其中 4 件为次品, 从中有放回地取 3 次 (每次 1 件), 令 X 表示取得次品的次数, 则 $P(X \leq 2) =$ ()

- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{7}{8}$ D. $\frac{3}{4}$

解 每次取到次品的概率 $p = \frac{1}{2}$ 。因是放回抽样, 各次取样相互独立, 故 $X \sim B(3, \frac{1}{2})$ 。

用补事件: $P(X \leq 2) = 1 - P(X = 3) = 1 - p^3 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ 。

答案 $P(X \leq 2) = \frac{7}{8}$, 选 C



第 5 题 $X \sim B(3, \frac{1}{2})$, 所求为“三件全为次品”之外的全部情形

6. 5分

已知三棱锥 $P-ABC$ 的三条侧棱两两垂直, 且 $AB = \sqrt{5}$, $BC = \sqrt{7}$, $AC = 2$, 则该三棱锥的外接球体积为 ()

- A. $4\frac{\pi}{3}$ B. $8\sqrt{2}\frac{\pi}{3}$ C. 4π D. 8π

解 以 P 为原点, 令 $PA = (a, 0, 0)$, $PB = (0, b, 0)$, $PC = (0, 0, c)$ 。因三条侧棱两两垂直,


$$AB^2 = a^2 + b^2 = 5, \quad BC^2 = b^2 + c^2 = 7, \quad AC^2 = a^2 + c^2 = 4,$$

三式相加: $2(a^2 + b^2 + c^2) = 5 + 7 + 4 = 16$, 故 $a^2 + b^2 + c^2 = 8$ 。

把三棱锥补成长方体, 则外接球球心为长方体体对角线的中点, 半径 $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \frac{1}{2}\sqrt{8} = \sqrt{2}$ 。

故 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 2\sqrt{2} = 8\sqrt{2}\frac{\pi}{3}$ 。

答案 $V = 8\sqrt{2}\frac{\pi}{3}$, 选 B



第6题 补成长方体：PA、PB、PC 沿三坐标轴，两两垂直；P 与体对角顶点 M 连成外接球直径

7. 5分

已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增，且 $f(3) = 0$ ，则满足 $xf(x+1) \geq 0$ 的 x 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -2] \cup [0, 1] \cup [4, +\infty)$ B. $(-\infty, -4] \cup \{0\} \cup [2, +\infty)$
C. $(-\infty, -4] \cup [-1, 0] \cup [2, +\infty)$ D. $[-4, -1] \cup [0, 2)$

解 由奇函数定义 $f(-x) = -f(x)$ 。

关于单调性：设 $0 < x_1 < x_2$ ，则 $-x_2 < -x_1 < 0$ 。由 f 在 $(-\infty, 0)$ 上递增， $f(-x_2) < f(-x_1)$ ，即 $-f(x_2) < -f(x_1)$ ，故 $f(x_2) > f(x_1)$ 。所以 f 在 $(0, +\infty)$ 上也单调递增。

关于零点： $f(3) = 0$ ，由奇性 $f(-3) = -f(3) = 0$ 。结合 f 在 $(0, +\infty)$ 递增，得


$$f(t) > 0 \iff t \in (-3, 3), \quad f(t) < 0 \iff t \in (-\infty, -3) \cup (3, +\infty),$$

解不等式： $xf(x+1) \geq 0$ 要求 x 与 $f(x+1)$ 同号（或其中之一为零）。

x	$x+1$	符号判断
$x < -4$	$x+1 < -3$	$f(x+1) < 0$ 且 $x < 0$ ，同号，成立
$x = -4$	$x+1 = -3$	$f(x+1) = f(-3) = 0$ ，成立
$(-4, -1)$	$(-3, 0)$	$f(x+1) > 0$ 而 $x < 0$ ，异号，不成立
$x = -1$	$x+1 = 0$	$xf(0) = -f(0) = 0$ ，成立
$(0, 2)$	$(0, 3)$	$f(x+1) > 0$ 而 $x > 0$ ，同号，成立
$x = 2$	$x+1 = 3$	$f(x+1) = f(3) = 0$ ，成立
$x > 2$	$x+1 > 3$	$f(x+1) < 0$ 而 $x > 0$ ，异号，不成立

合并得 $x \in (-\infty, -4] \cup [-1, 0] \cup [2, +\infty)$ 。

答案 $(-\infty, -4] \cup [-1, 0] \cup [2, +\infty)$ ，选 C



第 7 题 奇函数零点为 ± 3 : $f > 0$ 在 $(-3, 3)$, $f < 0$ 在 $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$

8. 5分

对于函数 $f(x)$, 当 $x > 0$ 时 $f(x) > f'(x)$ 。在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $b \cos C + c \cos B > a \cos C + c \cos A$ 。设 $x_1 = \frac{a}{b}$, $x_2 = \sin \frac{A}{\sin B}$, $x_3 = \frac{A}{B}$, 则 (本题角度采用弧度制计算) ()

$$\frac{f(x_1)}{e^{\{x_1\}}} > \frac{f(x_2)}{e^{\{x_2\}}} > \frac{f(x_3)}{e^{\{x_3\}}}$$

$$\frac{f(x_1)}{e^{\{x_1\}}} < \frac{f(x_2)}{e^{\{x_2\}}} < \frac{f(x_3)}{e^{\{x_3\}}}$$

$$\frac{f(x_1)}{e^{\{x_1\}}} = \frac{f(x_2)}{e^{\{x_2\}}} > \frac{f(x_3)}{e^{\{x_3\}}}$$

$$\frac{f(x_1)}{e^{\{x_1\}}} = \frac{f(x_2)}{e^{\{x_2\}}} < \frac{f(x_3)}{e^{\{x_3\}}}$$

解 第一步: 由条件得 $A > B$ 。

由正弦定理, $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$, 故原不等式等价于

$$\sin B \cos C + \sin C \cos B > \sin A \cos C + \sin C \cos A,$$

左边 $= \sin(B + C) = \sin(\pi - A) = \sin A$; 右边第二、三项之和 $= \sin A \cos C + \sin C \cos A = \sin(A + C) = \sin(\pi - B) = \sin B$ 。于是条件等价于 $\sin A > \sin B$ 。

又 $\sin A - \sin B = 2 \cos\left(\frac{A+B}{2}\right) \sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$, 其中 $A + B < \pi$ 保证 $\cos\left(\frac{A+B}{2}\right) > 0$, 故 $\sin\left(\frac{A-B}{2}\right) > 0$, 即 $A > B$ 。于是 $a > b > 0$ 。

第二步: 比较 x_1, x_2, x_3 。

由正弦定理 $x_2 = \sin \frac{A}{\sin B} = \frac{a}{b} = x_1$ 。

又函数 $h(t) = \sin \frac{t}{t}$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减 (因 $h'(t) = \frac{t \cos t - \sin t}{t^2} < 0$)。由 $A > B > 0$ 得 $\sin \frac{A}{A} < \sin \frac{B}{B}$, 即 $\frac{a}{A} < \frac{b}{B}$, 即 $aB < Ab$, 即

$$x_1 = \frac{a}{b} < \frac{A}{B} = x_3,$$

于是 $0 < x_1 = x_2 < x_3$ 。

第三步: 考察 $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ 。


对 $x > 0$,

$$g'(x) = \frac{f'(x)e^x - f(x)e^x}{e^{\{2x\}}} = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} < 0,$$

由条件 $f(x) > f'(x)$ 知 g 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减。

由 $0 < x_1 = x_2 < x_3$ 得 $g(x_1) = g(x_2) > g(x_3)$, 即 $\frac{f(x_1)}{e^{\{x_1\}}} = \frac{f(x_2)}{e^{\{x_2\}}} > \frac{f(x_3)}{e^{\{x_3\}}}$ 。

答案 $\frac{f(x_1)}{e^{\{x_1\}}} = \frac{f(x_2)}{e^{\{x_2\}}} > \frac{f(x_3)}{e^{\{x_3\}}}$, 选 B



第 8 题 $x_1 = x_2 < x_3$ ，而 $g = \frac{f}{e^x}$ 在 $(0, +\infty)$ 递减，故 $g(x_1) = g(x_2) > g(x_3)$